



C591

Norges offisielle statistikk

Official Statistics of Norway



Dødsårsaker 1996

Cause of Death 1996



C 591

Norges offisielle statistikk

Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1996

Causes of Death 1996

Norges offisielle statistikk

I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer og resultater fra spesielle tellinger og undersøkelser. Serien har først og fremst referanse- og dokumentasjonsformål. Presentasjonen skjer vesentlig i form av tabeller, figurer og nødvendig informasjon om datamaterialet, innsamlings- og bearbeidingsmetoder, samt begreper og definisjoner. I tillegg gis det en kort oversikt over hovedresultatene.

Serien omfatter også publikasjonene, Statistisk årbok, Historisk statistikk, Regionalstatistikk og Veiviser i norsk statistikk.

Official Statistics of Norway

This series consists mainly of primary statistics, statistics from statistical accounting systems and results of special censuses and surveys, for reference and documentation purposes. Presentation is basically in the form of tables, figures and necessary information about data, collection and processing methods, and concepts and definitions. In addition, a short overview of the main results is given.

The series also includes the publications Statistical Yearbook of Norway, Historical Statistics, Regional Statistics and Guide to Norwegian Statistics.

© Statistisk sentralbyrå, april 2000

Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen,
vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde.

ISBN 82-537-4796-9
ISSN 0550-032X

Emnegruppe
03.01 Helsetilstanden

Design: Enzo Finger Design
Trykk: GCS as

Standardtegn i tabeller	Symbols in tables	Symbol
Tall kan ikke forekomme	Category not applicable	.
Oppgave mangler	Data not available	..
Oppgave mangler foreløpig	Data not yet available	...
Tall kan ikke offentliggjøres	Not for publication	-
Null	Nil	-
Mindre enn 0,5 av den brukte enheten	Less than 0.5 of unit employed	0
Mindre enn 0,05 av den brukte enheten	Less than 0.05 of unit employed	0,0
Foreløpige tall	Provisional or preliminary figure	*
Brudd i den loddrette serien	Break in the homogeneity of a vertical series	—
Brudd i den vannrette serien	Break in the homogeneity of a horizontal series	
Rettet siden forrige utgave	Revised since the previous issue	r
Desimalskilletegn	Decimal punctuation mark	, (.)

Forord

Publikasjonen inneholder detaljert statistikk over dødsårsaker i 1996. I tillegg inneholder publikasjonen tidsserier for dødelighet omkring fødselen og i første leveår samt for hjerte- og karsykdommer, ondartede svelster og selvmord.

I de detaljerte tabellene for 1996 er dødsårsakene gruppert etter to spesifikasjonsnivåer; internasjonal detaljert liste og forkortet europeisk liste. Dødsårsakene er fra 1996 klassifisert og kodet etter 10. revisjon av den internasjonale statistiske klassifikasjon av sykdommer og andre helseproblemer. Norsk utgave av den internasjonale klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker, 9. revisjon (ICD-9) ble benyttet i årene 1986-1995, mens norsk utgave av ICD-8 ble benyttet i årene 1969-1985. Tabellene tar sikte på å tjene som grunnlagsmateriale for forskere og andre som har behov for årlige detaljerte oppgaver.

Deler av materialet er tidligere publisert i Dagens statistikk, 30. september 1999 (artikkel om dødsårsaker med vekt på selvmord). Retningslinjer for tilgang til personopplysninger om dødsårsak til forskningsformål er publisert i Ukens statistikk nr. 35/1997.

Tabellene i denne publikasjonen, samt nevnte artikkel er tilgjengelig på Statistisk sentralbyrås Web-sider på Internett (<http://www.ssb.no>).

Rådgiver Finn Gjertsen har utarbeidet publikasjonen, i samarbeid med konsulent Knut Strøm. Konsulent Anne Gro Pedersen har ledet arbeidet med klassifikasjon og koding av dødsårsaker etter den internasjonale sykdomsklassifikasjonen, i samarbeid med konsulent Inger Johanne Baastø, konsulent Liv Anne Halderaker, førstesekretær Jorunn Hoff og konsulent Tove Halhjem Kjeilen. Rådgiver i medisinske spørsmål og koding av underliggende dødsårsak har vært professor, overlege Eystein Glattre, Kreftregisteret. Ansvarlig seksjonsleder er Ann Lisbet Brathaug, Seksjon for helsestatistikk.

Statistisk sentralbyrå,
Oslo/Kongsvinger, 22. februar 2000

Svein Longva

Johan-Kristian Tønder

Preface

The present publication contains detailed statistics on causes of death in 1996, classified according to the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems of 1990, Tenth Revision.

The publication also contains time series for perinatal and infant mortality, cardiovascular diseases, malignant neoplasms and suicide.

The detailed tables of causes of death for 1996 are tabulated with two levels of specification, the International Detailed List and the ICD-10 European Shortlist. The main function of the tables are to serve as basic material for research workers and others in need of annual, specific details.

The tables in this publication can be found on Internet at Statistics Norway's Web-pages (<http://www.ssb.no>).

This publication has been prepared under the supervision of Mr. Finn Gjertsen in co-operation with Mr. Knut Strøm. Ms. Anne Gro Pedersen has lead the work on determining causes of death codes according to the international classification of diseases, in co-operation with Ms. Inger Johanne Baaastø, Ms. Liv Anne Halderaker, Ms. Jorunn Hoff and Ms. Tove Halhjem Kjeilen. Consultant in medical issues and classification has been Dr. Eystein Glattre, The Cancer Registry of Norway. Responsible for this publication is Head of Division Ann Lisbet Brathaug , Division of Health Statistics.

Statistics Norway,
Oslo/Kongsvinger, 22 February 2000

Svein Longva

Johan-Kristian Tønder

Innhold

Tabellregister.....	7
1. Bakgrunn og formål	9
2. Opplegg, gjennomføring og kvalitet.....	9
2.1. Omfang.....	9
2.2. Statistikkens grunnlag og kvalitet	9
2.3. Klassifisering og koding.....	9
3. Begrep og kjennemerker.....	10
4. Betydning av klassifikasjonsskifte	11
5. Merknader til tabellen	11
5.1. Merknader til tabellene.....	11
5.2. Noen hovedresultater	12
6. Annen statistikk	13
Vedlegg	
A. Dødsmelding	223
B. Europeisk forkortet dødsårsaksliste (ICD-10)	227
Tidligere utkommet på emneområdet	229
De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk	231

Contents

Index of tables	8
1. Background and purpose	14
2. Design, procedure and quality	14
2.1. Coverage	14
2.2. Statistical basis and quality	14
2.3. Classification and coding	14
3. Terms and variables	14
4. Change of Classification	15
5. Remarks to the tables/Some main results	15
5.1. Remarks to the tables	15
5.2. Some main results	16
6. Other statistics	16
Appendices	
A. Medical death certificate	223
B. European ICD-10 short-list for causes of death	227
Previously issued on the subject	229
Recent publications in the series Official Statistics of Norway	231

Tabellregister

Hovedtabeller. Hele landet

1. Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996. (Detaljert ICD-10 liste)	18
2. Multiple dødsårsaker. Underliggende årsak (A) og nevnt komplikasjon og/eller medvirkende årsak (B). 1996. (Forkortet europeisk liste)	150
3. Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996. (Forkortet europeisk liste)	162
4. Dødelighet etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996. Per 100 000 innbyggere. (Forkortet europeisk liste)	168

Dødsfall omkring fødselen, i første leveår og bland barn

5. Dødsfall blant barn i første leveår etter kjønn, alderstrinn og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996. (Detaljert ICD-10 liste)	174
6. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår. 1936-1998.....	177
7. Dødsfall i første leveår. Fylke. 1986-1996	178
8. Dødsfall blant barn 1-17 år, etter kjønn og underliggende dødsårsak. 1996.....	179

Årsaksgrupper

9. Dødelighet av hjerte- og karsykdommer, etter kjønn og alder. Underliggende dødsårsak. 1951-1996. Per 100 000 innbyggere	180
10. Dødelighet av ondartede svulster, etter kjønn og alder. Underliggende dødsårsak. 1951-1996. Per 100 000 innbyggere	181
11. Dødsfall av ulykker. 1996	182
12. Dødsfall av transportulykker. 1996	183
13. Dødsfall av trafikkulykker etter trafikantgruppe. 1996	184
14. Dødsulykker etter skadested og aktivitet. 1996.....	185
15. Selvmord og selvmordsrate per 100 000 innbyggere, etter kjønn og alder.....	186
16. Selvmord etter dødsmåte.....	187

Dødssted og dødsmåned

17. Dødsfall av underliggende dødsårsak, etter dødssted. Prosent. 1996	188
18. Dødsfall av ulike årsaker, etter dødsmåned. 1996.....	189

Kommune, fylke, Oslo og Bergen

19. Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. Fylke. 1996. (Forkortet europeisk liste)	190
20. Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Oslo. 1996. (Forkortet europeisk liste).....	202
21. Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Bergen. 1996. (Forkortet europeisk liste).....	208
22 Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet etter årsaksgrupper. Kommune. Gjennomsnitt for årene 1992-1996. Per 100 000 innbyggere	213

Andre tabeller

23. Folkemengde etter kjønn og alder. 1996	222
--	-----

List of tables

Main tables. The whole country

1. Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996. (Detailed ICD-10 list)	18
2. Multiple causes of death. Deaths by underlying cause (A) and diagnosis coded as associated cause (B). 1996. (European short list)	150
3. Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996. (European short list)	162
4. Death rates by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996. Per 100 000 population. (European short list)	168

Stillbirths, infant deaths and deaths among children

5. Infant deaths by sex, age intervals and underlying cause of death. The whole country. 1996. (Detailed ICD-10 list)	174
6. Perinatal and infant mortality. 1936-1998	177
7. Infant deaths. County. 1986-1996	178
8. Deaths among children 1-17 years, by sex and underlying cause of death. 1996	179

Different causes

9. Sex and age-specific death rates from cardiovascular diseases. Underlying cause of death. 1951-1996. Per 100 000 population	180
10. Sex and age-specific death rates from malignant neoplasms. Underlying cause of death. 1951-1996. Per 100 000 population	181
11. Deaths by accidents. 1996	182
12. Deaths by transport accidents. 1996	183
13. Deaths by traffic accidents by group of road-user. 1996	184
14. Deaths from accidents, by place of occurrence and activity. 1996	185
15. Suicide and suicide rate, by sex and age	186
16. Suicide by method	187

Place of death and month of death

17. Deaths from underlying cause of death, by place of death. Per cent. 1996	188
18. Deaths from different causes, by month of death. 1996	189

County, Oslo and Bergen

19. Deaths by sex and underlying cause of death. County. 1996. (European short list)	190
20. Deaths by sex, age and underlying cause of death. Oslo. 1996. (European short list)	202
21. Deaths by sex, age and underlying cause of death. Bergen. 1996. (European short list)	208
22. Standardized mortality rate from different causes of death. Sex. Municipality. Per 100 000 population. Annual average. 1992-1996	213

Other tables

23. Population by sex and age. 1996	222
---	-----

1. Bakgrunn og formål

Som medlem av Verdens helseorganisasjon har Norge fra 1. januar 1951 forpliktet seg til å utarbeide offisiell dødsårsaksstatistikk i overensstemmelse med den internasjonale sykdomsklassifikasjonen (ICD) og de prinsipper og retningslinjer som gjelder for koding av dødsårsak. Videre skal opplysning om dødsårsak på dødsmeldingen gis innenfor den ramme som Verdens helseorganisasjon har fastsatt, dvs. felt I og II på "Legeerklæring om dødsfall/melding om unaturlig død" og "Dødsmelding fra lensmann til den offentlige lege" (vedlegg A).

Publikasjonen NOS Dødsårsaker inneholder detaljerte tabeller over dødsfall av de enkelte dødsårsaker. For hele landet gir publikasjonen tall både etter den mest detaljerte internasjonale årsakklassifikasjon og etter forkortet europeisk liste. Publikasjonen gir tall etter den forkortede europeiske listen for hele landet, fylker og kommunene Oslo og Bergen.

I tillegg inneholder publikasjonen tidsserier for dødelighet omkring fødselen og i første leveår, samt for hjerte- og karsykdommer, ondartede svelster og voldsomme dødsfall. Tidsserietabeller er fra 1992-årgangen trykt i publikasjonen NOS Dødsårsaker, mens tabellene i tidligere år ble trykt i publikasjonen NOS Helsestatistikk.

2. Opplegg, gjennomføring og kvalitet

2.1. Omfang

Statistikken omfatter alle døde som på dødstidspunktet var registrert som bosatt i Norge i Det sentrale folkeregister, uansett om dødsfallet fant sted i Norge eller utenfor landets grenser.

2.2. Statistikkens grunnlag og kvalitet

Ved ethvert dødsfall skal det utstedes en medisinsk dødsmelding, enten "Legeerklæring om dødsfall/melding om unaturlig død" eller "Dødsmelding fra lensmann til offentlig lege" (vedlegg A). Legeerklæringen sendes til Skifteretten som utsteder nye dødsmeldinger som gjelder administrative og praktiske sider ved et dødsfall. Skifteretten gir bl.a. melding om dødsfallet til det lokale folkeregisteret. Registreringen i folkeregistrene meldes videre til Det sentrale folkeregister i Skattedirektoratet. Skifteretten sender legeerklæringen videre til communelegen på dødsstedet.

Dødsårsaksstatistikken blir utarbeidet på grunnlag av medisinske dødsmeldinger som sendes Statistisk sentralbyrå fra de offentlige leger. Videre innhentes rutinemessig tilleggsopplysninger fra Kreftregisteret,

Medisinsk fødselsregister, Statistisk sentralbyrås statistikk over veitrafikkulykker samt resultat av obduksjon fra sykehus og rettsmedisinske laboratorier. Fra 1995 har resultat av rettsmedisinske undersøkelser ved Gades institutt vært tilgjengelige. I omrent en tredjedel av dødsfallene kodes underliggende dødsårsak på grunnlag av legemelding sammen med opplysninger fra andre kilder. I de resterende tilfeller foreligger kun informasjon gitt på legeerklæring om dødsfall eller melding om dødsfall i utlandet.

Den største kilde til usikkerhet for dødsårsaksstatistikk, og dermed potensielt største feilkilde, er dels selve dødsårsundersøkelsen og dels legens rapportering av informasjon på dødsmeldingen. Tilleggsinformasjon, samt tilbakespørring til lege, er følgelig av vesentlig betydning for å sikre kvaliteten på opplysning om dødsårsak. Opplysning om avdødes bostedskommune og flere andre sivile kjennemerker innhentes fra Det sentrale folkeregister.

Dødsfall registrert på grunnlag av medisinsk dødsmelding kobles mot dødsfall registrert i Det sentrale folkeregister. Denne koblingen sikrer statistikkens komplettethet, og årlig mangler omtrent 1 prosent av de medisinske dødsmeldingene. Statistisk sentralbyrå sender så purring til kommunelegene for å få inn de manglende meldinger eller avskrift av tidligere utstedte meldinger som ikke har nådd Statistisk sentralbyrå. Dødsfall som fortsatt mangler legemelding når statistikken skal utarbeides, og som det ikke foreligger andre opplysninger for, blir registrert med ukjent dødsårsak.

Melding om nordmenn som dør under midlertidig opphold i utlandet, sendes inn til Statistisk sentralbyrå gjennom Utenriksdepartementet. I noen tilfeller kommer meldingen fra Sentralkontoret for folkeregistrering i Skattedirektoratet. Disse dødsfallene inkluderes i statistikken.

Hjemmelsgrunnlaget for innsending av dødsmelding inneholdende opplysning om dødsårsak er legloven av 13. juni 1980, § 40 (melding om fødsler og dødsfall) 2. ledd. Innhenting av tilleggsopplysninger (tilbakespørring til utsteder) skjer også med hjemmel i leglovens § 40. Registersamarbeidet med Kreftregisteret og Medisinsk fødselsregister er hjemlet i forvaltningslovens § 13 b, nr. 4. Innsending av obduksjonsresultat er regulert av Forskrift om obduksjon m.m. fastsatt ved kongelig resolusjon av 18. mars 1988 med hjemmel i lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. av 9. februar 1973, § 7 i 6. ledd.

2.3. Klassifisering og koding

Rubrikk for opplysning om dødsårsak på dødsmeldingen er redigert i samsvar med Verdens helseorganisasjons anbefaling. Retningslinjer for legen ved utfylling

av dødsmeldingen er gitt på skjemaets baksiden (vedlegg A) samt i en egen rettledning utgitt av Sosial- og helsedepartementet (trykt som vedlegg i NOS C 490 Dødsårsaker 1995).

Ved klassifikasjon og koding skal man så vidt mulig velge den underliggende dødsårsak som er oppgitt av legen som utstedte legeerklæringen. Hvis oppgitt underliggende årsak er høyst usannsynlig sier regler og retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon at man bør søke å få oppklart saken med legen som utstedte meldingen. Der det ikke er mulig å få svar på eventuelle spørsmål kommer reglene for valg av underliggende årsak til anvendelse.

Dødsfall som har funnet sted i utlandet, blir registrert under den årsak som er oppgitt på meldingen fra utlandet, eventuelt uten dødsårsak hvis opplysning ikke foreligger.

Statistisk sentralbyrå innhenter tilleggsopplysninger om:

- 1) Alle dødsfall hvor meldingen inneholder opplysninger om svulster (samarbeid med Kreftregisteret),
- 2) En rekke dødsfall av sykdommer hvor opplysning om dødsårsak ikke er fullstendig for en spesifikk registrering,
- 3) En rekke dødsfall på grunn av skader og forgiftninger hvor opplysningene om ytre omstendighet mangler eller er ufullstendige,
- 4) Plutselig død - i de tilfelle det er grunn til å anta at en vil kunne få nærmere opplysninger om de ytre omstendigheter ved dødsfallet.

Tilleggsopplysningene blir innhentet i samarbeid med Statistisk sentralbyrås medisinske konsulent.

3. Begrep og kjennermerker

Alder er regnet ut i fylte år på dødstidspunktet.

Dødsårsakene er fra 1996 klassifisert og kodet etter den detaljerte liste i International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10, Volume 1 (World Health Organization, Geneva 1992). Regler og retningslinjer for mortalitetskoding og valg av underliggende dødsårsak finnes i ICD-10 Volume 2 (World Health Organization, Geneva 1993). ICD-9s regler og prinsipper for mortalitetskoding finnes som vedlegg i NOS C 490 Dødsårsaker 1995.

For klassifisering av underliggende dødsårsak gjelder prinsippet at den sykdom eller ytre årsak til skade som etter legens mening startet rekken av de tilstander som ledet direkte til døden skal registreres som under-

liggende dødsårsak. I tillegg ble det i 1996 kodet inntil seks andre årsaker (tilstander som direkte førte til døden og medvirkende årsaker). Det er den underliggende dødsårsak som brukes i internasjonal dødsårsaksstatistikk.

Underliggende dødsårsak er definert som:

- a) den sykdom eller skade som startet rekken av de sykelige tilstander som ledet direkte til døden eller
- b) de ytre omstendigheter ved den ulykke eller voldshandling som var årsaken til den dødelige skade.

Tilstanden oppført på nederste linje i del I på dødsmeldingen er vanligvis den underliggende dødsårsak. ICDs regler og retningslinjer kan imidlertid resultere i at en annen tilstand (sykdom eller ytre skadeårsak) blir valgt som underliggende dødsårsak. For å skille mellom disse to mulighetene har ICD-10 innført begrepet opprinnelig, forutgående årsak (originating antecedent cause) om den tilstand som er oppført på nederste, utfylte linje i del I. Underliggende dødsårsak brukes om den årsak som velges med henblikk på tabulering.

Med umiddelbar dødsårsak menes den sykdom, skade eller tilstand som direkte førte til døden, og som er forårsaket av den underliggende dødsårsak.

Med komplikasjon menes tilstand som er en direkte følge av den underliggende dødsårsak (umiddelbar og mellomliggende dødsårsak) og med medvirkende dødsårsak menes tilstand som kan ha bidratt til dødens inntreden, men som ikke står i direkte årsaksforhold til den sykdom eller tilstand som har fremkalt døden.

Dødsårsaksstatistikken avviker fra ICD-10 (engelsk utgave) på følgende områder:

Fjerdekategorier for R99 (Andre dårlig definerte og uspesifiserte dødsårsaker);

- R99.0 Dødsårsak kan ikke fastslås (lege eller annen sakkyndig person har ikke kunnet fastslå årsak til død)
- R99.8 Dødsårsak ikke oppgitt (mottatt skjema/dokument mangler informasjon om dødsårsak, f.eks. dokument fra utlandet)
- R99.9 Opplysning mangler (dødsfall er registrert i Det sentrale folkeregister, ikke meldt til Dødsårsaksregisteret).

Brudd i lårben (fractura femoris) hvor ytre omstendighet er ukjent eller uoppgett blir kodet med W19 (uspesifisert fall) som underliggende dødsårsak. Slike tilfeller skal ifølge ICD-10 ha X59 (uspesifisert ulykke) som underliggende årsak, jf. ICD-10, Volume 3 (1994) side 600.

I publikasjonen NOS C 490 Dødsårsaker 1995 finnes oversikt over de punkter hvor dødsårsaksstatistikken avviker fra norsk og engelsk utgave av ICD-9, samt avvik fra retningslinjer for valg av underliggende årsak. Norsk utgave av ICD-9 ble benyttet i årene 1986-1995, mens norsk utgave av ICD-8 ble benyttet i årene 1969-1985.

4. Betydning av klassifikasjonsskifte

Dødsårsaksstatistikken er fra 1996 klassifisert og kodet etter 10. revisjon av Verdens helseorganisasjons internasjonale sykdomsklassifikasjon (ICD), International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision. Den 10. revisjon av ICD er den siste i rekken som bygger på Jacques Bertillons internasjonale klassifikasjon av dødsårsaker av 1893. Den tradisjonelle strukturen i ICD er beholdt i 10. revisjon, men det tidligere numeriske kodesystemet er erstattet med et alfanumerisk system. Dette utvider rammen med mer enn det dobbelte sammenliknet med ICD-9. Imidlertid er ikke alle tilgjengelige koder brukt i ICD-10, noe som åpner for at senere revisjoner kan gjennomføres uten forskyvning av nummereringen.

ICD-10 består av 21 kapitler. Det første tegnet i ICD-koden er en bokstav. Fire kapitler (I, II, XIX og XX) stekker seg over mer enn en bokstav. Kapittel I-XVII omhandler sykdommer, sykdomstilstander og symptomer. Kapittel XX omhandler ytre årsaker til dødsfall. I mortalitetsstatistikk skal kapittel XIX (S00-T98) ikke brukes som underliggende dødsårsak, men som ev. tilleggskoder til kapittel XX (V01-Y89). Kapittel XXI (Z00-Z99) brukes ikke i mortalitetsstatistikken.

Sammenlikning av dødsårsaker (på detaljert nivå) klassifisert etter forskjellige ICD-revisjoner medfører vanskeligheter, både pga. forskjell i innhold og endring i regler for valg av underliggende dødsårsak. Blant annet har antall kategorier kategorier på 4. tegnsnivå blitt bortimot doblet fra 6 969 kategorier i ICD-9 til 12 420 i ICD-10. Det finnes ingen enkel relasjon mellom kodene i de to revisjonene. Verdens helseorganisasjon har utarbeidet en oversettelse mellom 9. og 10. revisjon (Translator, Ninth and Tenth Revision, WHO, Geneva 1997) hvor det bl.a. fremgår at kun 2 200 koder er entydige i begge versjonene.

Eurostat har utarbeidet en forkortet liste av ICD-10 til bruk ved internasjonal sammenlikning. Listen består av 65 dødsårsaksgrupper med oversettelse til ICD-9 og ICD-8 (vedlegg B).

5. Merknader til tabellene/Noen hovedresultater

5.1. Merknader til tabellene

Tabell 1 viser dødsfall etter underliggende dødsårsak, etter ICD-10s detaljerte klassifikasjonsliste på firetegnsnivå, unntatt for ulykker, selvmord, drap og usikker ytre årsak (ICD-10 kodene V01-Y34) som publiseres på tretegnsnivå.

Tabell 2 viser multiple dødsårsaker; etter underliggende og andre nevnte årsaker (tilstander forårsaket av underliggende dødsårsak samt medvirkende) fordelt på kjønn og aldersgrupper, gruppert etter den europeiske årsakslisten. For fallulykker (årsaksgruppe nr. 61) kan det kun oppgis tall for underliggende dødsårsak i 1996. Tallet på komplikasjoner og medvirkende årsaker er høyere enn summen av kodene A00-R99 og V01-Y89 grunnet at kapitlene S00-T98 er inkludert i summen. S00-T98 brukes ikke som underliggende årsak, men som tilleggskoder til V01-Y89 (ytre skadeårsak).

Tabell 3 viser dødsfall etter den europeiske forkortede ICD-10-årsakslisten.

Tabell 4 viser kjønns-, alders- og årsaksspesifikke rater per 100 000 innbyggere.

Tabellene 5-8 gir statistiske oppgaver over dødsfall omkring fødselen og i første leveår, med tidsserier for perinatal- og spedbarndødelighet samt dødsårsaker blant barn i alderen 1-17 år.

Tabellene 9-10 gir tidsserier over dødelighet som følge av hjerte- og karsykdommer og ondartede svulster.

Tabellene 11-16 viser dødsfall som følge av ulykker, transportulykker, ulykkessted og aktivitet samt tidsserier for selvmord og selvmordsmetode.

Tabellene 17-18 viser dødsårsaker etter dødssted (i og utenfor institusjon) og dødsmåned.

Tabellene 19-21 viser dødsårsaker (europeisk kortliste) etter kjønn og fylke samt etter kjønn og alder for Oslo og Bergen.

Tabell 22 viser totaldødelighet og dødelighet av hjerte- og karsykdommer og kreft på kommunenivå i 5-årsperioden 1992-1996. Ratene er kjønns- og aldersstandardiserte over 5-årige aldersklasser. Som standardbefolking er brukt summen av menn og

kvinner i 5-årige aldersklasser i hele landet 1. januar 1981. Dødsfall i kretsene Sentrum og Marka i Oslo er inkl. i det samlede tall for Oslo og i byregionene, men ikke i bydelstallene. Bydelene i Oslo er inndelt i seks byregioner:

- Indre vest (bydelene 1-3,26).
- Indre øst (bydelene 4-6).
- Ytre vest (bydelene 23-25).
- Ytre øst (bydelene 14-20).
- Nord (bydelene 21-22, 27).
- Syd (bydelene 7-13).

I tabell 22 er konfidensintervall oppgitt for dødelighetsraten i første kolonne. Dette er et mål på den usikkerhet som gjør seg gjeldende når man tolker raten som uttrykk for et dødelighetsmønster i kommunen. Når f.eks. konfidensintervallet for landstallet på 891 ligger mellom 886 og 895, vil det si at dette intervallet med 95 prosent sikkerhet omslutter det underliggende dødelighetsmønster. Et konfidensintervall for de andre kolonnene i tabellen ville vist større usikkerhet, siden ratenes usikkerhet øker når de bygger på færre dødsfall og lavere folkemengde. Nivået på ratene i tabell 22 er ikke fullt ut sammenliknbar med tabell 26 i NOS Dødsårsaker 1995. Nedgangen i dødelighet (nasjonalt nivå) er noe mindre enn hva som fremkommer ved å sammenlikne de to tabeller.

Middelfolkemengde etter kjønn og 5-årige aldersgrupper er gitt i tabell 23, slik at brukere av publikasjonen selv kan beregne rater utover de som er publisert.

5.2. Noen hovedresultater

I 1996 døde 43 919 personer, 22 127 menn og 21 792 kvinner. 95 prosent av dødsfallene var forårsaket av sykdom, mens resten skyldtes ytterligere årsak til skader og forgiftninger. Statistikken viser underliggende dødsårsak og omfatter personer som på dødstidspunktet var bosatt i Norge, uansett om dødsfallet fant sted i eller utenfor landets grenser.

Hjerte- og karsydommer forårsaket 44 prosent av alle dødsfall, mens 24 prosent skyldtes ondartede svulster. Sykdommer i åndedrettsorganene utgjorde 9 prosent av alle dødsfall. Ulykker, selvmord, drap og annen voldsom død utgjorde 5 prosent av alle dødsfall i 1996.

19 498 døde av hjerte- og karsydommer i 1996. Bortimot halvparten av disse dødsfall skyldtes ischemisk hjertesykdom (manglende blodgjennomstrømning i hjertemuskelens pulsårer, dvs. i kransarterier), mens en drøy fjerdedel skyldtes cerebrovaskulære sykdommer (sykdommer i hjernens blodkar).

Dødeligheten av hjerte- og karsydommer blant menn og kvinner i de enkelte aldersgrupper viser nedgang. Ser man noen tiår tilbake, har det skjedd en meget

positiv utvikling, og i alle aldersgrupper må vi tilbake til begynnelsen av 1950-årene for å finne samme lave nivå.

Redusert hjerte- og kardødelighet

Dødeligheten av hjerte- og karsydommer blant menn i aldersgrupper over 40 år økte frem til begynnelsen av 1970-årene. Etter denne tid er det registrert en klar nedgang, slik at dødeligheten av hjerte- og karsydommer blant menn i nevnte aldersgrupper nå ligger på et lavere nivå enn på begynnelsen av 1950-årene. Blant menn i alderen 60-69 år var dødeligheten av hjerte- og karsydommer 1 315 per 100 000 innbyggere i årene 1971-1975, mens tilsvarende tall i 1995 og 1996 var 886 og 753. Blant kvinner nådde dødeligheten av hjerte- og karsydommer høyeste nivå på begynnelsen av 1960-årene, mens det deretter har vært en klar nedgang. For kvinner i alderen 60-69 år var tallene henholdsvis 688, 308 og 255 per 100 000 innbyggere i årene 1961-1965, 1995 og 1996. En del av nedgangen fra 1995 til 1996 kan skyldes overgangen fra 9. til 10. revisjon av ICD.

Den høyeste dødelighet av hjerte- og karsydommer i perioden 1992-1996 hadde menn og kvinner i Finnmark. Menn med bosted i Finnmark på dødstidspunktet hadde 56 prosent høyere hjerte- og kardødelighet sammenliknet med menn i Sogn og Fjordane. Dødeligheten av hjerte- og karsydommer blant kvinner var 45 prosent høyere i Finnmark sammenliknet med Hordaland som hadde lavest nivå i 1992-1996.

Ondartede svulster

Kreft er ondartet (malign) svulst, som innebærer rask og ukontrollert vekst av celler. Svulster kan utvikles hvor som helst i kroppen. Spredning av kreft til andre kroppsdelar (metastase) kan skje gjennom blod- og lymfesystemet. Den første svulsten kalles primærkreft. Der det foreligger opplysninger om den primære kreftformen, registreres denne som underliggende dødsårsak. I 1996 døde 10 643 personer av ondartede svulster, 5 637 menn og 5 006 kvinner. 29 prosent av alle kreftdødsfall i 1996 skyldtes svulster i fordøyelsesorganene og bukhinnen.

Blant menn er svulst i blærehals (prostata), lunge, tykktarm og magesekk de fire hyppigste dødsårsaker blant kreftsykdommer, og stod for 55 prosent av kreftdødsfallene i 1996. Blant kvinner var det ondartet svulst i brystkjertelen, lunge, tykktarm og eggstokk som var de fire vanligste årsaker til kreftdødsfall (til sammen 46 prosent i 1996). Ondartede svulster var årsak til mer enn halvparten av alle dødsfall blant kvinner mellom 35 og 64 år, og først etter 75-årsalderen er hjerte- og karsydommer hyppigere dødsårsak enn kreft blant kvinner. Dødeligheten av brystkreft hos kvinner har holdt seg på samme nivå siden begynnelsen av 1970-årene til i dag. Derimot har

det vært en klar økning i dødeligheten av lungekreft, langt sterke blant kvinner enn blant menn. I aldersgruppen 65-74 år stod lungekreft for 27 prosent av kreftdødsfallene blant menn og 17 prosent blant kvinner i 1996.

Færre selvmord

I 1996 ble det registrert 517 selvmord, 389 menn og 128 kvinner. Raten var 11,8 per 100 000 innbyggere (18,0 for menn og 5,8 for kvinner), og man må tilbake til 1978 for å finne lavere nivå. De vanligste selvmordsmetodene er hengning, skytevåpen og forgiftning. Disse metodene ble benyttet i mer enn 80 prosent av alle tilfellene i 1996. Kvinner benytter imidlertid sjeldent skytevåpen, to tilfeller i 1996, seks i 1995 og fem i 1994.

I 1950- og 1960-årene holdt selvmordsraten seg konstant mellom 7 og 8 per 100 000 innbyggere, svarende til om lag 250 selvmord per år. På slutten av 1960-årene begynte selvmordshyppigheten å øke, og i siste halvdel av 1980-årene var hyppigheten fordoblet til 16 per 100 000 innbyggere. Det tilsvarer 650 selvmord per år. Denne fordoblingen gjaldt både menn og kvinner. Etter 1988, da antall selvmord var 708 (16,8 per 100 000 innbyggere), viser den registrerte selvmordsraten en nedgang. Selvmordsraten var 30 prosent lavere i 1996 enn i 1988.

1 674 dødsulykker i 1996

I 1996 døde 1 674 personer som følge av ulykkeskader, 914 menn og 760 kvinner. Fall var vanligste årsak til ulykkesdødsfall etterfulgt av trafikkulykker, drukning, forgiftning og brann. De fleste fallulykker er lårhalsbrudd blant eldre, med etterfølgende komplikasjoner.

Blant barn i alderen 1-14 år var ulykker årsak til 38 dødsfall i 1996. Tilsvarende tall i årene 1990 til 1995 var 79, 50, 57, 45, 51 og 45.

Dødsfall i første leveår

I 1996 var det 252 dødsfall blant barn i første leveår, mens tilsvarende tall i 1995 var 249. Dette er en nedgang fra 468 i 1989, 428 i 1990, 387 i 1991, 353 i 1992, 305 i 1993 og 314 i 1994. Spedbarnsdødeligheten i 1996 var 4,1 per 1 000 levendefødte, samme som i 1995. Tilsvarende tall i 1989, 1991 og 1993 var 7,9, 6,4 og 5,1.

I 1996 ble det registrert 29 krybbedødsfall (Sudden Infant Death Syndrome) i den postneonatale periode (dødsfall etter utgangen av 4. leveuke, men før barnet har fylt 1 år). Tilsvarende tall i 1989 var 140.

6. Annen statistikk

I utgangspunktet skal dødsårsaksstatistikken være internasjonalt sammenliknbar for land som bruker ICD og de regler og prinsipper som gjelder for rapportering, klassifisering og koding av underliggende dødsårsak. I praksis er det imidlertid flere forhold som bidrar til at slik sammenlikning kan være vanskelig. Det kan være forskjell i diagnostisk kultur, informasjonsgrunnlag og mulighet for å innhente tilleggsopplysning og spørre tilbake til utsteder, kodepraksis og tilgjengelig kompetanse og ressurser.

Befolkningsstatistikken inneholder oversikter over dødsfall og dødfødte, basert på registrering i Det sentrale folkeregister i Skattedirektoratet. Fra 1986 er det ikke samsvar mellom antall dødsfall i befolknings- og dødsårsaksstatistikken. Bakgrunnen for dette var ønske om bedre aktualitet på befolkningsstatistikken enn på dødsårsaksstatistikken.

Publikasjonen NOS Veitrafikkulykker inneholder tall for drepte i trafikkulykker som er forskjellige fra tall i dødsårsaksstatistikken. Dette skyldes at veitrafikkulykkesstatistikken omfatter ulykker på norske veier uansett om den skadde eller drepte var bosatt i Norge eller i utlandet, mens dødsårsaksstatistikken omfatter personer som på dødstidspunktet var registrert bosatt i Norge. I statistikk over veitrafikkulykker blir kun dødsfall som inntreffer inntil 30 dager etter ulykken tatt med, mens dødsårsaksstatistikken, under gruppen av trafikkulykker, tar med senere dødsfall.

1. Background and purpose

Since 1951, as a member of the World Health Organization, Norwegian causes of death statistics have been collected, classified and edited according to the International Classification of Diseases (ICD). The international form of medical certificate of cause of death recommended by the World Health Assembly is used, i.e. the parts I and II at the certificates (appendix A). The publication NOS Causes of Death contains detailed tables on deaths by causes of death. For the whole country tables are given both according to the International detailed list and the European ICD-10 Causes of Death Short-list.

The publication also gives data for county, and separate tables for the cities Oslo and Bergen.

The publication also contains time series for perinatal and infant mortality, cardiovascular diseases, malignant neoplasm and suicide.

2. Design, procedure and quality

2.1. Coverage

The statistics of causes of death comprise all deceased persons registered as resident in the civil population registers at the time of death, whether the death occurred in Norway or abroad.

2.2. Statistical basis and quality

The causes of death statistics are compiled from medical death certificate (appendix A), issued by physicians. The death certificates are submitted to Statistics Norway from the public health officers in the municipalities. Additional information is collected from the Cancer Registry (deaths of malignant neoplasm's). The Medical Birth Registry (infant deaths and stillbirths), results from autopsy from hospitals and forensic institutes, and information from statistics on road traffic accidents in Statistics Norway. Furthermore, when conditions entered on the certificate is insufficient for coding the underlying cause of death, i.e. where the General Principle cannot be applied, Statistics Norway have to clarify with the certifier whenever possible.

The quality of the causes of death statistics varies and reflecting the physicians' opinion on the underlying cause of death. The main source of uncertainty and error is partly the examination of the deceased and partly information on entries of the cause of events leading to death given on the death certificate. Additional information, and request and clarifying with

the certifier are essential for the work with checking the quality of the cause of death.

About a third of all causes of death, the diagnostic evidence was medical certificate together with additional information. 11 per cent was based on result from autopsy.

The medical certificates are matched against the civil registration of death in the Central Population Register. This match is important and results in coverage up to 100 per cent. Deaths for which medical certificates have not been received before the compilation deadline, are registered with unknown cause of death. Notifications of deaths occurring abroad are received through the Ministry of Foreign Affairs, and are registered to the cause stated in the notification (issued by Norwegian consulates or other sources).

2.3. Classification and coding

The medical certificate of death is designed to elicit the information, which will facilitate the selection of the underlying cause of death, i.e. the disease or external cause that initiated the sequence of events which led to death. If the selected cause is an external cause an additional code from ICD's chapter XIX (S00-T98) is used to identify the nature of the injury, as recommended by the World Health Organization.

Guidelines to physician for filling in the certificate are given on the back of the form (appendix A) and in a special publication (published as appendix in NOS C 490 Causes of Death 1995).

Statistics Norway collects additional information on:

- 1) All death certificates entered the presence of cancer (tumor) - which are matched against the files of the National Cancer Register,
- 2) A number of deaths from diseases, when the information is insufficient for a specific classification,
- 3) A number of deaths caused by injuries and poisoning, without information or with incomplete information about the external circumstances,
- 4) Sudden deaths - in cases where there is reason to believe that further information on the external circumstances may be obtained.

The additional information is collected in co-operation with the medical consultant of Statistics Norway.

3. Terms and variables

In all tables giving age specifications, age is completed years at the date of the event.

The causes of death are coded in accordance with the detailed list in the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Tenth Revision. Volume 1 (World Health Organization, Geneva 1992). Rules and guidelines for mortality coding are printed in ICD-10, Volume 2 (WHO, Geneva 1993).

It was agreed by the 6th Decennial International Revision Conference that the cause of death for primary tabulation should be designed by the underlying cause of death. The underlying cause is defined as:

- "(a) the disease or injury which initiated the train of morbid events leading directly to death, or
- (b) the circumstances of the accident or violent which produced the fatal injury".

When more than one condition is entered on the certificate, the condition recorded alone on the lowest used line in part I of the certificate is usually the underlying cause of death used for tabulation. However, the General Principle states that the condition at the lowest used line in part I should only be selected if it could have given rise to all the conditions entered above it, i.e. rules and guidelines may result in the selection of another condition as underlying cause of death.

The causes of death statistics divergence at some point from ICD-10:

Categories are added to R99 (Other ill-defined and unspecified cause of mortality);

- R99.0 Cause of death cannot be stated (physician or other expert cannot state the cause of death)
- R99.8 Cause of death not entered (certificate or other document have not information on causes of death, i.e. document from foreign counties)
- R99.9 No information (the death is recorded in the Central Population Register and not reported to the causes of death statistics)

Fracture of femur where external circumstances is not entered, unspecified fall (W19) is selected as underlying cause. According to ICD-10 fracture with circumstances unknown or unspecified should have accidental exposure to unspecified factor (X59) as underlying cause, ref. ICD-10, Volume 3 (1994) p. 600.

The publication NOS C 490 Causes of Death 1995 give survey on the points the causes of death statistics divergence from the Norwegian and the English edition of the ICD-9. The causes of death statistics used Norwegian edition of ICD-9 in the period 1986-1995,

and in the period 1969-1985 the Norwegian edition of ICD-8 were used.

4. Change of Classification

From 1996 the causes of death statistics are classified and coded in accordance with the detailed list in the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision. The ICD is a variable-axis classification, developed by William Farr and resulted in the classification prepared by Jacques Bertillon in 1893; The Bertillon Classification of Causes of Death. The pattern from William Farr can be identified in the chapters of ICD-10. In place of the purely numeric coding system of previous revisions, the Tenth Revision uses an alphanumeric code with a letter in the first position. The classification is divided into 21 chapters. Four chapters (I, II, XIX and XX) use more than one letter in the first position of the block. Chapter I-XVIII relate to diseases, other morbid conditions, and symptoms and ill-defined conditions. Chapter XX covers external causes of mortality. Chapter XIX (S00-T98) is not used for underlying cause and chapter XXI (Z00-Z99) is not used in mortality coding.

It is difficult to make comparisons over time on causes of death statistics at a detailed level, partly due to loss of equivalence between ICD-10 and earlier revisions and partly to changes in rules for selection of underlying cause. The number of categories at 4th level is almost doubled from the 9th to 10th revision (12 420 codes) and there is no simple relation between the codes in the two revisions. World Health Organization has published a translator (Translator, Ninth and Tenth Revision, WHO, Geneva 1997) were it is underlined that only 2 200 codes are unique in both in both 9th and 10th revision.

The European ICD-10 Causes of Death Short-list, prepared by Eurostat, cover 65 aggregated groups with codes from ICD-8, ICD-9 and ICD-10 (appendix B).

5. Remarks to the tables/ Some main results

5.1. Remarks to the tables

Table 1 contains deaths by underlying cause of death according to ICD-10's detailed list with four-character categories, by sex and age. Codes between V01-W34 are only published at three-character categories.

Table 2 gives multiple causes of death; deaths by underlying and other events and conditions according to the European ICD-10 Short-list.

Table 3 gives deaths by underlying cause of death and table 4 gives mortality rates, both according to the European Short-list.

Tables 5-8 give stillbirths, infant deaths, perinatal and infant mortality and causes of death among children 1-17 years old.

Tables 9-10 contain time series for deaths by cardiovascular diseases and malignant neoplasm.

Table 11- 16 give deaths by transport accidents, traffic accidents, accidents by place of occurrence and activity, and time series for suicide and suicide methods.

Tables 17-18 give causes of death by place of death and month of death.

Tables 19-21 give causes of death by county, and the cities Oslo and Bergen.

Table 22 give total mortality and mortality by diseases of the circulatory system and cancer in the municipalities. The rates are sex and age standardised. The standard population is the total population by 5-years age groups per 1 January 1981. Confidence intervals (95 per cent) are given for the total mortality rate.

Population data by sex and age are given in table 23, making it possible to calculate other death rates than those already published.

5.2. Some main results

In 1996 43 919 deaths were registered, of which 22 127 men and 21 792 women. 95 per cent of all deaths in 1996 were caused by disease, including symptoms, signs and ill-defined conditions. 5 per cent were external causes. The statistics show underlying cause of death and include all deaths, occurring in Norway or abroad, among the population with permanent residence in Norway.

In 1996 20 786 men and 20 874 women died from diseases, while 1 341 men and 918 women died as a result of external causes. 44 per cent of all deaths in 1996 were due to diseases of the circulatory system. Half of these deaths were caused by ischaemic heart diseases. Malignant neoplasm (cancer) caused 24 per cent of the deaths in 1996. Data on primary site show that 29 per cent of cancer deaths were due to malignant neoplasm of the digestive organs. Among male cancer of prostate, lung, colon and stomach are the most frequent causes of death of the cancer diseases (55 per cent of all men's cancer deaths in 1996). Among women cancer of breast, lung, colon and ovary are the most frequent causes of cancer deaths (46 per cent in 1996).

The highest mortality of cardiovascular diseases in the period 1992-1996 is found in Finnmark for both sexes. Among men the cardiovascular mortality was 56 per cent higher in Finnmark compared with men in Sogn and Fjordane. The cardiovascular mortality among women was 45 per cent higher in Finnmark compared with women in Hordaland (county with lowest level).

In 1996 1 674 deaths were caused by accidents, 914 men and 760 women. Falls and motor vehicle traffic are the most frequent accidents causes followed by drowning, accidental poisoning and fire.

517 deaths were caused from suicide in 1996, 389 men and 128 women. There was an increase in the suicide rate from 7.8 per 100 000 population in the 1950s and 1960s to 16 in the end of the 1980s. From 1988 to 1996 the suicide rate have decreased with 30 per cent, from 16.8 per 100 000 (708 suicide) in 1988 to 11.8 in 1996.

6. Other statistics

The population statistics give figure for deaths, and the statistics include all deaths among resident population of Norway. From 1928 to 1985 the number of deaths was accordance in the population - and the causes of death statistics. From 1986 the figure is not corresponding.

The statistics on road traffic accidents cover accidents that have taken place in Norway and have been reported by the police. The number of persons killed according to statistics on road traffic accident is not quite comparable with deaths by traffic accident in the causes of death statistics. The road traffic accident statistics include foreigners being killed in road traffic accident in Norway, while causes of death statistics cover deaths among residents in Norway, whether the death occurred in Norway or abroad.

Tabell 1. Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
DØDSFALL I ALT DEATHS, TOTAL								
		M	22 127	144	41	24	26	73
		F	21 792	108	24	11	14	33
A00-R99	Sykdommer i alt <i>Deaths from diseases, total</i>	M	20 786	144	32	14	12	27
		K	20 874	104	18	8	5	8
A00-B99	I. VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER	M	221	-	7	1	1	1
		K	215	2	3	-	-	-
A045	Enteritt som skyldes Campylobacter	M	1	-	-	-	-	-
A047	Enterokolitt som skyldes Clostridium difficile	M	5	-	-	-	-	-
		K	10	-	-	-	-	-
A048	Andre spesifiserte bakterielle tarminfeksjoner	K	1	-	-	-	-	-
A080	Rotavirusenteritt	K	1	1	-	-	-	-
A09	Diarø og gastroenteritt med antatt infeksiøs årsak	M	26	-	1	-	-	-
		K	43	-	-	-	-	-
A150	Lungetuberkulose bekreftet ved mikroskopi av sputum med eller uten kultur	M	1	-	-	-	-	-
A162	Lungetuberkulose, bakteriologisk eller histologisk bekrefte ikke nevnt	M	3	-	-	-	-	-
A169	Uspesifisert tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk eller histologisk bekrefte ikke	M	5	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
A191	Akutt miliærtuberkulose, flere lokalisasjoner	M	2	-	-	-	-	-
A199	Uspesifisert miliærtuberkulose	M	1	-	-	-	-	-
A319	Uspesifisert infeksjon som skyldes mykobakterier	K	1	-	-	-	-	-
A35	Annen stivkrampe (tetanus)	K	1	-	-	-	-	-
A392	Akutt meningokokkemi	M	4	-	3	-	-	1
		K	5	1	2	-	-	-
A394	Uspesifisert meningokokkemi	M	1	-	1	-	-	-
		K	2	-	1	-	-	-
A399	Uspesifisert meningokokkinfeksjon	M	1	-	-	-	-	-
A400	Sepsis som skyldes Streptococcus, serogruppe A	M	2	-	1	-	-	-
A401	Sepsis som skyldes Streptococcus, serogruppe B	M	1	-	-	-	-	-
A403	Sepsis som skyldes Streptococcus pneumoniae	M	4	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-
A409	Uspesifisert streptokokksepsis	K	1	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
187 55	179 77	213 121	293 175	490 290	666 425	763 468	1 164 653	1 936 1 125	3 285 1 969	4 092 3 160	3 975 4 388	2 795 4 513	1 654 4 143		
89 30	106 54	143 103	215 153	405 259	596 391	701 448	1 108 629	1 868 1 093	3 181 1 923	3 977 3 075	3 854 4 263	2 683 4 335	1 586 3 951	A00-R99	
5 2	6 2	8 1	11 1	8 -	14 2	7 2	5 5	13 10	21 18	35 25	25 46	33 50	18 46	A00-B99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A045
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	A047
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A048
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A080
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	4	5	8	20	A09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	A162
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	A169
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	A191
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A199
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A319
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A392
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A394
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A399
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A400
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A401
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	A403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A409	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
A410	Sepsis som skyldes <i>Staphylococcus aureus</i>	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	-
A411	Sepsis som skyldes andre spesifiserte stafylokokker	K	1	-	-	-	-	-	-
A412	Sepsis som skyldes uspesifiserte stafylokokker	M	3	-	-	-	-	-	-
A415	Sepsis som skyldes andre gram-negative organismer	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-	-
A418	Annen spesifisert sepsis	K	2	-	-	-	-	-	-
A419	Uspesifisert sepsis	M	57	-	-	-	-	-	1
		K	63	-	-	-	-	-	-
A46	Erysipelas [Rosen]	M	5	-	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-	-
A480	Gassgangren	M	1	-	-	-	-	-	-
A498	Andre bakterieinfeksjoner med uspesifisert lokalisasjon	K	1	-	-	-	-	-	-
A499	Uspesifisert bakterieinfeksjon	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
A810	Creutzfeldt-Jakobs sykdom	K	2	-	-	-	-	-	-
A818	Andre spesifiserte atypiske virusinfeksjoner i sentralnervesystemet	M	1	-	-	-	-	1	-
A86	Uspesifisert virusencefalitt	M	1	-	-	-	-	-	-
B004	Herpesencefalitt	K	1	-	-	-	-	-	-
B021	Zostermenigit	K	1	-	-	-	-	-	-
B028	Herpes zoster med andre komplikasjoner	K	1	-	-	-	-	-	-
B029	Herpes zoster uten komplikasjoner	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
B169	Akutt hepatitt B uten delta-agens og leverkoma	K	1	-	-	-	-	-	-
B182	Kronisk virushepatitt C	M	2	-	-	-	-	-	-
B199	Uspesifisert virushepatitt uten koma	M	1	-	-	-	-	-	-
B201	Hiv-sykdom med andre bakterieinfeksjoner	K	1	-	-	-	-	-	-
B202	Hiv-sykdom med cytomegalovirussykdom	M	1	-	-	-	-	-	-
B206	Hiv-sykdom med pneumoni som skyldes <i>Pneumocystis carinii</i>	M	1	-	-	-	-	-	-
B207	Hiv-sykdom med flere infeksjoner	M	3	-	-	-	-	-	-
B208	Hiv-sykdom med andre spesifiserte infeksjons- og parasittsykdommer	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	A410	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A411	
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	A412	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	A415	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	A418	
-	-	1	-	-	1	-	-	5	7	13	9	15	5	A419	
-	-	1	-	1	1	-	3	5	6	15	19	12	-		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	A46	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A480	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A498	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A499	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	A810	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A818	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A86	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	B004	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	B021	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	B028	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	B029	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	B169	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	B182	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	B199	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B201	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B202	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	B206	
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B207	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B208	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
B209	Hiv-sykdom med uspesifisert infeksjons- eller parasittsykdom	M	1	-	-	-	-	-
B210	Hiv-sykdom med Kaposis sarkom	M	3	-	-	-	-	-
B212	Hiv-sykdom med andre typer non-Hodgkins-lymfon	M	3	-	-	-	-	-
B213	Hiv-sykdom med andre ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk og beslektet vev	K	1	-	-	-	-	-
B218	Hiv-sykdom med andre spesifiserte ondartede svulster	M	1	-	-	-	-	-
B219	Hiv-sykdom med uspesifisert ondartet svulst	M	1	-	-	-	-	-
B220	Hiv-sykdom med encefalopati	M	1	-	-	-	-	-
B222	Hiv-sykdom med avmagringssyndrom	M	1	-	-	-	-	-
B227	Hiv-sykdom med flere sykdommer, klassifisert annet sted, som følge	M	7	-	-	-	-	-
B24	Uspesifisert humant immunsviktivirus-sykdom [hiv-sykdom]	M	21	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
B279	Uspesifisert mononukleose	M	1	-	-	-	-	1
B341	Uspesifisert enterovirusinfeksjon	M	1	-	1	-	-	-
B349	Uspesifisert virusinfeksjon	M	1	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-
B376	Candidaendokarditt	K	1	-	-	-	-	-
B441	Annen pulmonal aspergillose	M	2	-	-	-	-	-
B449	Uspesifisert aspergillose	M	1	-	-	-	-	-
B49	Uspesifisert soppsykdom	K	1	-	-	-	-	-
B902	Følgetilstander etter tuberkulose i ben og ledd	M	1	-	-	-	-	-
B909	Følgetilstander etter tuberkulose i åndredrettsorganer og uspesifisert tuberkulose	M	21	-	-	-	-	-
		K	22	-	-	-	-	-
B91	Følgetilstander etter poliomelitt	M	4	-	-	-	-	-
		K	9	-	-	-	-	-
B99	Andre og uspesifiserte infeksjonssykdommer	M	9	-	-	1	-	-
		K	10	-	-	-	-	-
C00-D48	II. SVULSTER I ALT	M	5 786	1	7	9	2	9
		K	5 174	3	5	4	2	9
C00-C97	Ondartet svulster i alt	M	5 637	-	6	8	2	9
		K	5 006	1	4	4	2	9
C00-C14	Ondartet svulster i leppe, i munnhulen og i sveig	M	98	-	-	-	-	-
		K	55	-	-	-	-	2

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age														ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	B209
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	B210
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B212
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B213
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	B218
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B219
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B220
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B222
1	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	B227
-	4	1	5	2	4	2	1	1	1	-	-	-	-	B24
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B279
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B341
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	B349
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B376
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	B441
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	B449
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	B49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	B902
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	7	5	3	-	B909
-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	8	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	B91
-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	B99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	2	-
16	12	25	44	127	225	266	446	700	1 076	1 202	880	525	206	C00-D48
11	25	62	102	178	261	286	355	539	715	854	801	600	361	-
16	12	25	44	125	222	265	443	690	1 054	1 167	847	508	186	C00-C97
11	24	62	102	178	259	281	351	533	700	823	764	566	331	-
1	-	-	1	4	9	6	13	21	12	18	6	6	1	C00-C14
-	-	-	1	-	3	7	6	9	7	7	6	5	2	-

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
C001	Ondartet svulst på utsiden av underleppet	K	1	-	-	-	-	-	-
C01	Ondartet svulst i tungerot	M	5	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
C021	Ondartet svulst på tungerand	M	6	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
C022	Ondartet svulst på undersiden av tungen	M	3	-	-	-	-	-	-
C023	Ondartet svulst på fremre tredjedeler av tungen, uspesifisert del	K	1	-	-	-	-	-	-
C028	Ondartet overlappende svulst i tungen	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
C029	Ondartet svulst på tungen, uspesifisert	M	7	-	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-	-
C030	Ondartet svulst i tannkjøtt i overkjeve	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
C031	Ondartet svulst i tannkjøtt i underkjeve	M	3	-	-	-	-	-	-
C039	Ondartet svulst i tannkjøtt, uspesifisert	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	1
C041	Ondartet svulst i lateral del av munngulv	K	1	-	-	-	-	-	-
C048	Ondartet overlappende svulst i munngulv	K	1	-	-	-	-	-	-
C049	Ondartet svulst i munngulv, uspesifisert	M	13	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
C051	Ondartet svulst i bløte gane	M	4	-	-	-	-	-	-
C052	Ondartet svulst i drøvel	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
C059	Ondartet svulst i gane, uspesifisert	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
C060	Ondartet svulst i kinnslimhinne	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-	-
C069	Ondartet svulst i munn, uspesifisert	M	5	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
C07	Ondartet svulst i ørespyttkjertel	M	4	-	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-	-
C080	Ondartet svulst i submandibularspyttkjertel	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
C090	Ondartet svulst i tonsilleseng	K	3	-	-	-	-	-	-
C098	Ondartet overlappende svulst i mandel	M	1	-	-	-	-	-	-
C099	Ondartet svulst i mandel (tonsilla), uspesifisert	M	7	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
C101	Ondartet svulst på fremre overflate av strupelokk	K	1	-	-	-	-	-	-
C103	Ondartet svulst på bakvegg i oropharynx	K	1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age														ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 C001
-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	C01
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	C021
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	C022
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	C023
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	C028
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	C029
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	C030
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	C031
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	C039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	C041
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	C048
-	-	-	-	1	-	4	2	4	1	1	-	-	-	C049
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	C051
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	C052
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	C059
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	-	-	C060
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	C069
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	C07
-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	C080
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	C090
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	C098
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	2	-	C099
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	C101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	C103

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år
C109	Ondartet svulst i oropharynx, uspesifisert	M	5	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
C113	Ondartet svulst på fremre vegg i nasopharynx	M	1	-	-	-	-	-
C119	Ondartet svulst i nasopharynx, uspesifisert	M	4	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
C12	Ondartet svulst i sinus piriformis	M	4	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
C131	Ondartet svulst i plica aryepiglottica, hypofarygeal side	K	1	-	-	-	-	1
C138	Ondartet overlappende svulst i hypopharynx	K	1	-	-	-	-	-
C139	Ondartet svulst i hypopharynx, uspesifisert	M	12	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-
C140	Ondartet svulst i svelg, uspesifisert	M	2	-	-	-	-	-
C148	Ondartet overlappende svulst i leppe, munnhule og svelg	M	1	-	-	-	-	-
C15-C26	Ondartet svulster i fordøyelsesorganer	M	1 581	-	-	-	-	1
		K	1 522	-	-	-	-	-
C153	Ondartet svulst i øvre tredjedel av spiserør	M	8	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-
C154	Ondartet svulst i midtre tredjedel av spiserør	M	12	-	-	-	-	-
		K	7	-	-	-	-	-
C155	Ondartet svulst i nedre tredjedel av spiserør	M	33	-	-	-	-	-
		K	10	-	-	-	-	-
C159	Ondartet svulst i spiserør (oesophagus), uspesifisert	M	38	-	-	-	-	-
		K	13	-	-	-	-	-
C160	Ondartet svulst i cardia ventriculi	M	61	-	-	-	-	-
		K	24	-	-	-	-	-
C161	Ondartet svulst i fundus ventriculi	M	7	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-
C162	Ondartet svulst i corpus ventriculi	M	29	-	-	-	-	-
		K	27	-	-	-	-	-
C163	Ondartet svulst i antrum pyloricum	M	34	-	-	-	-	-
		K	27	-	-	-	-	-
C164	Ondartet svulst i pylorus	M	15	-	-	-	-	-
		K	13	-	-	-	-	-
C165	Ondartet svulst i curvatura minor ventriculi, uspesifisert	M	17	-	-	-	-	-
		K	9	-	-	-	-	-
C166	Ondartet svulst i curvatura major ventriculi, uspesifisert	M	11	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	C109
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	C113
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	C119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	C12
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	C138
-	-	-	1	1	2	-	-	3	3	-	1	1	-	-	C139
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	C140
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	C148
3 3	3 5	10 5	8 11	38 27	73 59	75 76	152 94	196 125	300 206	311 283	244 296	132 207	35 125	C15-C26	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	1	-	-	C153
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	1	1	3	2	1	1	-	-	-	C154
-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	2	3	3	5	9	4	3	1	-	C155
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	2	-	-	-	-
-	-	1	-	-	2	3	3	6	8	5	6	4	-	-	C159
-	-	1	-	1	-	-	1	5	-	1	1	-	3	-	-
-	1 1	1 -	-	4 2	5 1	6 1	4 -	5 2	10 4	11 6	7 5	6 1	1 1	C160	
-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	1	-	-	C161
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	2	3	3	7	5	3	1	2	C162	
-	-	-	-	-	1	3	2	3	2	6	7	1	2	C163	
-	-	-	-	1	1	5	3	4	7	4	4	2	3	4	C163
-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	5	8	3	4	-	C164
-	-	-	-	1	2	1	2	2	2	-	1	4	4	-	C165
1	-	-	-	-	-	1	1	4	2	5	2	1	-	-	C165
-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	C166

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
C168	Ondartet overlappende svulst i magesekk	M	20	-	-	-	-	-
		K	12	-	-	-	-	-
C169	Ondartet svulst i magesekk, uspesifisert	M	155	-	-	-	-	-
		K	104	-	-	-	-	-
C170	Ondartet svulst i tolvfingertarm	M	5	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-
C171	Ondartet svulst i jejunum	K	2	-	-	-	-	-
C172	Ondartet svulst i ileum	M	4	-	-	-	-	-
		K	7	-	-	-	-	-
C179	Ondartet svulst i tynntarm, uspesifisert	M	6	-	-	-	-	-
		K	9	-	-	-	-	-
C180	Ondartet svulst i blindtarm	M	64	-	-	-	-	-
		K	94	-	-	-	-	-
C181	Ondartet svulst i blindtarmsvedheng	M	2	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-
C182	Ondartet svulst i tykktarm, oppadstigende del	M	48	-	-	-	-	-
		K	53	-	-	-	-	-
C183	Ondartet svulst i leverfleksur	M	13	-	-	-	-	-
		K	14	-	-	-	-	-
C184	Ondartet svulst i tverrcolon	M	17	-	-	-	-	-
		K	45	-	-	-	-	-
C185	Ondartet svulst i miltfleksur	M	10	-	-	-	-	-
		K	14	-	-	-	-	-
C186	Ondartet svulst i tykktarm, nedadstigende del	M	17	-	-	-	-	1
		K	16	-	-	-	-	-
C187	Ondartet svulst i sigmoideum	M	145	-	-	-	-	-
		K	146	-	-	-	-	-
C188	Ondartet overlappende svulst i tykktarm	M	1	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
C189	Ondartet svulst i tykktarm (colon), uspesifisert	M	106	-	-	-	-	-
		K	145	-	-	-	-	-
C19	Ondartet svulst i overgang mellom sigmoideum og endetarm	M	19	-	-	-	-	-
		K	19	-	-	-	-	-
C20	Ondartet svulst i endetarm	M	277	-	-	-	-	-
		K	230	-	-	-	-	-
C210	Ondartet svulst i endetarmsåpning, uspesifisert	M	7	-	-	-	-	-
		K	11	-	-	-	-	-
C211	Ondartet svulst i analkanal	M	2	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
C218	Ondartet overlappende svulst i endetarm, endetarmsåpning og analkanal	M	2	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	1	-	-	3	1	2	-	4	4	3	1	1	1	C168
-	-	-	-	-	-	2	4	2	-	2	-	1	1	1	
-	-	-	2	-	4	5	10	19	24	35	38	14	4	9	C169
-	-	-	-	2	2	5	3	10	11	18	25	19	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	1	C170
-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	C171
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	C172
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	C179
-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	2	1	1	1	
-	-	-	-	1	3	3	7	9	13	12	11	5	-	-	C180
-	-	-	1	2	6	-	9	9	16	20	17	12	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	C181
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	1	1	
1	-	-	-	-	1	2	5	4	6	11	11	6	1	1	C182
1	-	-	-	-	1	5	5	4	10	7	10	6	6	4	
-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	5	1	1	1	-	C183
-	-	-	-	1	2	2	-	1	2	-	3	3	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	4	3	2	2	-	C184
-	-	-	-	1	1	1	4	4	4	14	9	4	2	2	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	-	4	-	-	-	C185
-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	2	3	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	2	1	5	1	2	1	2	1	C186
-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	4	4	1	1	1	
-	-	-	-	5	3	4	15	19	31	30	22	10	6	6	C187
1	1	-	-	2	6	11	15	7	17	24	26	23	13	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	C188
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	1	-	2	8	7	10	13	11	22	14	17	1	1	C189
-	1	-	-	-	6	1	4	10	17	24	31	20	31	31	
-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	6	4	1	-	2	C19
-	-	-	1	-	-	2	1	2	3	3	3	2	2	2	
-	-	1	2	6	10	11	33	38	51	46	49	23	7	7	C20
-	1	1	3	2	8	16	8	19	25	48	50	32	17	17	
-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	1	-	1	-	1	C210
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	C211
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	C218
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år
C220	Levercellekarsinom	M	47	-	-	-	-	-
		K	29	-	-	-	-	-
C221	Karsinom i intrahepatisk gallegang	M	4	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-
C23	Ondartet svulst i galleblære	M	4	-	-	-	-	-
		K	23	-	-	-	-	-
C240	Ondartet svulst i ekstrahepatisk gallegang	M	13	-	-	-	-	-
		K	9	-	-	-	-	-
C241	Ondartet svulst i Vaters ampulle	M	7	-	-	-	-	-
		K	14	-	-	-	-	-
C249	Ondartet svulst i galleveier, uspesifisert	M	16	-	-	-	-	-
		K	21	-	-	-	-	-
C250	Ondartet svulst i bukspyttkjertelhode	M	66	-	-	-	-	-
		K	58	-	-	-	-	-
C251	Ondartet svulst i bukspyttkjertelkropp	M	8	-	-	-	-	-
		K	10	-	-	-	-	-
C252	Ondartet svulst i bukspyttkjertelhale	M	5	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-
C253	Ondartet svulst i bukspyttkjertels utførselsgang	M	2	-	-	-	-	-
C258	Ondartet overlappende svulst i bukspyttkjertel	M	10	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-
C259	Ondartet svulst i bukspyttkjertel (pancreas), uspesifisert	M	188	-	-	-	-	-
		K	226	-	-	-	-	-
C260	Ondartet svulst i tarmkanal, uspesifisert del	M	2	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
C268	Ondartet overlappende svulst i fordøyelsessystemet	M	1	-	-	-	-	-
C269	Ondartet svulst med ufullstendig angitte lokalisasjoner innen fordøyelsessystemet	M	23	-	-	-	-	-
		K	31	-	-	-	-	-
C30-C39	Ondartet svulster i åndedrettsorganer og intratorakale organer	M	1 168	-	-	-	-	-
		K	588	-	-	-	-	-
C300	Ondartet svulst i nesehule	M	1	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-
C310	Ondartet svulst i kjevebihule	M	4	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-
C313	Ondartet svulst i kilebensbihule	K	1	-	-	-	-	-
C319	Ondartet svulst i bihule, uspesifisert	K	1	-	-	-	-	-
C320	Ondartet svulst i glottis	M	23	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	3	1	-	1	3	5	3	11	9	7	3	1	1	C220
-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	7	3	4	6	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	-	C221
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	C23
-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	4	5	3	5	1	
1	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	1	1	-	-	C240
1	-	-	-	-	1	1	3	-	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	C241
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	2	1	2	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	1	5	3	2	2	-	-	C249
-	-	-	1	1	-	-	2	1	2	4	5	5	5	-	
-	1	-	1	1	3	2	9	10	16	17	4	2	-	-	C250
-	-	-	1	2	4	4	5	8	11	7	8	4	4	4	
-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	-	-	1	-	-	C251
-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	C252
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	C253
-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	-	2	-	-	C258
-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-	
-	1	1	1	8	9	7	18	22	34	44	25	14	4	10	C259
-	-	1	2	8	9	9	13	18	38	43	41	43	10	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	C260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	C268
-	-	-	-	1	-	-	1	-	6	6	6	6	2	1	
-	-	-	-	2	1	1	-	4	4	5	6	4	5	1	C269
2	1	1	12	23	57	78	128	194	274	223	126	41	8	9	C30-C39
-	1	4	12	35	43	41	61	99	111	87	58	27	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	C300
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	C310
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	C313
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C319
-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	4	3	2	-	-	C320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
C321	Ondartet svulst i supraglottis	M	11	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-
C322	Ondartet svulst i subglottis	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
C328	Ondartet overlappende svulst i strupe	M	2	-	-	-	-	-
C329	Ondartet svulst i strupe, uspesifisert	M	7	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
C33	Ondartet svulst i lufrør	M	4	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
C340	Ondartet svulst i hovedbronkie	M	103	-	-	-	-	-
		K	51	-	-	-	-	-
C341	Ondartet svulst i overlapp, bronkie eller lunge	M	315	-	-	-	-	-
		K	146	-	-	-	-	-
C342	Ondartet svulst i midtlapp, bronkie eller lunge	M	30	-	-	-	-	-
		K	13	-	-	-	-	-
C343	Ondartet svulst i underlapp, bronkie eller lunge	M	149	-	-	-	-	-
		K	63	-	-	-	-	-
C348	Ondartet overlappende svulst i bronkie eller lunge	M	16	-	-	-	-	-
		K	14	-	-	-	-	-
C349	Ondartet svulst i bronkie (broncus) eller lunge (pulmo), uspesifisert	M	493	-	-	-	-	-
		K	269	-	-	-	-	-
C37	Ondartet svulst i thymus	M	2	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
C380	Ondartet svulst i hjerte	M	1	-	-	-	-	-
C383	Ondartet svulst i mediastinum, uspesifisert	K	3	-	-	-	-	-
C384	Ondartet svulst i brysthinne	M	6	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
C398	Ondartet overlappende svulst i åndedrettsorganer og intratorakale organer	K	1	-	-	-	-	-
C399	Ondartede svulster med ufullstendig angitt lokalisasjoner i åndedrettsorganer	K	2	-	-	-	-	-
C40-C41	Ondartet svulster i knokler og leddbrusk	M	17	-	-	-	1	1
		K	10	-	-	-	-	1
C400	Ondartet svulst i skulderblad og lange knokler i o.eks.	M	2	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
C402	Ondartet svulst i lange knokler i underekstremitet	M	6	-	-	-	1	-
		K	4	-	-	-	-	1
C409	Ondartet svulst i knokler og leddbrusk i ekstremiteter, uspesifisert	M	1	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	4	-	-	-	-	C321
-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	C322
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	C328
1	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	C329
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	C33
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	2	2	7	13	28	28	17	5	1	-	-	C340
-	-	-	1	2	1	8	12	7	12	6	2	-	-	-	
-	-	1	4	9	18	23	39	59	69	55	31	7	-	-	C341
-	-	2	9	18	11	19	23	28	21	9	4	2	2	-	
-	-	-	-	-	1	1	6	6	10	1	5	-	-	-	C342
-	-	-	-	3	-	-	2	3	1	1	2	1	-	-	
-	-	-	2	1	6	13	18	21	36	31	18	3	-	-	C343
-	-	1	4	6	5	8	14	8	8	7	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	5	6	1	1	-	-	-	-	C348
-	1	-	-	2	1	1	2	-	4	2	1	-	-	-	
-	1	-	6	9	27	27	41	70	110	106	61	28	7	5	C349
-	-	3	8	15	13	15	16	47	53	46	31	17	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	C37
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	C380
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	C383
-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	-	-	-	-	C384
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	C398
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	C399
1	2	1	-	1	1	1	-	-	1	3	-	-	1	1	C40-C41
1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	1	1	1	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	C400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C402
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	C409

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
C411	Ondartet svulst i underkjeve	M	1	-	-	-	-	-
C412	Ondartet svulst i ryggsøyle	M	1	-	-	-	-	1
		K	3	-	-	-	-	-
C413	Ondartet svulst i ribben, brystben og krageben	M	4	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
C414	Ondartet svulst i bekkenben, korsben og haleben	M	2	-	-	-	-	1
C419	Ondartet svulst i knokler og leddbrusk, uspesifisert	K	1	-	-	-	-	-
C43-C44	Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud	M	132	-	-	-	-	-
		K	94	-	-	-	-	-
C430	Malignt melanom på leppe	K	1	-	-	-	-	-
C431	Malignt melanom på øyelokk, inklusive øyevinkel	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
C432	Malignt melanom på øre og i ytre øregang	M	2	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
C433	Malignt melanom i andre og uspesifiserte deler av ansikt	M	4	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
C434	Malignt melanom i hodebunn og på hals	M	3	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
C435	Malignt melanom på trunkus	M	27	-	-	-	-	-
		K	9	-	-	-	-	-
C436	Malignt melanom på overekstremitet, inklusive skulder	M	12	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-
C437	Malignt melanom på underekstremitet, inklusive hofte	M	10	-	-	-	-	-
		K	21	-	-	-	-	-
C439	Malignt melanom i hud, uspesifisert	M	55	-	-	-	-	-
		K	41	-	-	-	-	-
C442	Ondartet svulst i hud på øre og i ytre øregang	M	1	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-
C443	Ondartet svulst i hud i andre og uspesifiserte deler av ansikt	M	4	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
C444	Ondartet svulst i hud i hodebunn og på hals	M	2	-	-	-	-	-
C445	Ondartet svulst i hud på trunkus	M	4	-	-	-	-	-
C447	Ondartet svulst i hud på underekstremitet, inklusive hofte	M	1	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	C411
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C412
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	C413
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C414
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	C419
-	-	4 1	3 4	13 7	13 6	11 10	8 8	13 8	20 11	16 12	17 12	7 10	7 5		C43-C44
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	C430
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	C431
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	C432
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	C433
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	C434
-	-	2 2	2 2	3 2	1 2	-	1 1	2 1	7 1	6 1	2 1	2 1	1 -	-	C435
-	-	-	-	3	-	1	1	1	-	2	2	1	1	1	C436
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	4	5	3	3	C437
-	-	2 1	1 2	5 4	11 1	9 5	2 6	6 5	9 3	3 3	3 6	3 4	3 4	1 1	C439
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	C442
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	C443
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	C444
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	C445
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	C447

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
C449	Ondartet svulst i hud, uspesifisert	M	6	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
C45-C49	Ondartet svulster i mesotel og bløtvev	M	69	-	-	-	-	1
		K	48	1	-	2	1	-
C450	Mesoteliom i brysthinne	M	38	-	-	-	-	-
		K	10	-	-	-	-	-
C451	Mesoteliom i bukhinne	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
C459	Mesoteliom, uspesifisert	M	5	-	-	-	-	-
C460	Kaposis sarkom i hud	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
C469	Kaposis sarkom, uspesifisert	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
C472	Ondartet svulst i perifere nerver i underekstremitet., inklusive hofte	K	1	-	-	-	-	-
C479	Ondartet svulst i perifere nervesystem og det autonome nervesystem, uspesifisert	M	1	-	-	-	-	-
C480	Ondartet svulst i retroperitoneum	M	8	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-
C481	Ondartet svulst i spesifiserte deler av bukhinne	K	2	-	-	-	-	-
C482	Ondartet svulst i bukhinne, uspesifisert	K	4	-	-	-	-	-
C488	Ondartet overlappende svulst i retroperitoneum og bukhinne	K	1	-	-	-	-	-
C490	Ondartet svulst i bindevev og bløtvev i hode, ansikt og på hals	M	1	-	-	-	-	-
C491	Ondartet svulst i bindevev og bløtvev i overekstremitet, inklusive skulder	K	4	1	-	-	-	-
C492	Ondartet svulst i bindevev og bløtvev i underekstremitet, inklusive hofte	M	3	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	1	-
C493	Ondartet svulst i bindevev og bløtvev i brystregionen	M	2	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
C494	Ondartet svulst i bindevev og bløtvev i bukregionen	M	4	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-
C495	Ondartet svulst i bindevev og bløtvev i bekken	M	3	-	-	-	-	1
		K	3	-	-	2	-	-
C498	Ondartet overlappende svulst i bindevev og bløtvev	M	1	-	-	-	-	-
C499	Ondartet svulst i bindevev og bløtvev, uspesifisert	K	1	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country, 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	C449
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1 2	- 1	1 2	1 3	8 4	4 3	8 6	17 4	20 6	4 11	3 1	1 1	-	C45-C49
-	-	-	1	1	5	3	2	10	13	1	2	-	-	-	C450
-	-	-	1	1	1	1	-	1	3	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	C451
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	C459
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	C460
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	C469
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C472
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	C479
-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	-	-	-	-	-	C480
-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	C481
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	C482
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	C488
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	C490
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	C491
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	C492
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	C493
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	C494
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	C495
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	C498
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	C499

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
C50	Ondartet svulst i bryst			M	7	-	-	-
				K	823	-	-	-
C500	Ondartet svulst i brystvorte og areola mammae	K		5	-	-	-	-
C501	Ondartet svulst i sentral del av bryst	K		22	-	-	-	-
C502	Ondartet svulst i øvre indre kvadrant av bryst	K		13	-	-	-	-
C503	Ondartet svulst i nedre indre kvadrant av bryst	K		6	-	-	-	-
C504	Ondartet svulst i øvre ytre kvadrant av bryst	K		50	-	-	-	-
C505	Ondartet svulst i nedre ytre kvadrant av bryst	K		13	-	-	-	-
C506	Ondartet svulst i aksillær del av bryst	K		1	-	-	-	-
C508	Ondartet overlappende svulst i bryst	K		13	-	-	-	-
C509	Ondartet svulst i bryst (mammae), uspesifisert	M		7	-	-	-	-
		K		700	-	-	-	-
C51-C58	Ondartet svulster i kvinnelige kjønnsorganer			K	648	-	-	-
C510	Ondartet svulst i stor kjønnsleppe	K		5	-	-	-	-
C511	Ondartet svulst i liten kjønnsleppe	K		5	-	-	-	-
C512	Ondartet svulst i klitoris	K		2	-	-	-	-
C518	Ondartet overlappende svulst i ytre kvinnelige kjønnsorganer	K		3	-	-	-	-
C519	Ondartet svulst i ytre kvinnelige kjønnsorganer, uspesifisert	K		16	-	-	-	-
C52	Ondartet svulst i skjede	K		9	-	-	-	-
C530	Ondartet svulst i endocervix	K		1	-	-	-	-
C531	Ondartet svulst i ectocervix (portio)	K		1	-	-	-	-
C539	Ondartet svulst i livmorhals (cervix uteri), uspesifisert	K		132	-	-	-	-
C541	Ondartet svulst i livmorslimhinne	K		1	-	-	-	-
C549	Ondartet svulst i livmorlegeme (corpus uteri), uspesifisert	K		109	-	-	-	-
C55	Ondartet svulst i livmor, uspesifisert del	K		10	-	-	-	-
C56	Ondartet svulst i eggstokk (neoplasma malignum ovarii)	K		331	-	-	-	-
C570	Ondartet svulst i eggleder	K		8	-	-	-	-
C574	Ondartet svulst i adnexa uteri, uspesifisert	K		1	-	-	-	-
C579	Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer, uspesifisert	K		14	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	1	1	1	C50
1	5	19	39	41	63	61	67	77	105	105	102	72	66		
-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-		C500
-	1	-	-	1	4	-	3	3	1	3	2	3	1	1	C501
-	-	1	-	1	-	1	2	-	4	1	2	1	-		C502
-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	C503
-	1	1	7	-	3	6	5	3	7	4	7	4	2	2	C504
-	-	-	1	-	3	1	-	-	2	-	3	1	2		C505
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		C506
-	-	-	1	1	3	1	1	-	-	4	-	2	-		C508
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	93	88	-	1	1	C509
1	3	16	29	37	50	49	55	70	90	-	60	59			
1	8	16	15	28	45	34	47	78	100	103	77	73	23		C51-C58
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-		C510
1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	C511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	C512
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	C518
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	2	4	3	1	C519
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	1	1	C52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		C530
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		C531
-	5	6	8	11	10	5	11	14	16	17	15	11	3		C539
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		C541
-	-	2	-	1	3	3	6	16	19	21	15	17	6		C549
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	2	-	4		C55
-	3	7	5	13	31	24	26	43	49	54	39	32	5		C56
-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-		C570
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		C574
-	-	1	-	1	-	-	-	1	3	1	1	5	1		C579

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
C60-C63	Ondartet svulster i mannlige kjønnsorganer							
C601	Ondartet svulst i penishode	M	1 178	-	-	-	-	-
C609	Ondartet svulst i penis, uspesifisert	M	4	-	-	-	-	-
C61	Ondartet svulst i blæreholkskjerte (neoplasma malignum prostatæ)	M	2	-	-	-	-	-
C620	Ondartet svulst i ikke-descendert testikkel	M	1 162	-	-	-	-	-
C621	Ondartet svulst i descendert testikkel	M	2	-	-	-	-	-
C629	Ondartet svulst i testikkel (testis), uspesifisert	M	5	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-
C64-C68	Ondartet svulster i urinveier							
C64	Ondartet svulst i nyre, unntatt nyrebekken	M	420	-	-	-	-	-
		K	227	-	-	-	-	-
C65	Ondartet svulst i nyrebekken	M	147	-	-	-	-	-
		K	97	-	-	-	-	-
C66	Ondartet svulst i urinleder	M	11	-	-	-	-	-
		K	10	-	-	-	-	-
C672	Ondartet svulst i sidevegg i urinblære	M	7	-	-	-	-	-
C674	Ondartet svulst i bakre vegg i urinblære	M	1	-	-	-	-	-
C675	Ondartet svulst i blærehals	M	1	-	-	-	-	-
C676	Ondartet svulst i urinlederåpning	M	1	-	-	-	-	-
C679	Ondartet svulst i urinblære (vesica urinaria), uspesifisert	M	247	-	-	-	-	-
		K	112	-	-	-	-	-
C680	Ondartet svulst i urinrør	M	3	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
C689	Ondartet svulst i urinveisorgan, uspesifisert	K	3	-	-	-	-	-
C69-C72	Ondartet svulster i øye, hjerne og andre deler av sentralnervesystemet							
C692	Ondartet svulst i netthinne	M	133	-	4	3	1	2
		K	125	-	2	2	1	1
C693	Ondartet svulst i årehinne	K	1	-	-	-	-	-
C694	Ondartet svulst i strålelegeme	M	2	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
C696	Ondartet svulst i øyehule	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
C698	Ondartet overlappende svulst i øyet og øyets adneksstruktur	K	2	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age														ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
2	-	-	2	4	7	17	47	84	184	296	259	189	86	C60-C63
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	C601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	C609
-	-	-	-	4	4	17	45	84	183	292	258	189	86	C61
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	C620
1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	C621
1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	C629
-	1	1	2	6	12	16	21	48	74	90	78	51	20	C64-C68
-	-	3	-	3	4	7	9	33	26	48	41	39	14	
-	1	1	1	5	10	9	12	20	29	28	21	9	1	C64
-	-	2	-	3	3	5	5	18	11	24	12	11	3	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	2	-	-	C65
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-	C66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	C672
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	C674
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	C675
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	C676
-	-	-	1	1	1	7	8	26	35	57	53	39	19	C679
-	-	1	-	-	1	2	4	12	14	17	23	27	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	C680
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	C689
6	1	3	4	11	13	8	12	13	24	21	3	3	-	C69-C72
2	4	5	10	8	11	7	8	20	15	14	8	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	C692
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	C693
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	C694
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	C696
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	C698

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
C699	Ondartet svulst i øye (oculus), uspesifisert	M	8	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
C700	Ondartet svulst i hjernehinner	K	2	-	-	-	-	-	-
C701	Ondartet svulst i ryggmargshinner	K	1	-	-	-	-	-	-
C709	Ondartet svulst i hjerne- og ryggmargshinner, uspesifisert	K	3	-	-	-	-	-	-
C710	Ondartet svulst i storhjerne, unntatt lapper og ventrikler	M	16	-	-	-	1	-	-
		K	15	-	-	-	-	-	1
C711	Ondartet svulst i pannelapp	M	13	-	-	-	-	1	-
		K	15	-	-	-	-	-	2
C712	Ondartet svulst i tinninglapp	M	19	-	-	-	-	-	-
		K	13	-	-	-	-	-	-
C713	Ondartet svulst i isselapp	M	8	-	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-	-
C714	Ondartet svulst i bakhodelapp	M	4	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
C715	Ondartet svulst i hjerneventrikkel	K	2	-	1	-	1	-	-
C716	Ondartet svulst i lillehjerne	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	1	-	-	-
C717	Ondartet svulst i hjernestamme	M	5	-	3	2	-	-	-
		K	5	-	1	1	-	1	-
C718	Ondartet overlappende svulst i hjerne	M	5	-	-	1	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	-
C719	Ondartet svulst i hjerne, uspesifisert	M	46	-	1	-	-	1	1
		K	47	-	-	-	-	-	-
C720	Ondartet svulst i ryggmarg	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
C724	Ondartet svulst i nervus vestibulocochlearis [8. hvernenerve]	K	2	-	-	-	-	-	-
C729	Ondartet overlappende svulst i sentralnervesystemet, uspesifisert	M	1	-	-	-	-	-	-
C73-C75	Ondartet svulster i skjoldbruskkjertel og andre endokrine kjertler	M	21	-	1	1	-	-	-
		K	38	-	-	-	-	-	1
C73	Ondartet svulst i skjoldbruskkjertel	M	13	-	-	-	-	-	-
		K	32	-	-	-	-	-	-
C740	Ondartet svulst i binyrebark	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	1
C741	Ondartet svulst i binyremarg	M	3	-	1	1	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	-	-	-	-	C699
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	C700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C701
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	C709
1	-	-	-	-	1	1	4	1	2	4	1	-	-	-	C710
-	-	3	2	-	-	3	2	1	2	1	1	-	-	-	
1	-	-	2	1	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	C711
1	-	-	1	-	4	1	-	4	2	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	2	-	2	2	4	6	-	1	1	-	-	C712
-	1	-	-	1	1	-	1	6	2	-	1	-	-	-	
-	-	1	3	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	C713
-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	C714
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C715
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	C716
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C717
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	C718
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
4	-	1	1	4	7	3	2	4	5	9	1	2	-	-	C719
-	2	1	6	4	4	4	1	5	5	7	5	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	C720
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	C724
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C729
-	-	-	-	1	2	2	-	3	3	7	-	-	1	1	C73-C75
-	-	-	1	1	-	1	1	4	7	4	9	6	3	3	
-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	6	-	-	1	C73
-	-	-	-	1	-	1	1	4	4	3	9	6	3	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	C740
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C741

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
C749	Ondartet svulst i binyre (glandula suprarenalis), uspesifisert	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
C751	Ondartet svulst i hypofyse	K	1	-	-	-	-	-	-
C752	Ondartet svulst i ductus craniopharyngealis	M	1	-	-	-	-	-	-
C76-80	Ondartet svulster med ufullstendig angitte eller uspesifiserte utgangspunkter og metastaser	M	320	-	-	-	-	-	-
		K	397	-	-	-	-	-	-
C761	Ondartet svulst i brystregionen (thorax)	K	1	-	-	-	-	-	-
C762	Ondartet svulst i bukregionen (abdomen)	M	23	-	-	-	-	-	-
		K	63	-	-	-	-	-	-
C763	Ondartet svulst i bekken (pelvis)	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-	-
C80	Ondartet svulst uten spesifisert lokalisasjon	M	296	-	-	-	-	-	-
		K	329	-	-	-	-	-	-
C81-C96	Ondartet svulster i lymfoid, ematopoetisk eller beslektede vev	M	493	-	1	4	-	4	3
		K	431	-	2	-	-	-	2
C811	Hodgkins sykdom, nodulær sklerose	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
C812	Hodgkins sykdom, blandet celltype	M	4	-	-	-	-	-	1
		K	1	-	-	-	-	-	-
C819	Hodgkins sykdom, uspesifisert	M	8	-	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-	-
C821	Non-Hodgkins lymfom, centrobl., centrocytt., folliculær type	M	8	-	-	-	-	-	-
		K	7	-	-	-	-	-	-
C829	Follikulært non-Hodgkins lymfom, uspesifisert	K	1	-	-	-	-	-	-
C830	Non-Hodgkins lymfom, lymphocytært (small cell, diffuse)	M	16	-	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-	-
C831	Non-Hodgkins lymfom, centrocyttisk	M	4	-	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-	-
C832	Non-Hodgkins lymfom, centrobl., centrocyttisk, diffus type	K	1	-	-	-	-	-	-
C833	Non-Hodgkins lymfom, centroblastisk, diffus type	M	23	-	-	-	-	-	-
		K	21	-	-	-	-	-	-
C834	Non-Hodgkins lymfom immunoblastisk (diffust)	M	12	-	-	-	-	-	-
		K	12	-	-	-	-	-	-
C835	Non-Hodgkins lymfom lymphoblastisk (diffust)	M	2	-	-	-	-	1	1
		K	1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	C749
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	C751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	C752
-	1 1	- 2	5 2	5 10	9 10	16 13	26 24	42 30	50 54	77 81	45 64	32 63	12 43	C76-80	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	C761
-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	7	2	5	3	C762	
-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	11	7	19	18		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	C763	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-		
-	1 1	- 2	5 2	5 10	8 9	14 12	26 20	41 28	48 50	70 69	42 57	27 44	9 25	C80	
1 3	3 -	4 4	7 6	18 15	25 12	26 19	30 23	68 44	95 54	83 70	65 79	43 58	13 40	C81-C96	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	C811	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	C812	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	1	1	-	-	C819	
-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	-	-	-	-	C821	
-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	C829	
-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	8	1	1	-	C830	
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	3	-		
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	C831	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	C832	
-	-	-	-	3	2	5	3	2	3	4	1	-	-	C833	
-	-	-	-	1	3	-	1	2	1	4	6	3	-		
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	3	1	1	1	C834	
-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	1	3	2	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	C835	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år	20-24 år år
C837	Burkitts lymfom	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	1
C838	Andre typer av diffust non-Hodgkins lymfom	M	17	-	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-	-
C840	Mycosis fungoides	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
C841	Sèzarys syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-
C844	Perifert T-cellelymform	M	4	-	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	-
C845	Andre og uspesifiserte T-cellelymformer	M	4	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
C850	Lymfosarkom	K	1	-	-	-	-	-	-
C851	B-cellelymform, uspesifisert	M	11	-	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-	-
C857	Andre spesifiserte typer non-Hodgkins lymfomer	M	14	-	-	-	-	-	-
		K	9	-	1	-	-	-	-
C859	Non-Hodgkins lymfom, uspesifisert	M	73	-	-	-	-	-	-
		K	72	-	-	-	-	-	-
C880	Waldenströms makroglobulinemi	M	6	-	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-	-
C889	Ondartet immunoproliferativ sykdom, uspesifisert	K	1	-	-	-	-	-	-
C900	Myelomatose	M	118	-	-	-	-	-	-
		K	120	-	-	-	-	-	-
C902	Plasmocytom, ekstramedullært	M	4	-	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-	-
C910	Akutt lymfatisk leukemi	M	8	-	-	1	-	2	-
		K	3	-	-	-	-	-	1
C911	Kronisk lymfatisk leukemi	M	50	-	-	1	-	-	-
		K	36	-	-	-	-	-	-
C913	Prolymfocytleukemi	K	1	-	-	-	-	-	-
C914	Hårcelleleukemi	M	2	-	-	-	-	-	-
C917	Andre lymfatiske leukemier	M	3	-	-	1	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	-
C919	Lymfatisk leukemi, uspesifisert	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
C920	Akutt myelogen leukemi	M	40	-	-	-	-	1	1
		K	41	-	1	-	-	-	-
C921	Kronisk myelogen leukemi	M	18	-	1	-	-	-	-
		K	15	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age														ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	C837
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	1	2	2	3	1	-	4	2	1	-	-	1	C838
-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	C840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	C841
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	C844
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	C845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	C850
-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	1	-	-	-	C851
1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	-	-	-
-	-	1	-	1	3	-	2	3	1	-	2	1	-	C857
-	-	-	1	3	2	4	2	12	16	11	12	7	2	C859
1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	-	7	6	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	-	-	C880
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	C889
-	-	1	2	1	5	9	20	21	14	22	17	6	10	C900
-	-	-	4	1	1	6	15	19	27	21	16	10	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	C902
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-
-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	C910
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	4	3	5	13	8	7	5	2	C911
-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	3	8	11	8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	C913
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	C914
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	C917
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	C919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	1	1	1	-	2	1	9	7	11	2	2	-	7	C920
1	-	-	1	-	1	1	3	5	11	1	3	6	7	-
-	-	-	-	1	1	-	-	2	6	3	2	2	-	C921
-	-	1	-	-	-	1	-	4	4	2	1	2	-	-

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
C924	Akutt promyelocytteleukemi	K	1	-	-	-	-	-
C925	Akutt myelomonocytteleukemi	M	4	-	-	-	-	-
		K	7	-	-	-	-	-
C927	Andre myelogene leukemier	M	2	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-
C929	Myelogen leukemi, uspesifisert	M	3	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
C930	Akutt monocytteleukemi	M	2	-	-	1	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
C940	Akutt erytremi og erytroleukemi	M	3	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
C942	Akutt megakaryoblastleukemi	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
C950	Akutt leukemi med uspesifisert celletype	M	5	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-
C951	Kronisk leukemi med uspesifisert celletype	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
C959	Leukemi, uspesifisert	M	10	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-
C962	Malign mastcelleturmor	M	1	-	-	-	-	-
C969	Ondartet svulst utgått fra lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev, uspesifisert	M	2	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
D10-D36	Godartede svulster	M	25	-	1	-	-	-
		K	39	2	-	-	-	-
D120	Godartet svulst i blindtarm (coecum)	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
D125	Godartet svulst i sigmoideum	K	1	-	-	-	-	-
D126	Godartet svulst i tykktarm (colon), uspesifisert	K	1	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-
D131	Godartet svulst i magesekk	K	1	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-
D134	Godartet svulst i lever	M	1	-	-	-	-	-
D135	Godartet svulst i ekstrahepatiske galleganger	M	1	-	-	-	-	-
D139	Godartet svulst med ufullstendig angitte lokalisasjoner innen fordøyelsessystemet	M	1	-	-	-	-	-
D143	Godartet svulst i bronkie og lunge	K	1	-	-	-	-	-
D151	Godartet svulst i hjerte (cor)	M	1	-	-	-	-	-
D166	Godartet svulst i ryggsøyle	K	1	-	-	-	-	-
D180	Hemangiom, alle lokalisasjoner	K	2	2	-	-	-	-
D181	Lymfangiom, alle lokalisasjoner	M	1	-	1	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C924
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	C925
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	C927
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	C929
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	C930
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	C940
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	C942
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	C950
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	C951
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	-	C959
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	C962
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	C969
-	-	-	2	1	-	-	-	5	2	9	3	2	2	2	D10-D36
-	-	-	-	2	2	1	3	2	4	11	10	2	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	D120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	D125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	D126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	D131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	D134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	D135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	D139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	D143
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	D151
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	D166
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D181

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år
D259	Leiomyom i livmor, uspesifisert	K	1	-	-	-	-	-
D269	Andre godartede svulster i livmor, uspesifisert	K	1	-	-	-	-	-
D27	Godartet svulst i eggstokk (ovarium)	K	1	-	-	-	-	-
D289	Godartet svulst i kvinnelig kjønnsorgan, uspesifisert	K	1	-	-	-	-	-
D291	Godartet svulst i blærehalskjertel (prostata)	M	1	-	-	-	-	-
D300	Godartet svulst i nyre	K	1	-	-	-	-	-
D320	Godartet svulst i hjernehinner	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
D329	Godartet svulst i hjerne- og ryggmargshinner, uspesifisert	M	5	-	-	-	-	-
		K	12	-	-	-	-	-
D331	Godartet svulst i hjerne, infratentoriell lokalisasjon	K	2	-	-	-	-	-
D332	Godartet svulst i hjerne, uspesifisert	M	4	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-
D337	Godartet svulst i andre spesifiserte deler av sentralnervesystemet	M	1	-	-	-	-	-
D339	Godartet svulst i sentralnervesystemet, uspesifisert	M	1	-	-	-	-	-
D34	Godartet svulst i skjoldbruskkjertel	K	1	-	-	-	-	-
D352	Godartet svulst i hypofyse	M	1	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
D361	Godart. svulst i perifere nerver og det autonome nervesystem	M	1	-	-	-	-	-
D367	Godartet svulst i andre spesifiserte lokalisasjoner	K	1	-	-	-	-	-
D369	Godartet svulst med uspesifisert lokalisasjon	M	1	-	-	-	-	-
D37-D48	Svulster med usikkert eller ukjent malignitetspotensial	M	124	1	-	1	-	-
		K	129	-	1	-	-	-
D370	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i leppe, munnhule og svelg	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
D371	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i magesekk	M	1	-	-	-	-	-
D372	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i tynntarm	K	1	-	-	-	-	-
D374	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i tykktarm	M	5	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age														ICD-10	
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	D259
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	D269
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	D27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	D289
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	D291
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	D300
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	D329
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	5	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	D331
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	D332
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	D337
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	D339
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	D34
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D352
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	D361
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	D367
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	D369
-	-	-	-	-	2	1	3	10	17	33	24	14	18	D37-D48	
-	1	-	-	-	-	3	3	3	13	27	26	24	28	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	D370
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	D371
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	D372
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	3	2	D374

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
D375	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i endetarm	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
D376	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i lever, galleblære og	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	-
D377	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i andre spesifiserte	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-	-
D379	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i fordøyelsesorgan,	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	-
D380	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i strupe	M	1	-	-	-	-	-	-
D381	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i luftrør, bronkie og lunge	M	11	-	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	-
D382	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i brysthinne	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
D383	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i mediastinum	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
D384	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i thymus	M	1	-	-	1	-	-	-
D390	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i livmor	K	3	-	-	-	-	-	-
D391	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i eggstokk	K	3	-	-	-	-	-	-
D399	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i kvinnelig kjønnsorgan,	K	1	-	-	-	-	-	-
D400	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i blærerehalskjertel	M	2	-	-	-	-	-	-
D410	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i nyre	K	1	-	-	-	-	-	-
D414	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i urinblære	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
D432	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i hjerne, uspesifisert	M	32	-	-	-	-	-	-
		K	25	-	1	-	-	-	-
D440	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i skjoldbruskkjertel	K	1	-	-	-	-	-	-
D45	Polycythemia vera	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-	-
D462	Refraktær anemi med økning av blaster	M	1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	D375
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	D376
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	D377
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	D379
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	D380
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	3	-	-	1	D381
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	D382
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	D383
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D384
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	D390
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	D391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	D399
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	D400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	D410
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	D414
-	-	-	-	1	-	1	3	7	9	7	1	3	1		D432
-	-	-	-	-	1	1	1	3	8	4	5	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	D440
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	D45
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	D462

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
D469	Myelodysplastisk syndrom, uspesifisert	M	28	-	-	-	-	-	-
		K	15	-	-	-	-	-	-
D471	Kronisk myeloproliferativ sykdom	M	11	-	-	-	-	-	-
		K	14	-	-	-	-	-	-
D479	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i lymfoid, hematopoetisk eller belektet vev, uspesifisert	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	-
D483	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i retroperitoneum	M	1	-	-	-	-	-	-
D487	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial med andre spesifiserte	M	9	1	-	-	-	-	-
		K	26	-	-	-	-	-	-
D489	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial, uspesifisert	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
D50-D89	III. SYKDOMMER I BLOD OG BLODANNENDE ORGANER, OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET	M	42	-	1	1	-	-	-
		K	65	-	-	-	-	-	-
D500	Jernmangelanemi ved blodtap (kronisk)	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
D509	Uspesifisert jernmangelanemi	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
D510	Anemi ved B12-vitaminmangel som skyldes mangel på intrinsic factor	M	4	-	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-	-
D519	Uspesifisert anemi ved B12-vitaminmangel	K	1	-	-	-	-	-	-
D591	Andre autoimmune hemolytiske anemier	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
D595	Paroksysmal nokturnal hemoglobinuri [Marchiafava-Michelis sykdom]	K	1	-	-	-	-	-	-
D599	Uspesifisert ervervet hemolytisk anemi	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
D618	Andre spesifiserte aplastiske anemier	K	1	-	-	-	-	-	-
D619	Uspesifisert aplastisk anemi	M	8	-	-	1	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-	-
D643	Andre sideroblastanemier	M	1	-	-	-	-	-	-
D649	Uspesifisert anemi	M	9	-	-	-	-	-	-
		K	20	-	-	-	-	-	-
D65	Disseminert intravaskulær koagulasjon [defibrineringssyndrom]	K	1	-	-	-	-	-	-
D66	Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor VIII	M	2	-	1	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age														ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	7	8	2	2	D469
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	3	3	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	2	2	-	D471
-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	D479
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	D483
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	D487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	6	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	D489
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	4	-	3	1	2	5	6	8	10	D50-D89
1	-	1	1	-	-	2	-	3	6	10	11	17	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	D500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	D509
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	D510
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	D519
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	D591
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D595
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	D599
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	D618
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	D619
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	D643
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	D649
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	6	6	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	D65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D66

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år	20-24 år år
D693	Idiopatisk trombocytopenisk purpura Evans syndrom	K	1	-	-	-	-	-	-
D696	Uspesifisert trombocytopeni	K	3	-	-	-	-	-	-
D70	Agranulocytose og nøytropeni	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
D733	Abscess i milt	M	1	-	-	-	-	-	-
D752	Essensiell trombocytose	K	1	-	-	-	-	-	-
D758	Andre spesifiserte sykdommer i blod og bloddannende organer	K	1	-	-	-	-	-	-
D759	Uspesifisert sykdom i blod og bloddannende organer	K	1	-	-	-	-	-	-
D801	Ikke-familiær hypogammaglobulinemi	M	2	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
D849	Uspesifisert immunsvikt	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
D860	Sarkoidose i lunge	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
D862	Sarkoidose i lunge med sarkoidose i lymfeknuter	M	1	-	-	-	-	-	-
D868	Sarkoidose med andre og kombinerte lokalisasjoner	K	3	-	-	-	-	-	-
D869	Uspesifisert sarkoidose	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-	-
D892	Uspesifisert hypergammaglobulinemi	K	1	-	-	-	-	-	-
D899	Uspesifisert tilstand som angår immunsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
E00-E90	IV. ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLsKE FORSTYRRELSEr	M	313	3	-	-	-	4	5
		K	362	3	1	-	1	-	1
E00-09, E15-E90	Andre Endokrine sykdommer, ernærings-sykdommer og metabolske forstyrrelser	M	64	3	-	-	-	2	2
		K	105	3	1	-	1	-	1
E035	Myksødemkomma	K	1	-	-	-	-	-	-
E039	Uspesifisert hypotyreose	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	12	-	-	-	-	-	-
E049	Uspesifisert ikke-toksisk struma	K	1	-	-	-	-	-	-
E059	Uspesifisert tyretoksikose	K	4	-	-	-	-	-	-
E210	Primær hyperparathyreoidisme	M	1	-	-	-	-	-	-
E213	Uspesifisert hyperparathyreoidisme	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	D693
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	D696
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	D733
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	D752
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	D758
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	D759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	D801
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	D849
-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	D860
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	D862
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	D868
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	D869
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	D892
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	D899
6 2	4 2	3 8	9 4	13 7	13 4	13 7	21 15	36 29	36 27	52 52	40 75	38 66	17 58	E00-E90	
1 2	1 2	1 3	5 -	3 4	6 2	6 3	2 5	10 7	5 5	8 9	2 18	4 21	3 18	E00-09, E15-E90	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	E035	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	E039	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	5	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	E049	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	E059	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	E210	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E213	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år
E220	Akromegali og hypofysær kjempevekst	K	1	-	-	-	-	-
E249	Uspesifisert Cushings syndrom	M	1	-	-	-	-	-
E260	Primær hyperaldosteronisme	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
E271	Primær binyrebarkinsuffisiens	M	2	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-
E274	Annen og uspesifisert binyrebarkinsuffisiens	M	1	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
E349	Uspesifisert endokrin forstyrrelse	K	1	-	-	-	-	1
E512	Wernickes encefalopati	M	1	-	-	-	-	-
E669	Uspesifisert fedme	M	3	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
E711	Andre forstyrrelser i metabolismen av grenede aminosyrer	K	1	1	-	-	-	-
E721	Forstyrrelse i metabolismen av svovelholdige aminosyrer	K	1	-	-	-	-	-
E725	Forstyrrelser i glycinmetabolismen	M	1	1	-	-	-	-
E740	Glykogenlagringssykdom	M	1	1	-	-	-	-
E752	Annen sfingolipidose	M	2	1	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
E754	Nevronal ceroid lipofuscinose	M	1	-	-	-	-	1
		K	2	-	-	-	-	-
E760	Mukopolysakkridose, type I	K	2	-	1	-	1	-
E761	Mukopolysakkridose, type II	M	1	-	-	-	-	1
E762	Andre mukopolysakkridoser	K	1	-	-	-	-	-
E779	Uspesifisert forstyrrelse i glykoproteinmetabolismen	K	1	1	-	-	-	-
E780	Ren hyperkolesterolemi	M	23	-	-	-	-	-
		K	12	-	-	-	-	-
E781	Ren hyperglyseridemi	K	1	-	-	-	-	-
E783	Hyperkylomikronemi	M	1	-	-	-	-	-
E784	Annen hyperlipidemi	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
E785	Uspesifisert hyperlipidemi	M	3	-	-	-	-	-
E802	Annen porfyri	K	1	-	-	-	-	-
E830	Forstyrrelser i kobbermetabolismen	M	1	-	-	-	-	1
E831	Forstyrrelser i jernmetabolismen	M	4	-	-	-	-	1
E835	Forstyrrelser i kalsiummetabolismen	K	1	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	E220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	E249
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	E271
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E274
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E349
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E512
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	E669
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E711
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E740
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E752
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E754
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E761
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E779
-	1	-	5	2	3	3	1	4	1	3	-	-	-	-	E780
-	-	2	-	1	-	1	2	3	1	1	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E781
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E783
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E784
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	E785
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E802
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	E831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E835

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
E854	Organbegrenset amyloidose	M	1	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
E858	Annen spesifisert amyloidose	M	2	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
E859	Uspesifisert amyloidose	M	2	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
E86	Væsketap	M	4	-	-	-	-	-
		K	35	-	-	-	-	-
E875	Hyperkalemi	M	1	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
E876	Hypokalemi	K	1	-	-	-	-	-
E878	Andre forstyrrelser i elektrolytt- og væskebalanse, ikke klassifisert annet sted	K	1	-	-	-	-	-
E880	Forstyrrelser i plasmaproteinmetabolismen, ikke klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
E889	Uspesifisert metabolsk forstyrrelse	K	1	1	-	-	-	-
E10-E14	Diabetes mellitus	M	249	-	-	-	-	2
		K	257	-	-	-	-	-
E100	Insulinavhengig diabetes mellitus ved koma	M	5	-	-	-	-	1
		K	4	-	-	-	-	-
E101	Insulinavhengig diabetes mellitus med ketoacidose	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
E102	Insulinavhengig diabetes mellitus med nyrekomplikasjoner	M	3	-	-	-	-	-
E104	Insulinavhengig diabetes mellitus med nevrologiske komplikasjoner	M	1	-	-	-	-	-
E105	Insulinavhengig diabetes mellitus med perifere sirkulasjonsforstyrrelser	M	3	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
E106	Insulinavhengig diabetes mellitus med andre spesifiserte komplikasjoner	M	11	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-
E107	Insulinavhengig diabetes mellitus med flere komplikasjoner	M	6	-	-	-	-	-
		K	7	-	-	-	-	-
E109	Insulinavhengig diabetes mellitus uten komplikasjoner	M	9	-	-	-	-	1
		K	5	-	-	-	-	-
E112	Ikke-insulinavhengig diabetes mellitus med nyrekomplikasjoner	K	1	-	-	-	-	-
E113	Ikke-insulinavhengig diabetes mellitus med øyekomplikasjoner	K	1	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E854
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	E858
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	E859
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		E86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	12	11		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	E875
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	E876
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	E878
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E880
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E889
5	3	2	4	10	7	7	19	26	31	44	38	34	14		E10-E14
-	-	5	4	3	2	4	10	22	22	43	57	45	40		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	E100
-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E101
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	E102
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	E105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	1	1	2	-	1	E106
-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	2	-	-	1	
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	E107
-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	E109
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	E112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E113

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
E115	Ikke-insulinavhengig diabetes mellitus med perifere sirkulasjonsforstyrrelser	M	6	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-
E116	Ikke-insulinavhengig diabetes mellitus med andre spesifiserte komplikasjoner	M	9	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
E117	Ikke-insulinavhengig diabetes mellitus med flere komplikasjoner	M	6	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
E118	Ikke-insulinavhengig diabetes mellitus med uspesifiserte komplikasjoner	K	1	-	-	-	-	-
E119	Ikke-insulinavhengig diabetes mellitus uten komplikasjoner	M	17	-	-	-	-	-
		K	22	-	-	-	-	-
E140	Uspesifisert diabetes mellitus ved koma	M	15	-	-	-	-	2
		K	7	-	-	-	-	-
E141	Uspesifisert diabetes mellitus med ketoacidose	M	1	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
E142	Uspesifisert diabetes mellitus med nyrekomplikasjoner	M	16	-	-	-	-	-
		K	18	-	-	-	-	-
E145	Uspesifisert diabetes mellitus med perifere sirkulasjonsforstyrrelser	M	24	-	-	-	-	-
		K	24	-	-	-	-	-
E146	Uspesifisert diabetes mellitus med andre spesifiserte komplikasjoner	M	21	-	-	-	-	-
		K	35	-	-	-	-	-
E147	Uspesifisert diabetes mellitus med flere komplikasjoner	M	20	-	-	-	-	-
		K	17	-	-	-	-	-
E148	Uspesifisert diabetes mellitus med uspesifiserte komplikasjoner	M	6	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
E149	Uspesifisert diabetes mellitus uten komplikasjoner	M	69	-	-	-	-	-
		K	87	-	-	-	-	-
F00-F99	V. PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDS FORSTYRRELSER	M	546	-	-	-	-	1 13
		K	575	-	-	-	-	1 4
F00-09	Organiske, inklusive symptomatiske, psykiske lidelser	M	196	-	-	-	-	-
		K	476	-	-	-	-	-
F011	Multiinfarktdemens	M	18	-	-	-	-	-
		K	21	-	-	-	-	-
F019	Uspesifisert vaskulær demens	M	6	-	-	-	-	-
		K	22	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	E115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	2	1	1	E116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	E117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E118
-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	8	3	1	1	E119
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	6	6	6	-
3	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	E140
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	1	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E141
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	4	1	3	6	-	-	-	1	E142
-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	6	-	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	8	2	8	3	E145
-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	4	-	3	1	1	E146
-	-	1	-	-	-	-	1	5	5	8	7	4	4	4	-
-	-	-	-	3	2	-	3	-	4	5	3	-	-	-	E147
-	-	-	-	1	-	4	2	3	2	3	1	1	-	1	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	E148
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
-	-	1	1	1	2	3	5	9	8	8	18	7	6	6	E149
-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	15	24	20	17	17	-
37	43	42	32	25	21	21	25	33	40	54	63	49	47	47	F00-F99
3	9	7	9	9	8	6	7	10	22	66	104	148	162	162	-
-	-	-	-	-	-	-	1	3	13	33	56	44	46	46	F00-09
-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	53	100	144	144	159	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	7	1	-	-	F011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	4	4	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	F019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	3	3	9	-

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år
F03	Annen og uspesifisert demens	M	172	-	-	-	-	-
		K	433	-	-	-	-	-
F10-F19	Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer	M	337	-	-	-	-	1 13
		K	68	-	-	-	-	1 4
F100	Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av alkohol, akutt intoksikasjon	M	15	-	-	-	-	-
		K	7	-	-	-	-	-
F102	Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av alkohol, avhengighetssyndrom	M	148	-	-	-	-	-
		K	33	-	-	-	-	1
F103	Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av alkohol, abstinens tilstand	M	1	-	-	-	-	-
F104	Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av alkohol, abstinens tilstand med delirium	M	3	-	-	-	-	-
F107	Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av alkohol, residual tilstand	M	5	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
F110	Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av opiat, akutt intoksikasjon	M	132	-	-	-	-	12
		K	22	-	-	-	-	1 3
F112	Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av opiat, avhengighetssyndrom	M	5	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
F113	Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av opiat, abstinens tilstand	M	1	-	-	-	-	-
F130	Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av sedativa og hypnotika, akutt intoksikasjon	M	2	-	-	-	-	-
F132	Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av sedativa og hypnotika, avhengighetssyndrom	M	1	-	-	-	-	-
F189	Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av flyktige løsemidler	M	12	-	-	-	-	-
F190	Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av flere stoffer, akutt intoksikasjon	M	1	-	-	-	-	1 -
F192	Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av flere stoffer, avhengighetssyndrom	M	10	-	-	-	-	1 -
F199	Psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse av flere stoffer, uspesifisert	M	1	-	-	-	-	-
F20-F99	Andre psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser	M	13	-	-	-	-	-
		K	31	-	-	-	-	-
F209	Uspesifisert schizofreni	M	8	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	28	48	42	45	F03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	42	89	137	146	
37 3	43 8	42 5	32 7	25 7	20 7	21 6	24 5	29 7	24 3	15 3	6 2	4 -	1 -		F10-F19
1 -	- 1	1 -	2 -	5 -	2 2	3 2	-	1 1	-	-	-	-	-	-	F100
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	F102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F103
-	-	-	1 1	1 1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	F104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1	2 -	1 -	F107
31 2	34 6	31 5	14 3	6 2	3 -	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	F110
1 1	2 -	- 1	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F112
-	1 -	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F113
-	1 -	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F130
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	F132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F189
3 1	1 -	4 -	3 -	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	F190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 -	3 -	1 -	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	F192
-	-	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F199
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	6	1	1	-	-	F20-F99
-	-	2	2	2	1	-	2	2	-	10	2	4	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	-	-	F209
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
F229	Uspesifisert paranoid psykose	K	2	-	-	-	-	-	-
F29	Uspesifisert ikke-organisk psykose	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	-
F319	Uspesifisert bipolar affektiv lidelse	K	4	-	-	-	-	-	-
F329	Uspesifisert depressiv episode	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	-
F332	Tilbakevendende depressiv lidelse, aktuell episode alvorlig, uten psykotiske syndromer	K	1	-	-	-	-	-	-
F339	Uspesifisert tilbakevendende depressiv lidelse	K	1	-	-	-	-	-	-
F411	Generalisert angstlidelse	K	1	-	-	-	-	-	-
F412	Blandet angstlidelse og depressiv lidelse	K	2	-	-	-	-	-	-
F500	Anorexia nervosa	K	6	-	-	-	-	-	-
F509	Uspesifisert spiseforstyrrelse	K	1	-	-	-	-	-	-
F609	Uspesifisert personlighetsforstyrrelse	M	1	-	-	-	-	-	-
F799	Uspesifisert psykisk utviklingshemning, uten beskrivelse av atferdsproblemer	K	1	-	-	-	-	-	-
F842	Retts syndrom	K	1	-	-	-	-	-	-
F99	Uspesifisert psykisk forstyrrelse eller lidelse, ikke nærmere angitt	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
G00-G99	VI. SYKDOMMER I NERVESYSTEMET	M	437	6	2	-	3	6	3
		K	452	1	5	2	1	3	3
G001	Pneumokokkmeningitt	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-	-
G003	Stafylokokkmeningitt	K	1	-	-	-	-	-	-
G009	Uspesifisert bakteriell meningitt	M	5	-	-	-	-	1	-
G039	Uspesifisert meningitt	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	5	-	1	-	1	-	-
G042	Bakteriell meningoencefalitt og meningomyelitt, ikke klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	-	-	-
G049	Uspesifisert encefalitt, myelitt og encephalomyelitt	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
G060	Intrakraniell abscess og granulom	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	1
G09	Følgetilstander etter betennelsesssykdommer i sentralnervesystemet	M	3	-	-	-	1	-	-
G10	Huntingtons sykdom	M	8	-	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	F229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	F29
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	F319
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F329
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F332
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	F339
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F411
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	F412
-	1	2	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	F500
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	F509
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F609
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F799
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
6 2	7 4	4 7	11 3	15 10	20 18	19 13	18 19	28 24	62 59	78 83	84 89	47 73	18 33	G00-G99	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	G001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	G003
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	G009
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	G039
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	G042
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	G049
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	G060
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	G09
1 -	-	-	1 2	-	1 -	1 1	-	1 1	2 -	1 -	-	-	-	-	G10

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
G111	Cerebellar ataksi med tidlig debut	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
G119	Uspesifisert arvelig ataksi	M	1	-	-	-	-	-
G120	Infantil spinal muskelatrofi, type I [Werdnig-Hoffmans syndrom]	M	1	1	-	-	-	-
G121	Annen arvelig spinal muskelatrofi	M	2	2	-	-	-	-
G122	Sykdom i motoriske nevroner	M	47	-	-	-	-	-
		K	57	-	-	-	-	-
G129	Uspesifisert spinal muskelatrofi	M	1	-	1	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
G20	Parkinsons sykdom	M	148	-	-	-	-	-
		K	127	-	-	-	-	-
G210	Malignt nevroleptika-syndrom	K	1	-	-	-	-	-
G230	Hallervorden-Spatz' sykdom	M	1	-	-	-	1	-
G231	Progressiv supranukleær oftalmoplegi	M	2	-	-	-	-	-
G239	Uspesifisert degenerativ sykdom i basalganglier	K	1	-	-	-	-	-
G300	Alzheimers sykdom med tidlig debut	M	2	-	-	-	-	-
		K	17	-	-	-	-	-
G301	Alzheimers sykdom med sen debut	M	23	-	-	-	-	-
		K	39	-	-	-	-	-
G309	Uspesifisert Alzheimers sykdom	M	25	-	-	-	-	-
		K	42	-	-	-	-	-
G310	Lokalisert hjerneatrofi	M	2	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
G311	Senil hjernedegenerasjon, ikke klassifisert annet sted	K	1	-	-	-	-	-
G312	Degenerasjon av sentralnervesystemet som skyldes alkohol	M	4	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
G319	Uspesifisert degenerativ sykdom i sentralnervesystemet	M	12	-	-	-	-	-
		K	18	-	-	-	-	-
G35	Multippel sklerose (MS)	M	31	-	-	-	-	-
		K	46	-	-	-	-	-
G403	Generalisert idiopatisk epilepsi og epileptiske syndromer	M	1	-	-	-	1	-
G405	Spesielle epileptiske syndromer	M	1	-	-	-	-	-
G406	Uspesifisert epilepsi med tonisk-kloniske anfall (med eller uten absenser)	K	1	-	-	-	-	-
G409	Uspesifisert epilepsi	M	32	1	1	-	-	1
		K	21	-	-	-	-	3
								1

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country, 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G111
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	G119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G121
1	1	1	-	3	6	4	3	9	5	7	7	-	-	-	G122
-	-	1	1	-	4	3	5	4	12	11	10	5	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	3	5	24	32	44	28	11	14	G20
-	-	-	-	-	-	-	2	10	22	43	36	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G210
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	G231
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	G239
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	G300
-	-	-	-	-	3	2	3	6	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	8	5	-	-	-	G301
-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	11	8	7	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	6	8	6	2	1	5	1	G309
-	-	-	-	-	-	3	1	6	10	7	10	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	G310
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	G311
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	G312
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	5	3	-	-	-	G319
-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	3	4	2	3	-	
-	1	1	3	2	4	3	2	5	6	3	1	-	-	-	G35
-	1	2	1	6	7	4	5	4	4	9	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G403
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	G406
2	2	-	6	4	3	3	1	1	4	1	-	-	-	1	G409
1	2	2	1	2	2	-	1	-	2	2	2	-	-	-	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
G419	Uspesifisert status epileptikus	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	1	-	-
G450	Arteria vertebralis-basilaris-syndrom	M	1	-	-	-	-	-
G459	Uspesifisert forbigående cerebralt iskemisk anfall	M	14	-	-	-	-	-
		K	12	-	-	-	-	-
G473	Søvnnapné	M	1	-	-	-	-	-
G542	Sykdommer i cervikale nerverøtter, ikke klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	-	-
G600	Arvelig motorisk og sensorisk nevropati	M	1	-	-	-	-	-
G610	Guillain-Barrés syndrom	K	1	-	-	-	-	-
G621	Alkoholisk polynevropati	M	2	-	-	-	-	-
G629	Uspesifisert polynevropati	K	1	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-
G700	Myasthenia gravis	K	2	-	-	-	-	-
G709	Uspesifisert nevromuskulær forstyrrelse	M	2	-	-	-	-	-
G710	Muskeldystrofi	M	9	-	-	-	-	3
		K	6	-	-	-	-	1
G711	Myotone lidelser	M	9	1	-	-	-	-
		K	4	-	1	-	-	-
G712	Medfødte myopatier	M	3	1	-	-	-	1
		K	2	1	1	-	-	-
G713	Mitokondriemyopati, ikke klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	-	-
		K	3	-	1	1	-	-
G724	Inflammatorisk myopati, ikke klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	-	-
G729	Uspesifisert myopati	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
G802	Infantil hæmiplegi	K	1	-	-	-	-	-
G809	Uspesifisert infantil cerebral parese	M	2	-	-	-	-	1
		K	2	-	1	-	-	-
G822	Uspesifisert paraplegi	M	2	-	-	-	-	-
G834	Cauda equina-syndrom	M	1	-	-	-	-	-
G839	Uspesifisert syndrom med lammelse	K	2	-	-	-	-	-
G903	Degenerasjon av flere systemer	M	2	-	-	-	-	-
G918	Annен spesifisert hydrocephalus	M	2	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
G919	Uspesifisert hydrocephalus	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age													ICD-10	
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	G419
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	G450
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	3	G459
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	G473
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	G542
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	G600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	G610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	G621
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	G629
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	G700
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	G709
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	G710
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	
-	-	-	3	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	G711
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	G712
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G713
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	G724
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	G729
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	G802
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G809
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	G822
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	G834
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	G839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	G903
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	G918
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	G919
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
G930	Hjernecyster	M	2	-	-	-	-	-	-
G931	Anoksisk hjerneskade, ikke klassifisert annet sted	M	2	-	-	-	-	-	-
G934	Uspesifisert encefalopati	M	4	-	-	-	-	-	-
		K	12	-	-	-	-	-	-
G936	Hjerneødem	M	1	-	-	-	-	-	-
G938	Andre spesifiserte hjernelidelser	K	1	-	-	-	-	-	1
G939	Uspesifisert hjernelidelse	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
G959	Uspesifisert ryggmargssykdom	M	3	-	-	-	-	-	-
H60-H95	VIII. SYKDOMMER I ØRE OG	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
H669	Uspesifisert mellomørebetennelse	M	1	-	-	-	-	-	-
H709	Uspesifisert mastoiditt	K	1	-	-	-	-	-	-
I00-I99	IX. SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET	M	9 651	-	1	-	1	2	6
		K	9 847	1	1	1	-	1	1
I05-I09	Kronisk reumatisk hjertesykdom	M	37	-	-	-	-	-	1
		K	84	-	-	-	-	-	-
I050	Mitralstenose	M	4	-	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-	-
I051	Reumatisk mitralinsuffisiens	K	1	-	-	-	-	-	-
I052	Mitralstenose med insuffisiens eller regurgitasjon	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-	-
I059	Uspesifisert mitralklaffsykdom	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-	-
I060	Reumatisk aortastenose	K	3	-	-	-	-	-	-
I062	Reumatisk aortastenose med insuffisiens eller regurgitasjon	K	1	-	-	-	-	-	-
I069	Uspesifisert reumatisk aortaklaffsykdom	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
I071	Trikuspidalinsuffisiens	K	2	-	-	-	-	-	-
I079	Uspesifisert trikuspidalklaffsykdom	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
I080	Affeksjoner av både mitral- og aortaklaff	M	22	-	-	-	-	-	-
		K	49	-	-	-	-	-	-
I081	Affeksjoner av både mitral- og trikuspidalklaff	M	2	-	-	-	-	-	1
		K	5	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	G930
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	G931
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	G934
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G936
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G938
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	G939
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	G959
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H60-H95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	H669
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	H709
12 3	19 7	34 9	67 18	137 27	218 56	262 69	441 138	840 334	1 479 788	1 912 1 492	2 012 2 336	1 389 2 402	819 2 163	100-I99	
-	-	-	-	1	1	4	4	8	8	6	2	2	2	-	I05-I09
-	-	-	3	-	-	3	11	17	24	17	9	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	I050
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	I051
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	I052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	I059
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	I060
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I062
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	I069
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	I071
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	I079
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	2	4	5	6	2	1	-	-	-	I080
-	-	-	2	-	-	1	5	12	14	11	4	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	I081
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år
I083	Kombinerte affeksjoner av mitral-, aorta- og trikuspidalklaff	M	2	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
I091	Reumatiske sykdommer i endokard, klaff uspesifisert	K	1	-	-	-	-	-
I099	Uspesifisert reumatisk hjertesykdom	M	2	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
I10-I15	I15 Hypertensjon	M	185	-	-	-	-	-
		K	238	-	-	-	-	-
I10	Essensiell (primær) hypertensjon	M	91	-	-	-	-	-
		K	119	-	-	-	-	-
I110	Hypertensiv hjertesykdom med stuvningssvikt	M	18	-	-	-	-	-
		K	59	-	-	-	-	-
I119	Hypertensiv hjertesykdom uten stuvningssvikt	M	20	-	-	-	-	-
		K	28	-	-	-	-	-
I120	Hypertensiv nyresykdom med nyresvikt	M	32	-	-	-	-	-
		K	17	-	-	-	-	-
I129	Hypertensiv nyresykdom uten nyresvikt	M	9	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
I130	Hypertensiv hjerte- og nyresykdom med stuvningssvikt	M	1	-	-	-	-	-
I131	Hypertensiv hjerte- og nyresykdom med nyresvikt	M	2	-	-	-	-	-
I132	Hypertensiv hjerte- og nyresykdom med både stuvnings- og nyresvikt	M	7	-	-	-	-	-
		K	9	-	-	-	-	-
I139	Uspesifisert hypertensiv hjerte- og nyresykdom	M	5	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
I20-I25	Iskemiske hjertesykdomer	M	5 127	-	-	-	-	2
		K	3 864	-	-	-	-	-
I200	Ustabil angina	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
I209	Uspesifisert angina pectoris	M	166	-	-	-	-	-
		K	182	-	-	-	-	-
I210	Akutt transmuralt hjerteinfarkt i fremre vegg, 1. gang	M	1	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
I211	Akutt transmuralt hjerteinfarkt i nedre vegg, 1. gang	K	1	-	-	-	-	-
I212	Akutt transmuralt hjerteinfarkt med annen lokalisasjon, 1. gang	M	2	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
I214	Akutt subendokardialt infarkt, 1. gang	M	1	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	I083
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	I091
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	I099
-	-	-	1	4	2	4	13	21	48	28	36	22	6	I10-I15	
-	-	-	-	1	1	1	7	15	17	45	68	45	39		
-	-	-	2	2	3	10	15	23	14	14	6	2	2	I10	
-	-	-	-	1	1	6	10	13	23	30	21	14	14		
-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	5	4	2	2	I110	
-	-	-	-	-	-	1	3	2	7	16	16	14	14		
-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	1	4	5	2	I119	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	10	4	8			
-	-	-	1	-	-	-	2	2	11	8	6	2	-	I120	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	1	2	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	1	1	I129	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	I130	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	I131	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	I132	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	1	-		
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	I139	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-		
5	4	18	37	99	160	175	294	562	836	1 033	988	596	318	I20-I25	
-	-	3	5	11	30	33	81	164	396	661	880	875	725		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	I200	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	1	1	4	5	6	13	16	43	34	30	13	I209	
-	-	-	-	-	2	1	5	4	28	45	49	48			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	I210	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	I211	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I212	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	I214	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år	20-24 år år
I219	Uspesifisert akutt hjerteinfarkt, 1. gang	M	2 722	-	-	-	-	-	2
		K	2 161	-	-	-	-	-	-
I220	Akutt hjerteinfarkt i fremre vegg, 2. gang eller senere	M	5	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
I221	Akutt hjerteinfarkt i nedre vegg, 2. gang eller senere	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
I228	Akutt hjerteinfarkt med annen spesifisert lokalisasjon, 2. gang eller senere	M	11	-	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-	-
I229	Akutt hjerteinfarkt med uspesifisert lokalisasjon, 2. gang eller senere	M	595	-	-	-	-	-	-
		K	256	-	-	-	-	-	-
I241	Postinfarktsyndrom	M	37	-	-	-	-	-	-
		K	23	-	-	-	-	-	-
I248	Andre spesifiserte former for akutt eller subakutt iskemisk hjertesykdom	M	4	-	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-	-
I249	Uspesifisert akutt eller subakutt iskemisk hjertesykdom	M	5	-	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-	-
I250	Aterosklerotisk hjerte-karsykdom, beskrevet som sådan	K	3	-	-	-	-	-	-
I251	Aterosklerotisk hjertesykdom	M	632	-	-	-	-	-	-
		K	490	-	-	-	-	-	-
I252	Gammelt hjerteinfarkt	M	133	-	-	-	-	-	-
		K	62	-	-	-	-	-	-
I255	Iskemisk kardiomyopati	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
I258	Andre spesifiserte former for kronisk iskemisk hjertesykdom	M	445	-	-	-	-	-	-
		K	297	-	-	-	-	-	-
I259	Uspesifisert kronisk iskemisk hjertesykdom	M	361	-	-	-	-	-	-
		K	360	-	-	-	-	-	-
I26-I28	Pulmonal hjertesykdom og sykdommer i lungekretsløpet	M	63	-	-	-	-	-	-
		K	96	1	-	1	-	1	-
I260	Lungeemboli med opplysning om akutt cor pulmonale	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	-
I269	Lungeemboli uten opplysning om akutt cor pulmonale	M	57	-	-	-	-	-	-
		K	79	-	-	-	-	-	-
I270	Primær pulmonal hypertensjon	M	4	-	-	-	-	-	-
		K	8	1	-	1	-	1	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
3	2	8	19	49	96	94	155	299	468	546	512	307	162	I219	
-	-	2	3	7	21	21	54	102	262	391	498	464	336		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	I220	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	I221	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	4	-	-	I228	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	2		
2	-	5	8	21	20	32	41	84	104	115	96	54	13	I229	
-	-	1	2	4	6	6	17	37	59	64	41	19			
-	-	-	-	-	1	1	-	1	6	7	14	6	1	I241	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	5	4		
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	I248	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1		
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	1	I249	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	1	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	I250	
-	2	2	7	16	21	28	44	64	77	117	120	74	60	I251	
-	1	1	1	3	1	9	13	31	73	84	130	143			
-	-	1	-	1	3	-	7	13	27	22	28	23	8	I252	
-	-	-	-	-	1	-	3	3	12	16	18	18	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	I255	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	-	1	2	6	6	8	22	56	65	99	97	54	29	I258	
-	-	-	-	2	1	6	7	32	40	83	69	57			
-	-	1	-	4	6	7	17	29	65	73	80	48	31	I259	
-	-	-	-	-	-	4	14	14	20	51	73	96	102		
1	-	-	-	1	4	2	3	3	9	16	15	8	2	I26-I28	
1	-	-	-	1	1	2	5	2	4	21	29	16	11		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	I260	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1		
-	-	-	-	1	4	1	2	2	8	14	15	8	2	I269	
-	-	-	-	1	1	1	4	1	3	19	27	13	9		
1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	I270	
1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-		

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år
I271	Kyfosalotisk hjertesykdom	K	4	-	-	-	-	-
I279	Uspesifisert pulmonal hjertesykdom	M	1	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
I30-I52	Andre typer hjertesykdommer	M	1 380	-	-	-	1	1
		K	2 055	-	1	-	-	-
I301	Infeksiøs perikarditt	K	1	-	-	-	-	-
I309	Uspesifisert akutt perikarditt	M	1	-	-	-	-	-
I311	Kronisk konstriktiv perikarditt	K	1	-	-	-	-	-
I313	Perikardeffusjon (ikke-inflammatorisk)	K	1	-	-	-	-	-
I319	Uspesifisert sykdom i perikard	M	1	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
I330	Akutt og subakutt infeksiøs endokarditt	M	4	-	-	-	-	-
		K	9	-	-	-	-	-
I339	Uspesifisert akutt ikke-reumatisk endokarditt	M	2	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
I340	Mitralinsuffisiens	M	25	-	-	-	-	-
		K	31	-	-	-	-	-
I341	Mitralprolaps	K	1	-	-	-	-	-
I342	Ikke-reumatisk mitralstenose	K	1	-	-	-	-	-
I349	Uspesifisert ikke-reumatisk mitralklaffefeil	M	3	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-
I350	Aortastenose	M	99	-	-	-	-	-
		K	203	-	-	-	-	-
I351	Aortainsuffisiens	M	12	-	-	-	-	-
		K	9	-	-	-	-	-
I352	Aortastenose med insuffisiens	M	6	-	-	-	-	-
		K	7	-	-	-	-	-
I358	Andre spesifiserte aortaklaffefeil	M	2	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
I359	Uspesifisert aortaklaffefeil	M	6	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-
I38	Endokarditt, uspesifisert klaff	M	11	-	-	-	-	-
		K	18	-	-	-	-	-
I409	Uspesifisert akutt myokarditt	M	2	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
I420	Dilatert kardiomyopati	M	11	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
I421	Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati	M	1	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	I271
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	I279
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
5	6	6	10	13	19	17	38	80	141	233	310	290	207	130-I52	
-	2	1	2	3	3	6	11	35	88	247	423	586	647	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	I301
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I309
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	I311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	I313
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I319
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	I330
-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	I339
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	2	5	7	3	3	I340
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	7	7	9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	I341
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	I342
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	I349
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	2	-	
1	-	-	-	-	-	1	4	5	16	18	27	23	4	4	I350
-	-	-	-	-	1	-	-	4	14	38	48	54	44	-	
-	-	-	1	1	-	2	2	1	1	2	2	-	-	-	I351
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	1	1	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	I352
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	I358
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	I359
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-	-	
-	-	1	-	-	2	-	1	2	2	-	1	1	1	1	I38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	5	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	I409
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	1	1	1	4	1	1	-	-	-	I420
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I421
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år	20-24 år år
I422	Annen hypertrofisk kardiomyopati	M	5	-	-	-	-	1	-
		K	6	-	-	-	-	-	-
I424	Endokardial fibroelastose	M	1	-	-	-	-	-	-
I426	Alkoholisk kardiomyopati	M	11	-	-	-	-	-	-
I428	Andre spesifiserte kardiomyopatier	K	1	-	-	-	-	-	-
I429	Uspesifisert kardiomyopati	M	36	-	-	-	1	-	-
		K	30	-	1	-	-	-	-
I442	Atrioventrikulært blokk, totalt	M	6	-	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-	-
I443	Annet og uspesifisert atrioventrikulært blokk	M	4	-	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-	-
I455	Annet spesifisert hjerteblokk	K	1	-	-	-	-	-	-
I456	Preeksitasjonssyndrom	M	1	-	-	-	-	-	1
I458	Andre spesifiserte ledningsforstyrrelser	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
I459	Uspesifisert ledningsforstyrrelse	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-	-
I461	Plutselig hjertedød, beskrevet som sådan	M	15	-	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-	-
I469	Uspesifisert hjertestans	M	43	-	-	-	-	-	-
		K	31	-	-	-	-	-	-
I471	Supraventrikulær takykardi	K	6	-	-	-	-	-	-
I472	Ventrikulær takykardi	K	2	-	-	-	-	-	-
I479	Uspesifisert paroksysmal takykardi	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
I48	Atrieflimmer og atrieflutter	M	190	-	-	-	-	-	-
		K	280	-	-	-	-	-	-
I490	Ventrikkelflimmer og ventrikkelflutter	M	15	-	-	-	-	-	-
		K	7	-	-	-	-	-	-
I494	Annen og uspesifisert prematur depolarisasjon	M	1	-	-	-	-	-	-
I495	Syk-sinus-syndrom (SSS)	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-	-
I498	Andre spesifiserte hjertearytmier	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
I499	Uspesifisert hjertearytmii	M	26	-	-	-	-	-	-
		K	40	-	-	-	-	-	-
I500	Kongestiv hjertesvikt	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
I501	Venstresidig ventrikkelsvikt	M	87	-	-	-	-	-	-
		K	122	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age														ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	I422
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	I424
-	-	-	1	1	1	-	1	3	4	-	-	-	-	I426
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	I428
2	-	1	2	1	1	3	5	5	7	3	3	2	-	I429
-	-	1	1	-	2	1	1	-	6	7	3	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	I442
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	I443
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	I455
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I456
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	I458
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	I459
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	
-	-	1	-	1	1	-	2	5	3	-	-	-	2	I461
-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	1	
-	1	-	-	-	4	-	4	9	4	8	5	5	3	I469
-	-	-	-	-	-	3	3	1	5	5	5	7	7	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	2	-	I471
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	I472
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	I479
-	-	-	-	-	1	1	1	5	21	40	51	48	22	I48
-	-	-	-	-	-	-	2	5	14	35	58	86	80	
-	-	1	-	1	1	-	2	3	2	4	-	-	1	I490
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	I494
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	I495
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	I498
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	1	-	1	1	3	4	6	2	5	3	I499	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	10	16	10	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	I500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
1	-	-	-	-	-	1	2	1	5	19	16	22	20	I501
-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	8	31	40	34	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
I509	Uspesifisert hjertesvikt	M	574	-	-	-	-	-	1
		K	977	-	-	-	-	-	-
I513	Intrakardial trombose, ikke klassifisert annet sted	K	1	-	-	-	-	-	-
I514	Uspesifisert myokarditt	M	2	-	-	-	-	-	1
I515	Degenerativ hjertemuskelforandring	K	1	-	-	-	-	-	-
I516	Uspesifisert hjerte-karsydom	M	67	-	-	-	-	-	-
		K	89	-	-	-	-	-	-
I517	Kardiomegali	M	13	-	-	-	-	-	-
		K	11	-	-	-	-	-	-
I519	Uspesifisert hjertesykdom	M	87	-	-	-	-	-	-
		K	109	-	-	-	-	-	-
I60-I69	Hjernekarsydommer	M	2 180	-	1	-	-	1	-
		K	3 040	-	-	-	-	-	-
I600	Subaraknoidalblødning fra carotissifon og carotisbifurkatur	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	-
I601	Subaraknoidalblødning fra arteria cerebri media	M	10	-	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-	-
I602	Subaraknoidalblødning fra arteria communicans anterior	M	8	-	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-	-
I603	Subaraknoidalblødning fra arteria communicans posterior	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
I604	Subaraknoidalblødning fra arteria basilaris	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
I605	Subaraknoidalblødning fra arteria vertebralis	M	1	-	-	-	-	-	-
I606	Subaraknoidalblødning fra andre intrakranielle arterier	K	1	-	-	-	-	-	-
I607	Subaraknoidalblødning fra uspesifisert intrakraniell arterie	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
I608	Annen spesifisert subaraknoidalblødning	M	2	-	1	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
I609	Uspesifisert subaraknoidalblødning	M	44	-	-	-	-	1	-
		K	80	-	-	-	-	-	-
I611	Kortikal intracerebral blødning i hjernehalvdel	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
I612	Uspesifisert intracerebral blødning i hjernehalvdel	M	10	-	-	-	-	-	-
		K	9	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	3	-	2	3	2	2	10	17	36	83	150	147	118	I509	
-	1	-	-	1	1	-	1	8	28	89	201	282	365		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	I513	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I514	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	I515	
-	-	-	-	-	1	-	1	7	7	17	15	14	5	I516	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	18	11	22	30		
1	-	1	-	2	1	1	-	-	1	-	4	1	1	I517	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	3	1		
-	-	-	1	-	1	2	1	11	12	17	20	9	13	I519	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	14	21	32	36		
2	7	8	16	17	26	43	59	122	305	441	523	382	227	I60-I69	
1	5	5	11	9	17	21	28	95	217	437	800	768	626		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	I600	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	1	1	2	-	1	2	-	2	-	1	-	-	-	I601	
-	1	-	-	2	-	1	1	-	2	-	1	-	-		
-	1	1	1	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	I602	
-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I603	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	I604	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I605	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I606	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	I607	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	I608	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		
2	-	2	5	2	5	6	4	4	5	3	4	1	-	I609	
-	2	3	6	3	7	6	6	9	11	9	10	5	3		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	I611	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	1	-	-	1	-	1	-	-	6	-	1	-	-	I612	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	1	-		

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
I613	Hjernestammeblødning	M	13	-	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-	-
I614	Intracerebellar blødning	M	4	-	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-	-
I615	Intraventrikulær hjerneblødning	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
I616	Hjerneblødning med flere lokalisasjoner	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
I618	Annen spesifisert hjerneblødning	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
I619	Uspesifisert hjerneblødning	M	252	-	-	-	-	-	-
		K	280	-	-	-	-	-	-
I620	Subduralblødning (akutt/ikke-traumatisk)	M	15	-	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-	-
I629	Uspesifisert intrakraniell blødning (ikke-traumatisk)	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
I630	Hjerneinfarkt forårsaket av trombose i precerebrale arterier	M	15	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
I631	Hjerneinfarkt forårsaket av emboli i precerebrale arterier	M	2	-	-	-	-	-	-
I632	Hjerneinfarkt forårsaket av uspesifiserte okklusjoner eller stenose i precerebrale arterier	M	5	-	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	-
I633	Hjerneinfarkt forårsaket av trombose i hjernearterier	M	43	-	-	-	-	-	-
		K	53	-	-	-	-	-	-
I634	Hjerneinfarkt forårsaket av emboli i hernearterier	M	7	-	-	-	-	-	-
		K	13	-	-	-	-	-	-
I635	Hjerneinfarkt forårsaket av uspesifisert okklusjon eller stenose i hernearterier	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
I638	Annet spesifisert hjerneinfarkt	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-	-
I639	Uspesifisert hjerneinfarkt	M	139	-	-	-	-	-	-
		K	177	-	-	-	-	-	-
I64	Hjerneslag, ikke spesifisert som blødning eller infarkt	M	1 224	-	-	-	-	-	-
		K	1 899	-	-	-	-	-	-
I672	Cerebral aterosklerose	M	21	-	-	-	-	-	-
		K	24	-	-	-	-	-	-
I673	Progressiv vaskulær leukoencefalopati	M	1	-	-	-	-	-	-
I674	Hypertensiv encefalopati	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	2	-	1	3	2	2	3	-	-	-	I613
-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	I614
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	I615
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	I616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	I618
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	1	-	2	6	10	11	8	23	46	74	40	22	9	I619	
-	1	-	3	-	3	5	9	22	36	67	64	43	27		
-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	2	4	4	-	I620	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	I629	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	1	-	-	1	1	-	1	2	5	3	1	-	-	I630	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	I631	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	I632	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	arte	
-	-	-	2	-	-	1	3	3	8	11	8	4	3	I633	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	5	5	19	7	15		
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	I634	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	4	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	I635	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	I638	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1		
-	-	-	2	1	-	4	8	14	23	31	30	14	12	I639	
-	-	-	-	1	3	2	1	10	13	35	54	37	21		
-	-	-	2	4	13	20	51	155	231	343	251	154	I64		
-	-	-	2	-	3	6	39	116	247	509	523	454			
-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	2	4	6	I672	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	9	6	6	6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	I673	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	I674	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
I677	Cerebral arteritt, ikke klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	-	-	-
I678	Andre spesifiserte hjernekarsydommer	M	5	-	-	-	-	-	-
		K	13	-	-	-	-	-	-
I679	Uspesifisert hjernekarsydom	M	24	-	-	-	-	-	-
		K	42	-	-	-	-	-	-
I690	Følgetilstander etter subaraknoidalblødning	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	-
I691	Følgetilstander etter hjerneblødning	M	10	-	-	-	-	-	-
		K	12	-	-	-	-	-	-
I692	Følgetilstander etter annen ikke-traumatisk intrakraniell blødning	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
I693	Følgetilstander etter hjerneinfarkt	M	14	-	-	-	-	-	-
		K	20	-	-	-	-	-	-
I694	Følgetilstander etter hjerneslag, ikke spesifisert som blødning eller infarkt	M	272	-	-	-	-	-	-
		K	335	-	-	-	-	-	-
I698	Følgetilstander etter andre og uspesifiserte hjernekarsydommer	M	12	-	-	-	-	-	-
		K	18	-	-	-	-	-	-
I70-I79	Sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer	M	645	-	-	-	-	-	-
		K	418	-	-	-	-	-	-
I700	Aterosklerose i aorta	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
I701	Aterosklerose i arteria renalis	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
I702	Aterosklerose i arterie i ekstremitet	M	107	-	-	-	-	-	-
		K	94	-	-	-	-	-	-
I708	Aterosklerose i andre spesifiserte arterier	K	3	-	-	-	-	-	-
I709	Generalisert og uspesifisert aterosklerose	M	73	-	-	-	-	-	-
		K	80	-	-	-	-	-	-
I710	Aortadisseksjon (enhver del)	M	57	-	-	-	-	-	-
		K	47	-	-	-	-	-	-
I711	Torakalt aorta-aneurisme med ruptur	M	17	-	-	-	-	-	-
		K	22	-	-	-	-	-	-
I712	Torakalt aorta-aneurisme uten opplysning om ruptur	M	14	-	-	-	-	-	-
		K	7	-	-	-	-	-	-
I713	Abdominalt aorta-aneurisme med ruptur	M	122	-	-	-	-	-	-
		K	36	-	-	-	-	-	-
I714	Abdominalt aorta-aneurisme uten opplysning om ruptur	M	45	-	-	-	-	-	-
		K	11	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I677
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	I678
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	6	8	-	I679
-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	12	16	16	6	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	I690
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	2	1	1	2	2	-	1	2	1	-	I691
-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	I692	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	6	2	2	2	2	-	-	I693
-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	6	6	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	4	11	32	58	66	67	34	-	I694
-	-	-	-	-	-	1	1	7	13	47	89	105	72	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	3	-	I698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	8	
-	2	1	3	2	6	17	29	46	127	149	127	82	54	-	I70-I79
-	-	-	-	4	6	5	18	48	57	57	101	84	95	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	I700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	I701
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	5	1	6	13	29	21	15	17	17	-	I702
-	-	-	-	1	1	-	4	9	9	17	20	20	33	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	I708
-	-	-	-	-	1	2	2	3	6	14	16	15	14	-	I709
-	2	1	2	1	4	6	5	7	10	9	7	1	2	-	I710
-	-	-	-	2	2	3	2	12	8	10	4	4	4	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	6	5	3	-	-	-	-	I711
-	-	-	-	1	-	-	2	4	6	8	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	5	2	-	-	I712
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	6	15	34	29	23	9	5	-	I713
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	11	7	11	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	4	1	16	13	2	6	3	-	I714
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	1	-	-	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
I715	Torakoabdominalt aorta-aneurisme med ruptur	M	5	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
I716	Torakoabdominalt aorta-aneurisme uten opplysning om ruptur	M	1	-	-	-	-	-	-
I718	Aorta-aneurisme med uspesifisert lokalisasjon, med ruptur	M	80	-	-	-	-	-	-
		K	34	-	-	-	-	-	-
I719	Aorta-aneurisme med uspesifisert lokalisasjon, uten opplysning om ruptur	M	53	-	-	-	-	-	-
		K	30	-	-	-	-	-	-
I723	Aneurisme i arteria iliaca	M	6	-	-	-	-	-	-
I724	Aneurisme i arterie i underekstremitet	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
I728	Aneurisme i andre spesifiserte arterier	M	1	-	-	-	-	-	-
I730	Raynauds syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-
I739	Uspesifisert sykdom i perifere kar	M	4	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
I740	Emboli og trombose i abdominal aorta	M	3	-	-	-	-	-	-
I741	Emboli og trombose i andre og uspesifiserte deler av aorta	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
I742	Emboli og trombose i arterier i overekstremitter	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
I743	Emboli og trombose i arterier i underekstremitter	M	24	-	-	-	-	-	-
		K	22	-	-	-	-	-	-
I744	Emboli og trombose i uspesifiserte ekstremitetsarterier	K	1	-	-	-	-	-	-
I745	Emboli og trombose i arteria iliaca	M	4	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
I749	Emboli og trombose i uspesifisert arterie	M	10	-	-	-	-	-	-
		K	10	-	-	-	-	-	-
I771	Arteriestriktur	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-	-
I772	Arterieruptur	M	1	-	-	-	-	-	-
I773	Arteriell fibromuskulær dysplasi	K	1	-	-	-	-	-	-
I776	Uspesifisert arteritt	K	1	-	-	-	-	-	-
I778	Andre spesifiserte forstyrrelser i arterier og arterioler	M	1	-	-	-	-	-	-
I779	Uspesifisert forstyrrelse i arterier og arterioler	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
I780	Arvelig hemoragisk teleangioktasi	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age														ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	I715
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I716
-	-	-	-	-	-	6	5	23	20	13	11	2	1	I718
-	-	-	-	-	1	1	3	2	5	13	8	1		
-	-	-	1	1	-	1	2	6	12	17	11	2	1	I719
-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	8	8	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	I723
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	I724
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	I728
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	I730
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	I739
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	I740
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	I741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	I742
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	1	2	5	6	4	3	4	I743
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	7	4	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	I744
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	I745
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	1	I749
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	I771
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	I772
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	I773
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	I776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	I778
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	I779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	I780
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år
I80-I89	I89 Sykdommer i vener, lymfekar og lymfeknuter, ikke klassifisert annet sted	M	25	-	-	-	-	-
		K	43	-	-	-	-	1
I801	Flebitt og tromboflebitt i vena femoralis	M	4	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-
I802	Flebitt og tromboflebitt i andre dype kar i underekstremitter	M	17	-	-	-	-	-
		K	29	-	-	-	-	-
I803	Uspesifisert flebitt og tromboflebitt i underekstremitter	M	2	-	-	-	-	-
		K	7	-	-	-	-	-
I820	Budd-Chiaris syndrom	K	1	-	-	-	-	1
I822	Embolii og trombose i vena cava	K	1	-	-	-	-	-
I829	Embolii og trombose i uspesifisert vene	M	1	-	-	-	-	-
I872	Venøs insuffisiens (kronisk/perifer)	M	1	-	-	-	-	-
I95-I99	Andre og uspesifiserte forstyrrelser i sirkulasjonssystemet	M	9	-	-	-	-	-
		K	9	-	-	-	-	-
I959	Uspesifisert hypotensjon	M	1	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-
I99	Andre og uspesifiserte forstyrrelser i sirkulasjonssystemet	M	8	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-
J00-J99	X. SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSORGANENE	M	1 886	6	1	-	-	-
		K	2 047	4	-	-	1	2
J00-J06	Akutte infeksjoner i øvre luftveier	M	1	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	1
J00	Akutt nasofaryngitt	K	1	-	-	-	-	-
J039	Uspesifisert akutt tonsillitt	K	3	-	-	-	-	1
J040	Akutt laryngitt	K	1	-	-	-	-	-
J069	Uspesifisert akutt infeksjon i øvre luftveier	M	1	-	-	-	-	-
J10-J18	Influensa og pneumoni	M	840	4	-	-	-	-
		K	1 293	3	-	-	-	-
J110	Influensa med pneumoni, uidentifisert virus	M	7	-	-	-	-	-
		K	12	-	-	-	-	-
J111	Influensa med annen luftveissykdom, uidentifisert virus	M	7	-	-	-	-	-
		K	21	-	-	-	-	-
J129	Uspesifisert viruspneumoni	M	1	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	1	-	1	-	3	1	2	4	3	3	6	1	180-I89	
1	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	8	10	9		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	I801	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1		
-	-	1	-	-	-	2	1	1	2	2	2	5	1	I802	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	7	6	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	I803	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I820	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	I822	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I829	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	I872	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	1	I95-I99	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	I959	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1		
-	-	2	3	12	16	33	60	104	227	384	439	348	251	J00-J99	
2	1	1	1	9	17	31	43	67	143	248	407	504	566		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	J00-J06	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	J00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	J039	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	J040	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	J069	
-	-	-	1	3	4	3	8	13	49	120	211	225	199	J10-J18	
1	1	-	2	4	4	4	5	6	33	105	249	402	478		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	J110	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	5		
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	3	J111	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	8	5			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	J129	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
J13	Pneumoni som skyldes <i>Streptococcus pneumoniae</i>	M	5	1	-	-	-	-
		K	5	1	-	-	-	-
J152	Pneumoni som skyldes <i>Staphylococcus</i>	M	1	-	-	-	-	-
J153	Pneumoni som skyldes <i>Streptococcus</i> , serogruppe B	K	1	1	-	-	-	-
J154	Pneumoni som skyldes andre streptokokker	M	1	-	-	-	-	-
J155	Pneumoni som skyldes <i>Escherichia coli</i>	K	1	-	-	-	-	-
J156	Pneumoni som skyldes andre aerobe gram-negative bakterier	M	1	-	-	-	-	-
J159	Uspesifisert bakteriell pneumoni	K	1	-	-	-	-	-
J180	Bronkopneumoni, uspesifisert mikroorganisme	M	89	1	-	-	-	-
		K	146	-	-	-	-	-
J181	Lobær pneumoni, uspesifisert mikroorganisme	M	10	-	-	-	-	-
		K	9	-	-	-	-	-
J182	Hypostatisk pneumoni, uspesifisert mikroorganisme	M	1	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-
J188	Annen spesifisert pneumoni, uspesifisert mikroorganisme	M	1	-	-	-	-	-
J189	Uspesifisert pneumoni	M	716	2	-	-	-	-
		K	1 090	1	-	-	-	-
J20-J99	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	M	1 045	2	1	-	-	-
		K	749	1	-	-	-	2
J208	Akutt bronkitt som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer	K	1	1	-	-	-	-
J209	Uspesifisert akutt bronkitt	M	2	-	1	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
J210	Akutt bronkiolitt som skyldes respiratorisk syncytialvirus [RSV]	M	1	1	-	-	-	-
J22	Uspesifisert akutt infeksjon i nedre luftveier	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
J359	Uspesifisert kronisk sykdom i mandler og adenoid vev	M	1	-	-	-	-	-
J392	Andre sykdommer i svelg	K	2	-	-	-	-	-
J398	Andre spesifiserte sykdommer i øvre luftveier	M	1	-	-	-	-	-
J40	Bronkitt, ikke spesifisert som akutt eller kronisk	M	7	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-
J42	Uspesifisert kronisk bronkitt	M	13	-	-	-	-	-
		K	15	-	-	-	-	-
J432	Centrilobulært emfysem	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country, 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	J13
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	J152
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J153
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	J154
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	J155
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	J156
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	J159
-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	9	13	32	28	-	J180
-	-	-	1	-	1	-	2	6	13	26	41	56	-	-	-
-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	-	-	J181
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	J182
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	J188
-	-	-	1	3	2	5	10	42	107	193	187	164	-	-	J189
1	1	-	1	3	1	3	4	23	85	215	349	403	-	-	-
-	-	2	2	9	12	30	52	91	178	264	227	123	52	-	J20-J99
1	-	1	1	7	13	27	38	61	110	142	157	101	87	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J208
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	J209
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J210
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	J22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J359
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	J392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	J398
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	-	-	J40
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	2	3	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	3	3	8	J42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	J432
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
J439	Uspesifisert emfysem	M	87	-	-	-	-	-
		K	39	-	-	-	-	-
J440	Kronisk obstruktiv lungesykdom med akutt infeksjon i nedre luftveier	M	277	-	-	-	-	-
		K	165	-	-	-	-	-
J441	Uspesifisert kronisk obstruktiv lunge-sykdom med akutt forverring	M	3	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
J448	Annен spesifisert kronisk obstruktiv lungesykdom	M	18	-	-	-	-	-
		K	15	-	-	-	-	-
J449	Uspesifisert kronisk obstruktiv lungesykdom	M	349	-	-	-	-	-
		K	251	-	-	-	-	-
J459	Uspesifisert astma	M	142	-	-	-	-	-
		K	142	-	-	-	-	1
J46	Akutt alvorlig astma	M	3	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-
J47	Bronkiktasi	M	3	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
J60	Pneumokoniose med kullstøv	M	1	-	-	-	-	-
J61	Pneumokoniose som skyldes asbest og andre mineralfibre	M	13	-	-	-	-	-
J628	Pneumokoniose som skyldes annet stenstøv	M	4	-	-	-	-	-
J64	Uspesifisert pneumokoniose	M	1	-	-	-	-	-
J679	Lungesykdom som skyldes uspesifisert organisk støv	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
J690	Pneumoni forårsaket av mat og oppkast	M	12	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-
J80	Respiratorisk distressyndrom hos voksne [ARDS]	M	1	-	-	-	-	-
J81	Lungeødem	M	13	-	-	-	-	-
		K	27	-	-	-	-	-
J840	Alveolære og parietoalveolære tilstander	M	1	-	-	-	-	-
J841	Annen interstitiell lungesykdom med fibrose	M	60	-	-	-	-	-
		K	43	-	-	-	-	-
J849	Uspesifisert interstitiell lungesykdom	M	5	1	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
J851	Lungeabscess med pneumoni	K	3	-	-	-	-	1
J852	Lungeabscess uten pneumoni	M	5	-	-	-	-	-
J869	Pyotoraks uten fistel	M	2	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
J90	Pleuraeffusjon, ikke klassifisert annet sted	K	2	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age														ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	-	-	-	-	1	2	7	9	21	23	13	9	2	J439
-	-	-	-	-	-	3	1	1	6	12	6	3	7	
-	-	-	-	-	-	5	11	16	40	79	75	37	14	J440
-	-	-	-	1	4	5	2	13	24	29	45	25	17	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	J441
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	5	3	1	-	J448
-	-	1	-	-	1	1	3	3	2	1	1	1	1	
-	-	-	-	2	3	10	18	35	56	107	74	39	5	J449
-	-	-	-	3	4	8	23	25	50	57	42	24	15	
-	-	1	-	3	5	6	10	16	24	20	29	13	15	J459
-	-	-	1	3	2	8	4	9	19	23	29	24	19	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	J46
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	J47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	J60
-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	4	1	-	-	J61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	J628
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	J64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	J679
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	2	2	2	J690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	J80
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	6	2	2	J81
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	12	6	8	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J840
-	-	1	-	2	2	1	1	8	14	15	9	2	5	J841
1	-	-	-	1	1	2	6	7	9	14	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	J849
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	J851
-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	J852
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	J869
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	J90

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
J920	Pleuraplakk med tilstedevarsel av asbest	M	1	-	-	-	-	-
J939	Uspesifisert pneumotoraks	M	1	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
J948	Andre spesifiserte tilstander i brysthinne	K	1	-	-	-	-	-
J961	Kronisk respirasjonssvikt	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
J969	Uspesifisert respirasjonssvikt	M	3	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
J981	Pulmonal kollaps	M	1	-	-	-	-	-
J984	Annen lungeforstyrrelse	M	4	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
J986	Forstyrrelser i mellomgulv	M	1	-	-	-	-	-
J988	Andre spesifiserte åndedrettsforstyrrelser	M	4	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
J989	Uspesifisert åndedrettsforstyrrelse	M	1	-	-	-	-	-
K00-K93	XI. SYKDOMMER I FORDØYELSESSYSTEMET	M	649	1	-	-	-	1
		K	661	-	-	-	-	-
K112	Sialadenitt	K	2	-	-	-	-	-
K20	Øsofagitt	M	3	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
K210	Gastroøsofageal refluksykdom med øsofagitt	M	1	-	-	-	-	-
K221	Sår i spiserør	M	4	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
K222	Obstruksjon av spiserør	M	4	-	-	-	-	-
K223	Perforasjon av spiserør	M	1	-	-	-	-	-
K225	Ervervet øsofagusdivertikkelt	M	2	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
K226	Gastroøsofagealt sår- og blødningssyndrom	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
K228	Andre spesifiserte sykdommer i spiserør	M	1	-	-	-	-	-
K229	Uspesifisert sykdom i spiserør	M	1	-	-	-	-	-
K250	Sår i magesekk, akutt med blødning	M	2	-	-	-	-	-
K253	Sår i magesekk, akutt uten blødning eller perforasjon	K	1	-	-	-	-	-
K254	Sår i magesekk, kronisk eller uspesifisert med blødning	M	26	-	-	-	-	-
		K	23	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10	
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	J920	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	J939	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	J948	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	J961	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	J969	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	J981	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	J984	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	J986	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	J988	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	J989	
2	5	11	16	32	32	36	32	45	86	106	107	83	54	K00-K93		
1	-	2	2	8	8	14	24	25	52	92	156	163	114	114		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	K112	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	K20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	K210	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	K221	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	K222	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	K223	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	K225	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	K226	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	K228	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	K229	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	K250	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	K253	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	6	6	6	3	K254	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	8	5	5	-	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år	20-24 år år
K255	Sår i magesekk, kronisk eller uspesifisert med perforasjon	M	12	-	-	-	-	-	-
		K	20	-	-	-	-	-	-
K256	Sår i magesekk, kronisk eller uspesifisert med både blødning og perforasjon	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
K257	Sår i magesekk, kronisk uten blødning eller perforasjon	M	1	-	-	-	-	-	-
K259	Sår i magesekk, uspesifisert som akutt eller kronisk uten blødning eller perforasjon	M	5	-	-	-	-	-	-
		K	15	-	-	-	-	-	-
K262	Sår i tolvfingertarm, akutt med blødning og perforasjon	K	1	-	-	-	-	-	-
K264	Sår i tolvfingertarm, kronisk eller uspesifisert med blødning	M	17	-	-	-	-	-	-
		K	13	-	-	-	-	-	-
K265	Sår i tolvfingertarm, kronisk eller uspesifisert med perforasjon	M	14	-	-	-	-	-	-
		K	9	-	-	-	-	-	-
K266	Sår i tolvfingertarm, kronisk eller uspesifisert med både blødning og perforasjon	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
K269	Sår i tolvfingertarm, uspesifisert som akutt eller kronisk uten blødning eller perforasjon	M	9	-	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-	-
K270	Magesår, uspesifisert lokalisasjon, akutt med blødning	K	1	-	-	-	-	-	-
K274	Magesår, uspesifisert lokalisasjon, kronisk eller uspesifisert med blødning	M	17	-	-	-	-	-	-
		K	11	-	-	-	-	-	-
K275	Magesår, uspesifisert lokalisasjon, kronisk eller uspesifisert med perforasjon	M	18	-	-	-	-	-	-
		K	15	-	-	-	-	-	-
K276	Magesår, uspesifisert lokalisasjon, kronisk eller uspesifisert med både blødning og perforasjon	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	-
K279	Magesår, uspesifisert lokalisasjon, uspesifisert som akutt eller kronisk uten blødning eller perforasjon	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-	-
K284	Gastrojejunalt sår, kronisk eller uspesifisert med blødning	K	1	-	-	-	-	-	-
K286	Gastrojejunalt sår, kronisk eller uspesifisert med både blødning og perforasjon	M	1	-	-	-	-	-	-
K290	Akutt hemoragisk gastritt	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age														ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	2	3	2	-	K255
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	6	6	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	K256
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	K257
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	K259
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	6	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	K262
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	2	4	2	K264
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	6	1	1	K265
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	K266
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	3	1	1	K269
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	K270
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	5	4	3	K274
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	4	3	K275
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	K276
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	K279
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	K284
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	K286
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	K290

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
K291	Annen akutt gastritt			M	1	-	-	-
				K	1	-	-	-
K292	Alkoholisk gastritt			M	1	-	-	-
K295	Uspesifisert kronisk gastritt			K	1	-	-	-
K297	Uspesifisert gastritt			M	1	-	-	-
				K	1	-	-	-
K298	Duodenitt			M	1	-	-	-
K311	Hypertrofisk pylorusstenose hos voksne			K	2	-	-	-
K312	Timeglassformet striktur og stenose av magesekk			M	1	-	-	-
K319	Uspesifisert sykdom i magesekk og tolvfingertarm			M	1	-	-	-
				K	1	-	-	-
K350	Akutt appendisitt med generalisert peritonitt			M	8	-	-	-
				K	2	-	-	-
K359	Uspesifisert akutt appendisitt			K	5	-	-	-
K37	Uspesifisert appendisitt			K	2	-	-	-
K403	Enkeltsidig eller uspesifisert lyskebrokk med obstruksjon, uten gangren			M	3	-	-	-
				K	5	-	-	-
K404	Enkeltsidig eller uspesifisert lyskebrokk med gangren			M	4	-	-	-
K409	Enkeltsidig eller uspesifisert lyskebrokk uten obstruksjon eller gangren			M	3	-	-	-
K413	Enkeltsidig eller uspesifisert lårbrokk med obstruksjon, uten gangren			K	3	-	-	-
K421	Navlebrokk med gangren			M	1	-	-	-
K429	Navlebrokk uten obstruksjon eller gangren			K	1	-	-	-
K430	Ventralt brokk med obstruksjon, uten gangren			M	1	-	-	-
				K	2	-	-	-
K439	Ventralt brokk uten obstruksjon eller gangren			K	2	-	-	-
K440	Mellomgulvsbrokk med obstruksjon, uten gangren			K	1	-	-	-
K449	Mellomgulvsbrokk uten obstruksjon eller gangren			M	2	-	-	-
				K	6	-	-	-
K450	Annet spesifisert abdominalt brokk med obstruksjon, uten gangren			K	1	-	-	-
K451	Annet spesifisert abdominalt brokk med gangren			K	1	-	-	-
K461	Uspesifisert abdominalt brokk med gangren			K	1	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age													ICD-10	
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	K291
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K292
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	K295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	K297
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	K298
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	K311
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	K312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	K319
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-	K350
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	K359
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	K37
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	K403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	K404
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	K409
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	K413
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	K421
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	K429
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	K430
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	K439
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	K440
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	-	K449
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	K450
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	K451
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	K461

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
K469	Uspesifisert abdominalt brokk uten obstruksjon eller gangren	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
K500	Crohns sykdom i tynntarm	M	1	-	-	-	-	-
K509	Uspesifisert Crohns sykdom	M	2	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-
K519	Uspesifisert ulcerøs kolitt	M	5	-	-	-	-	-
		K	7	-	-	-	-	-
K529	Uspesifisert ikke-infeksiøs gastroenteritt og kolitt	M	2	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
K550	Akutt vaskulær forstyrrelse i tarm	M	33	-	-	-	-	-
		K	53	-	-	-	-	-
K551	Kronisk vaskulær forstyrrelse i tarm	K	2	-	-	-	-	-
K552	Angiodysplasi i tykktarm	K	2	-	-	-	-	-
K558	Annen spesifisert vaskulær forstyrrelse i tarm	K	2	-	-	-	-	-
K559	Uspesifisert vaskulær forstyrrelse i tarm	M	10	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-
K560	Paralytisk ileus	M	2	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-
K562	Volvulus	M	12	-	-	-	-	-
		K	11	-	-	-	-	-
K564	Fastkiling av fordøyelsesprodukter i tarm	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
K565	Tarmadheranser med obstruksjon	M	10	-	-	-	-	-
		K	7	-	-	-	-	-
K566	Annen og uspesifisert tarmobstruksjon	M	4	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-
K567	Uspesifisert ileus	M	22	-	-	-	-	-
		K	32	-	-	-	-	-
K570	Divertikkelsykdom i tynntarm med perforasjon og abscess	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
K571	Divertikkelsykdom i tynntarm uten perforasjon eller abscess	K	1	-	-	-	-	-
K572	Divertikkelsykdom i tykktarm med perforasjon og abscess	M	9	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-
K573	Divertikkelsykdom i tykktarm uten perforasjon eller abscess	M	5	-	-	-	-	-
		K	9	-	-	-	-	-
K574	Divertikkelsykdom i både tynn- og tykktarm med perforasjon og abscess	M	1	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	K469
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	K500
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	K509
1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	K519
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	K529
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	3	3	7	10	2	5	1	-	K550
-	-	-	-	-	-	1	2	11	7	18	8	6	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	K551
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	K552
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	K558
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	-	1	-	-	K559
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	K560
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	2	2	1	-	K562
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	3	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	K564
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	2	-	-	-	K565
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	K566
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	
-	-	-	-	1	-	1	-	3	5	5	4	3	10	10	K567
-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	5	10	10	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	K570
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	K571
-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	2	-	1	-	K572
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	1	K573
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	K574

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år
K578	Divertikkelsykdom i tarm, uspesifisert del, med perforasjon og abscess	M	7	-	-	-	-	-
		K	14	-	-	-	-	-
K579	Divertikkelsykdom i tarm, uspesifisert del, uten perforasjon eller abscess	M	3	-	-	-	-	-
		K	13	-	-	-	-	-
K590	Forstoppelse	M	2	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
K593	Megacolon, ikke klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	-	-
K604	Rektal fistel	K	1	-	-	-	-	-
K610	Anal abscess	K	1	-	-	-	-	-
K623	Rektalprolaps	K	2	-	-	-	-	-
K625	Blødning i endetarmsåpning, analkanal og endetarm	M	4	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-
K630	Tarmabscess	K	1	-	-	-	-	-
K631	Perforasjon av tarm (ikke-traumatiske)	M	3	-	-	-	-	-
		K	9	-	-	-	-	-
K632	Tarmfistel	K	1	-	-	-	-	-
K639	Uspesifisert sykdom i tarm	K	2	-	-	-	-	-
K650	Akutt peritonitt	K	1	-	-	-	-	-
K658	Annen spesifisert peritonitt	M	1	-	-	-	-	-
K659	Uspesifisert peritonitt	M	3	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-
K660	Adheranser i bukhinne	K	1	-	-	-	-	-
K700	Alkoholisk fettlever	M	36	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-
K701	Alkoholisk hepatitt	M	13	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
K702	Alkoholisk fibrose og sklerose i lever	M	1	-	-	-	-	-
K703	Alkoholisk cirrhose i lever	M	87	-	-	-	-	-
		K	24	-	-	-	-	-
K704	Alkoholisk leversvikt	M	7	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
K709	Uspesifisert alkoholisk leversykdom	M	6	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
K711	Toksisk leversykdom med levernekrose	M	1	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
K716	Toksisk leversykdom med hepatitt, ikke klassifisert annet sted	K	2	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1	-	K578	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	4	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	K579	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	2	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	K590	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	K593	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	K604	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	K610	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	K623	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	K625	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	K630	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	K631	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	K632	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	K639	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	K650	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	K658	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K659	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	K660	
-	6	4	8	8	4	4	1	1	1	-	-	-	-	K700	
-	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	1	-	1	1	5	-	2	2	-	-	-	-	-	K701	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K702	
-	2	2	7	15	11	10	9	10	12	4	4	1	-	K703	
-	-	1	3	1	4	4	5	2	4	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	2	1	3	-	-	-	-	-	K704	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	K709	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	K711	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	K716	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
K720	Akutt og subakutt leversvikt	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
K729	Uspesifisert leversvikt	M	1	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
K732	Kronisk aktiv hepatitt, ikke klassifisert annet sted	K	4	-	-	-	-	-
K739	Uspesifisert kronisk hepatitt	M	1	-	-	-	-	-
K743	Primær biliær cirrhose	M	3	-	-	-	-	-
		K	11	-	-	-	-	-
K746	Annen og uspesifisert cirrhose i lever	M	17	-	-	-	-	-
		K	21	-	-	-	-	-
K750	Leverabscess	K	1	-	-	-	-	-
K758	Annen spesifisert inflammatorisk leversykdom	K	1	-	-	-	-	-
K759	Uspesifisert inflammatorisk leversykdom	M	1	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
K767	Hepatorenalt syndrom	M	1	-	-	-	-	-
K769	Uspesifisert leversykdom	M	3	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-
K800	Gallesten med akutt galleblærebetennelse	K	1	-	-	-	-	-
K801	Gallesten med annen galleblærebetennelse	M	2	-	-	-	-	-
		K	10	-	-	-	-	-
K802	Gallesten uten galleblærebetennelse	M	10	-	-	-	-	-
		K	13	-	-	-	-	-
K803	Sten i gallegang med kolangitt	M	6	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-
K804	Sten i gallegang med galleblærebetennelse	M	1	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
K805	Sten i gallegang uten kolangitt eller galleblærebetennelse	M	3	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
K808	Annen spesifisert gallenstein	M	2	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
K810	Akutt galleblærebetennelse	M	9	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-
K811	Kronisk galleblærebetennelse	M	1	-	-	-	-	-
K819	Uspesifisert galleblærebetennelse	M	8	-	-	-	-	-
		K	25	-	-	-	-	-
K820	Obstruksjon i galleblære	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
K822	Perforasjon av galleblære	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
K829	Uspesifisert sykdom i galleblære	K	5	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age														ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	K720
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K729
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	K732
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K739
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	K743
-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	-	-	-	1	
-	-	-	3	2	-	1	1	4	3	2	1	-	-	K746
-	-	1	-	2	1	3	1	5	6	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	K750
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	K758
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	K759
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	K767
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	K769
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	K800
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	K801
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	-	3	1	K802
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	4	2	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	K803
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	K804
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	K805
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	K808
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	2	K810
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	K811
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	K819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	9	6	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	K820
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	K822
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	K829

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år	20-24 år år
K830	Kolangitt	M	6	1	-	-	-	-	-
		K	12	-	-	-	-	-	-
K831	Obstruksjon av gallegang	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
K839	Uspesifisert sykdom i galleveier	K	2	-	-	-	-	-	-
K85	Akutt pankreatitt	M	29	-	-	-	-	-	-
		K	22	-	-	-	-	-	-
K860	Alkoholutløst kronisk pankreatitt	M	4	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
K861	Annen kronisk pankreatitt	M	5	-	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-	-
K900	Cøliaki	M	3	-	-	-	-	-	-
K920	Hematemese	M	15	-	-	-	-	-	-
		K	15	-	-	-	-	-	-
K921	Melena	M	7	-	-	-	-	-	-
		K	11	-	-	-	-	-	-
K922	Uspesifisert gastrointestinal blødning	M	30	-	-	-	-	-	-
		K	40	-	-	-	-	-	-
K929	Uspesifisert sykdom i fordøyelsessystemet	K	1	-	-	-	-	-	-
L00-L99	XII. SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD	M	19	-	-	-	-	-	-
		K	20	-	-	-	-	-	-
L021	Kutan abscess, furunkel og karbunkel på hals	K	1	-	-	-	-	-	-
L022	Kutan abscess, furunkel og karbunkel på trunkus	M	1	-	-	-	-	-	-
L039	Uspesifisert cellulitt	M	1	-	-	-	-	-	-
L100	Pemphigus vulgaris	K	1	-	-	-	-	-	-
L120	Bulløs pemfigoid	K	1	-	-	-	-	-	-
L130	Dermatitis herpetiformis	M	1	-	-	-	-	-	-
L405	Psoriasis ved artropati	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
L89	Dekubitalsår	M	11	-	-	-	-	-	-
		K	10	-	-	-	-	-	-
L97	Sår på underekstremitet, ikke klassifisert annet sted	M	4	-	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-	-
M00-M99	XIII. SYKDOM I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV	M	95	-	-	1	-	-	-
		K	205	-	-	-	-	-	-
M009	Uspesifisert pyogen artritt	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	K830	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	1	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	K831	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	K839	
1	1	-	1	1	1	3	2	2	6	5	4	1	1	K85	
-	-	-	-	-	1	-	3	1	4	3	6	3	1		
-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	K860	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	K861	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	K900	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	3	3	K920	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	K921	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	3		
-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	6	8	3	3	K922	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	6	5	11	16			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	K929	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	4	4	5	L00-L99	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	4	4	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	L021	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	L022	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	L039	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	L100	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	L120	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	L130	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	L405	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	L89	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	L97	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3		
-	1	-	1	4	2	5	2	10	28	12	12	11	6	M00-M99	
-	-	3	2	3	6	8	14	27	26	44	48	24			
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	M009	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-		

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år	20-24 år år
M023	Reiters sykdom	M	1	-	-	-	-	-	-
M052	Reumatoid vaskulitt	K	1	-	-	-	-	-	-
M059	Uspesifisert seropositiv reumatoid artritt	K	3	-	-	-	-	-	-
M069	Uspesifisert reumatoid artritt	M	27	-	-	-	-	-	-
		K	84	-	-	-	-	-	-
M109	Uspesifisert urinsyregikt	M	1	-	-	-	-	-	-
M130	Uspesifisert polyartritt	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-	-
M159	Uspesifisert polyartrose	K	2	-	-	-	-	-	-
M167	Annen sekundær hofteleddsartrose, uten opplysning om bilateral manifestasjon	K	2	-	-	-	-	-	-
M169	Uspesifisert hofteleddsartrose	M	8	-	-	-	-	-	-
		K	19	-	-	-	-	-	-
M179	Uspesifisert kneleddsartrose	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
M244	Residiverende dislokasjon og subluxasjon av ledd	K	1	-	-	-	-	-	-
M300	Polyarteritis nodosa	M	1	-	-	-	-	-	-
M303	Mukokutant lymfeknutesyndrom	M	1	-	-	-	-	-	-
M308	Andre tilstander beslektet med polyarteritis nodosa	K	1	-	-	-	1	-	-
M310	Hypersensitivitetsangiitt	M	1	-	-	-	-	-	-
M311	Trombotisk trombocytopen purpura	K	1	-	-	-	-	-	-
M313	Wegeners granulomatose	M	8	-	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-	-
M316	Annen kjempecellearteritt	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	-
M319	Uspesifisert nekrotiserende vaskulitt	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
M321	Systematisk lupus erythematosus med affeksjon av nærmere bestemt organ eller system	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
M328	Andre spesifiserte former for systemisk lupus erythematosus	M	1	-	-	-	-	-	-
M329	Uspesifisert systemisk lupus erythematosus	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	12	-	-	-	-	-	-
M348	Andre spesifiserte former for systemisk sklerose	M	1	-	-	-	-	-	-
M349	Uspesifisert systemisk sklerose	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	-
M353	Polymyalgia rheumatica	M	5	-	-	-	-	-	-
		K	12	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age														ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	M052
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	M059
-	-	-	1	-	-	-	3	7	5	7	3	1	10	M069
-	-	-	-	1	-	3	7	13	14	18	18	-	-	M109
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	M130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	M159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	M167
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	3	1	1	M169
-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	5	5	5	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	M179
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	M244
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	M308
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	M310
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M311
-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	-	-	-	-	M313
-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	M316
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	M319
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	M321
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	M328
-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	M329
-	-	1	2	1	3	-	4	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	M348
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	M349
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	M353
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	4	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
M359	Uspesifisert systemisk affeksjon av bindevev	K	6	-	-	-	-	-	-
M402	Annen og uspesifisert kyfose	K	1	-	-	-	-	-	-
M419	Uspesifisert skoliose	K	1	-	-	-	-	-	-
M45	Ankyloserende spondylitt	M	8	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
M478	Annen spesifisert spondylose	M	1	-	-	-	-	-	-
M480	Spinal stenose	K	1	-	-	-	-	-	-
M489	Uspesifisert lidelse i ryggsøylen	M	1	-	-	-	-	-	-
M500	Lidelse i cervikalskive, med myelopati	M	1	-	-	-	-	-	-
M502	Annen forskyvning av cervikalskive	K	1	-	-	-	-	-	-
M511	Lidelser i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver, med radikulopati	M	1	-	-	-	-	-	-
M545	Lumbago	M	1	-	-	-	-	-	-
M625	Muskelsvinn og -atrofi, ikke klassifisert annet sted	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
M664	Spontan ruptur i andre sener	M	1	-	-	-	-	-	-
M725	Fasciitt, ikke klassifisert annet sted	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
M790	Uspesifisert reumatisme	K	4	-	-	-	-	-	-
M809	Uspesifisert osteoporose med patologisk brudd	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	12	-	-	-	-	-	-
M819	Uspesifisert osteoporose	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-	-
M869	Uspesifisert osteomyelitt	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-	-
M954	Ervervet deformitet i brystkasse og ribben	K	1	-	-	-	-	-	-
N00-N99	XIV. SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNNSORGANER	M	285	-	1	-	-	-	-
		K	286	-	-	-	-	-	-
N00-N16	Glomulære sykdommer og tubulointerstitielle nyresykdommer	M	71	-	1	-	-	-	-
		K	78	-	-	-	-	-	-
N009	Akutt nefrittisk syndrom, uspesifisert	M	1	-	-	-	-	-	-
N019	Raskt progredierende nefrittisk syndrom, uspesifisert	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
N039	Kronisk nefrittisk syndrom, uspesifisert	M	22	-	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	M359
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	M402
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	M419
-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	1	-	-	-	-	M45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	M478
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	M480
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	M489
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	M500
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	M502
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M511
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	M545
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	M625
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	M664
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	M725
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	M790
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	M809
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	4	1	M819
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	1	M869
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	M954
-	-	2 2	1 2	1 2	1 -	3 1	4 2	10 5	35 15	50 34	63 65	69 88	45 70	N00-N99	
-	-	2 1	1 2	1 1	1 -	2 -	1 2	4 -	13 4	14 12	16 17	12 17	3 24	15	N00-N16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N009
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N019
-	-	1 -	-	1 -	1 -	1 -	1 -	2 -	8 1	3 1	4 2	1 1	-	-	N039

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
N043	Nefrotisk syndrom med diffus mesangiell proliferativ glomerulonefritt		M	1	-	1	-	-	-
N049	Nefrotisk syndrom, uspesifisert		M	1	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
N052	Uspesifisert nefrittisk syndrom med diffus membranøs glomerulonefritt		M	1	-	-	-	-	-
N053	Uspesifisert nefrittisk syndrom med diffus mesangiell proliferativ glomerulonefritt		M	1	-	-	-	-	-
N058	Uspesifisert nefrittisk syndrom, annet		K	1	-	-	-	-	-
N059	Uspesifisert nefrittisk syndrom, uspesifisert		M	4	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-	-
N10	Akutt tubulointerstitiell nefritt		M	5	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-	-
N119	Uspesifisert kronisk tubulointerstitiell nefritt		M	9	-	-	-	-	-
		K	16	-	-	-	-	-	-
N12	Tubulointerstitiell nefritt, ikke spesifisert som akutt eller kronisk		M	14	-	-	-	-	-
		K	29	-	-	-	-	-	-
N131	Hydronefrose med striktur i urinleder, ikke klassifisert annet sted		M	1	-	-	-	-	-
N132	Hydronefrose med stenobstruksjon i nyre og urinleder		K	1	-	-	-	-	-
N133	Annен og uspesifisert hydronefrose		M	7	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-	-
N136	Pyonefrose		M	2	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-	-
N139	Uspesifisert obstruktiv urinveissykdom og urinveissykdom med refluks		M	1	-	-	-	-	-
N141	Nefropati utløst av andre legemidler og biologiske stoffer		K	1	-	-	-	-	-
N17-N19	Nyresvikt		M	97	-	-	-	-	-
		K	82	-	-	-	-	-	-
N170	Akutt nyresvikt med tubulær nekrose		K	1	-	-	-	-	-
N179	Uspesifisert akutt nyresvikt		M	4	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-	-
N188	Annен spesifisert kronisk nyresvikt		M	1	-	-	-	-	-
N189	Uspesifisert kronisk nyresvikt		M	16	-	-	-	-	-
		K	7	-	-	-	-	-	-
N19	Uspesifisert nyresvikt		M	76	-	-	-	-	-
		K	66	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age														ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N043
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N052
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N053
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	N058
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	N059
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	N10
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	N119
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	1	N12
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	4	9	11	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	N132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	N133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	N136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	N141
-	-	-	-	-	-	3	5	10	15	23	22	19	19	N17-N19
-	-	-	-	-	-	3	2	11	21	26	26	19	19	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	N170
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	N179
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	N188
-	-	-	-	-	-	2	3	4	-	3	3	1	-	N189
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	14	18	18	18	N19
-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	15	22	22	16	-

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
N20-N99	Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganer			M	117	-	-	-	-
				K	126	-	-	-	-
N200	Nyresten			M	4	-	-	-	-
				K	1	-	-	-	-
N202	Nyresten med sten i urinleder			K	1	-	-	-	-
N209	Uspesifisert sten i urinveier			M	3	-	-	-	-
				K	6	-	-	-	-
N210	Blæresten			M	1	-	-	-	-
N26	Uspesifisert skrumpnyre			K	2	-	-	-	-
N280	Nyreiskemi og nyreinfarkt			M	1	-	-	-	-
N281	Ervervet nyrecyste			M	3	-	-	-	-
				K	3	-	-	-	-
N288	Andre spesifiserte forstyrrelser i nyre og urinleder			M	2	-	-	-	-
				K	2	-	-	-	-
N289	Uspesifisert forstyrrelse i nyre og urinleder			M	1	-	-	-	-
				K	1	-	-	-	-
N302	Annen kronisk cystitt			M	1	-	-	-	-
				K	2	-	-	-	-
N309	Uspesifisert cystitt			K	5	-	-	-	-
N321	Vesikointestinal fistel			M	2	-	-	-	-
				K	1	-	-	-	-
N390	Urinveisinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon			M	54	-	-	-	-
				K	94	-	-	-	-
N40	Prostatahyperplasi			M	44	-	-	-	-
N413	Prostatocystitt			M	1	-	-	-	-
N701	Kronisk salpingitt og ooforitt			K	1	-	-	-	-
N709	Uspesifisert salpingitt og ooforitt			K	1	-	-	-	-
N719	Uspesifisert infeksjonssykdom i livmor			K	1	-	-	-	-
N801	Endometriose i eggstokk			K	1	-	-	-	-
N823	Fistel mellom skjede og tykktarm			K	1	-	-	-	-
N939	Uspesifisert unormal blødning fra livmor og skjede			K	2	-	-	-	-
N950	Postmenopausal blødning			K	1	-	-	-	-
O00-O99	XV. SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID			K	1	-	-	-	-
O85	Sepsis i barseltid			K	1	-	-	-	-
P00-P96	XVI. VISSE TILSTANDER SOM OPPSTÅR I PERINATALPERIODEN			M	71	70	1	-	-
				K	40	39	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age														ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	12	21	24	35	23	N20-N99
-	-	1	-	1	-	1	-	2	9	11	27	38	36	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	N200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	N202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	N209
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	N210
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	N26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N280
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	N281
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	N288
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	N289
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	N302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	N309
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	N321
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	3	10	12	16	12	26	N390
-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	9	20	32	26	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	8	15	8	N40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	N413
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N701
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	N709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N719
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N801
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	N823
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N939
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	N950
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
P00-P04	Foster og nyfødt påvirket av faktorer hos mor og av komplikasjoner under svangerskap, fødsel forløsning			M K	44 28	44 28	- -	- -	- -
P000	Foster og nyfødt påvirket av høyt blodtrykk hos mor			M K	6 4	6 4	- -	- -	- -
P002	Foster og nyfødt påvirket av infeksjonssykdommer og parasittsykdommer hos mor			M K	2 1	2 1	- -	- -	- -
P008	Foster og nyfødt påvirket av andre spesifiserte tilstander hos mor			M	1	1	- -	- -	- -
P010	Foster og nyfødt påvirket av livmorhalsinsuffisiens			M K	6 1	6 1	- -	- -	- -
P011	Foster og nyfødt påvirket av for tidlig vannavgang			M K	3 2	3 2	- -	- -	- -
P013	Foster og nyfødt påvirket av polyhydramnion			M	2	2	- -	- -	- -
P021	Foster og nyfødt påvirket av andre former for morkakeløsning og -blødning			M K	6 5	6 5	- -	- -	- -
P022	Foster og nyfødt påvirket av andre og uspesifiserte morfologiske og funksjonell avvik ved morkake			M K	7 4	7 4	- -	- -	- -
P023	Foster og nyfødt påvirket av placentalt transfusjonssyndrom			M K	2 3	2 3	- -	- -	- -
P024	Foster og nyfødt påvirket av navlesnorfremfall			M K	2 1	2 1	- -	- -	- -
P025	Foster og nyfødt påvirket av annen avklemming av navlesnor			M	1	1	- -	- -	- -
P027	Foster og nyfødt påvirket av korioamnionitt			M K	4 5	4 5	- -	- -	- -
P031	Foster og nyfødt påvirket av andre feil i leie og innstilling og andre mekaniske misforhold			K	1	1	- -	- -	- -
P038	Foster og nyfødt påvirket av andre spesifiserte komplikasjoner under fødsel og forløsning			M K	2 1	2 1	- -	- -	- -
P05-P08	Tilstander knyttet til svangerskaps- lengde og fostervekt			K	2	2	- -	- -	- -
P070	Ekstremt lav fødselsvekt			K	1	1	- -	- -	- -
P072	Ekstrem immaturitet			K	1	1	- -	- -	- -

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age													ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P008
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P013
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P022
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P031
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P038
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P05-P08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P072

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
P10-P15	Fødselsskader		M	1	1	-	-	-	-
P111	Annen spesifisert hjerneskade som skyldes fødselsskade		M	1	1	-	-	-	-
P20-P29	Respiratoriske og kardiovaskulære forstyrrelser spesifikke i perinatalperioden		M	19	19	-	-	-	-
			K	7	7	-	-	-	-
P200	Intrauterin hypoksi først diagnostisert før fødsel begynner		K	1	1	-	-	-	-
P201	Intrauterin hypoksi først diagnostisert under fødsel og forløsning		M	1	1	-	-	-	-
P209	Uspesifisert intrauterin hypoksi		M	1	1	-	-	-	-
P211	Lett og moderat fødselsasfyksi		M	1	1	-	-	-	-
P219	Uspesifisert fødselsasfyksi		M	1	1	-	-	-	-
P220	Respiratorisk distressyndrom hos nyfødt		M	7	7	-	-	-	-
			K	3	3	-	-	-	-
P240	Aspirasjon av mekonium hos nyfødt		M	1	1	-	-	-	-
P241	Aspirasjon av fostervann og slim hos nyfødt		M	1	1	-	-	-	-
			K	1	1	-	-	-	-
P250	Interstitielt emfysem som oppstår i perinatalperioden		K	1	1	-	-	-	-
P271	Bronkopulmonal dysplasi som oppstår i perinatalperioden		M	3	3	-	-	-	-
P280	Primær atelektase hos nyfødt		M	2	2	-	-	-	-
			K	1	1	-	-	-	-
P290	Hjertesvikt hos nyfødt		M	1	1	-	-	-	-
P35-P39	Infeksjoner spesifikke for perinatalperioden		M	1	1	-	-	-	-
P364	Sepsis hos nyfødt forårsaket av <i>Escherichia coli</i>		M	1	1	-	-	-	-
P70-P74	Forbigående endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt		K	1	1	-	-	-	-
P709	Uspesifisert forbigående forstyrrelse i karbohydratmetabolismen hos foster og nyfødt		K	1	1	-	-	-	-
P75-P78	Forstyrrelser i fordøyelsessystemet hos foster og nyfødt		M	4	4	-	-	-	-
			K	2	1	-	-	-	-
P768	Annen spesifisert tarmobstruksjon hos nyfødt		M	1	1	-	-	-	-
P77	Nekrotiserende enterokolitt hos foster og nyfødt		M	2	2	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age														ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P10-P15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P20-P29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P209
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P211
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P219
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P240
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P250
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P271
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P280
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P35-P39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P364
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P70-P74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P75-P78
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P768
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P77

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
P780	Tarmperforasjon i perinatalperioden	M	1	1	-	-	-	-	-
		K	1	1	-	-	-	-	-
P788	Annen spesifisert forstyrrelse i fordøyelsessystemet i perinatalperioden	K	1	-	-	-	-	-	-
P80-P83	Tilstander som angår hud og temperatur-regulering hos foster og nyfødt	M	1	1	-	-	-	-	-
P832	Føtal hydrops som ikke skyldes hemolytisk sykdom	M	1	1	-	-	-	-	-
P90-P96	Andre forstyrrelser som oppstår i perinatalperioden	M	1	-	1	-	-	-	-
P919	Uspesifisert forstyrrelse som angår hjerne hos nyfødt	M	1	-	1	-	-	-	-
Q00-Q99	XVII. MEDFØDTE MISDANNELSER, DEFORMITETER OG KROMOSOMAVVIK	M	90	38	7	2	4	2	4
		K	73	34	3	1	1	1	2
Q00-Q07	Medfødte misdannelser i nervesystemet	M	11	6	2	-	1	-	-
		K	3	2	1	-	-	-	-
Q000	Anencephalus	K	2	2	-	-	-	-	-
Q02	Foster med lite hode	M	1	1	-	-	-	-	-
Q038	Annen spesifisert medfødt hydrocephalus	M	1	1	-	-	-	-	-
Q039	Uspesifisert medfødt hydrocephalus	M	1	1	-	-	-	-	-
Q043	Andre reduksjonsdeformiteter i hjernen	M	4	2	-	-	-	-	-
Q046	Medfødte hjernekyster	M	1	-	-	-	1	-	-
Q049	Uspesifisert medfødt misdannelse i hjernen	M	2	1	1	-	-	-	-
Q054	Uspesifisert spina bifida med hydrocephalus	M	1	-	1	-	-	-	-
Q059	Uspesifisert spina bifida	K	1	-	1	-	-	-	-
Q20-Q28	Medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet	M	31	10	2	1	2	1	4
		K	30	15	2	-	-	1	1
Q200	Truncus arteriosus communis	K	1	-	-	-	-	-	1
Q203	Transposisjon av de store arterier	M	1	-	-	-	1	-	-
Q210	Ventrikkelseptumdefekt [VSD]	M	5	1	-	-	-	-	-
		K	2	-	1	-	-	-	-
Q211	Atrioseptumdefekt [ASD]	M	1	1	-	-	-	-	-
		K	3	1	-	-	-	-	-
Q212	Atrioventrikulær septumdefekt	M	2	1	-	-	-	-	1

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age														ICD-10	
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P780	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P788	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P80-P83	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P832	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P90-P96	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P919	
-	2 1	2 3	5 1	8 3	2 2	3 6	4 2	4 6	1 1	1 3	1 2	1 1	-	-	Q00-Q99
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q038
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Q039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q043
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q049
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q059
-	2 2	1 1	3 1	3 -	- 1	1 1	1 1	-	- 1	- 2	- 1	-	-	-	Q20-Q28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q203
-	-	1 1	2 -	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Q210
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	Q211
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q212

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
Q213	Fallots tetrade			M K	2 4	- 2	- -	- -
Q218	Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjertets skillevegger			K	1	-	-	-
Q220	Atresi i pulmonalklaff			K	1	1	-	-
Q230	Medfødt valvulær aortastenose			M	1	-	-	-
Q231	Medfødt aortainsuffisiens			M	1	-	-	1
Q234	Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom			M K	2 1	2 1	- -	- -
Q245	Misdannelse av koronarkar			M	1	-	-	1
Q248	Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjerte			K	1	1	-	-
Q249	Uspesifisert medfødt misdannelse i hjerte			M K	7 8	4 6	1 1	- -
Q250	Åpen ductus arteriosus			K	1	-	-	-
Q251	Coarctatio aortae			M K	3 2	- 2	- -	1 -
Q253	Aorta-stenose			K	1	-	-	-
Q255	Atresi av arteria pulmonalis			M K	2 1	1 1	- -	- -
Q256	Stenose av arteria pulmonalis			M K	1 1	- -	- -	- -
Q282	Arteriovenøs misdannelse i cerebrale kar			M K	2 2	- -	1 -	1 1
Q30-Q34	Medfølte misdannelser i åndedrettssystemet		K	1	-	-	-	-
Q348	Andre spesifiserte medfødte misdannelser i åndedrettssystemet		K	1	-	-	-	-
Q38-Q45	Andre medfølte misdannelser i fordøyelsessystemet		M K	4 2	2 1	- -	1 1	- -
Q390	Atresi av spiserør uten fistel		M K	1 1	1 1	- -	- -	- -
Q401	Medfødt hiatushernie		M	1	1	-	-	-
Q423	Medfødt mangel på, atresi og stenose av endetarmsåpning (anus) uten fistel		M	1	1	-	-	-
Q430	Meckels divertikkel		M	1	1	-	-	-
Q431	Hirschprungs sykdom		M	1	-	-	-	-
Q433	Medfølte misdannelser i tarmfeste		M K	1 1	- -	- -	1 1	- -

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age														ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q213
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q218
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q220
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q230
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q245
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q248
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q249
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Q250
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q251
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Q253
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q255
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Q256
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Q282
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q30-Q34
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q348
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Q38-Q45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q390
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q401
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q423
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Q430
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q431
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q433

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år	20-24 år år
Q60-Q64	Medfødte misdannelser i urinsystemet			M	6	2	-	-	-
		K		7	1	-	-	-	-
Q606	Potters syndrom			M	1	1	-	-	-
Q611	Cystenyre, infantil type			M	1	-	-	-	-
Q613	Uspesifisert cystenyre			M	4	1	-	-	-
		K		4	-	-	-	-	-
Q619	Uspesifisert cystenyresykdom			K	2	-	-	-	-
Q649	Uspesifisert medfødt misdannelse i urinsystemet			K	1	1	-	-	-
Q65-Q79	Medfødte misdannelser og deformiteter i muskel-skjelettsystemet			M	6	4	-	-	-
		K		5	4	-	-	1	-
Q764	Andre medfødte misdannelser i ryggsøyle, ikke forbundet med skoliose			M	1	-	-	-	-
Q772	Jeunes syndrom			M	1	1	-	-	-
Q780	Osteogenesis imperfecta			M	1	-	-	-	-
		K		1	-	-	-	1	-
Q789	Uspesifisert osteokondrodysplasi			K	1	1	-	-	-
Q790	Medfødt mellomgulvsbrokk (hernia diaphragmatica)			M	3	3	-	-	-
		K		3	3	-	-	-	-
Q80-Q89	Andre medfødte misdannelser			M	9	3	2	-	1
		K		8	3	-	-	-	1
Q850	Nevrofibromatose (ikke-ondartet)			K	1	-	-	-	-
Q851	Tuberøs sklerose			K	2	-	-	-	1
Q870	Medfødte misdannelsessyndromer som hovedsakelig påvirker ansiktets utseende			K	1	1	-	-	-
Q872	Medfødte misdannelsessyndromer som hovedsakelig omfatter ekstremiteter			K	1	1	-	-	-
Q873	Medfødte misdannelsessyndromer som fører til økt vekst			K	1	1	-	-	-
Q874	Marfans syndrom			M	1	-	-	-	1
		M		2	-	-	-	-	-
		K		2	-	-	-	-	-
Q878	Andre spesifiserte medfødte misdannelsessyndromer			M	1	-	1	-	-
		K		1	1	-	-	-	-
Q894	Sammenvokste tvillinger			M	2	2	-	-	-
Q897	Flere medfødte misdannelser			M	2	-	1	-	1
Q899	Uspesifisert medfødt misdannelse			M	1	1	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age														ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	- Q60-Q64
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Q606
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Q611
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	- Q613
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	- Q619
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Q649
 														Q65-Q79
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- Q764
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Q772
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- Q780
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Q789
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Q790
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 														Q80-Q89
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- Q850
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Q851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Q870
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Q872
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Q873
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- Q874
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Q878
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Q894
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Q897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Q899

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder							
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år			
Q90-Q99											
Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted											
		M	23	11	1	-	-	-			
		K	17	8	-	-	-	-			
Q909	Uspesifisert Downs syndrom	M	13	1	1	-	-	-			
		K	8	-	-	-	-	-			
Q913	Uspesifisert Edwards' syndrom	M	5	5	-	-	-	-			
		K	2	2	-	-	-	-			
Q917	Uspesifisert Pataus syndrom	M	4	4	-	-	-	-			
		K	4	4	-	-	-	-			
Q929	Uspesifisert trisomi og partiell trisomi av autosomer	K	1	1	-	-	-	-			
Q979	Uspesifisert kjønnskromosomavvik, kvinnelig fenotype	K	1	1	-	-	-	-			
Q989	Uspesifisert kjønnskromosomavvik, mannlig fenotype	K	1	1	-	-	-	-			
Q999	Uspesifisert kromosomavvik	M	1	1	-	-	-	-			
		K	1	-	-	-	-	-			
R00-R99											
XVIII. SYMPTOMER, TEGN, UNORMALE KLINISKE FUNN OG LABORATORIEFUNN, IKKE KLASSIFISERT ANNET STED											
		M	694	19	4	-	1	2			
		K	850	17	-	-	-	3			
								2			
R00-R49	Andre symptomer, tegn, unormale kliniske funn og labotatorium, ikke klassifisert annet sted	M	18	-	-	-	-	-			
R70-R94		K	8	-	-	-	-	-			
R000	Uspesifisert takykardi	M	1	-	-	-	-	-			
R02	Gangren, ikke klassifisert annet sted	M	3	-	-	-	-	-			
		K	1	-	-	-	-	-			
R040	Epistaxis Blødning fra nese	K	1	-	-	-	-	-			
R068	Andre og uspesifiserte åndedreftsabnormiteter	K	1	-	-	-	-	-			
R074	Uspesifisert brystsmerte	M	8	-	-	-	-	-			
R092	Respirasjonsstans	M	3	-	-	-	-	-			
		K	2	-	-	-	-	-			
R104	Annen og uspesifisert smerte i buk og bekken	K	1	-	-	-	-	-			
R11	Kvalme og oppkast	M	1	-	-	-	-	-			
		K	2	-	-	-	-	-			
R17	Uspesifisert gulsort icterus	M	1	-	-	-	-	-			
R392	Ekstrarenal uremi	M	1	-	-	-	-	-			
R50-R69											
Generelle symptomer og tegn											
		M	676	19	4	-	1	2			
		K	842	17	-	-	-	3			
								2			

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	1	4	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	Q90-Q99
-	1	-	-	-	-	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	4	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	Q909
-	1	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q929
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q979
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q989
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Q999
5 2	6 -	10 2	15 3	23 7	27 12	33 5	47 11	43 26	87 50	83 88	117 120	79 171	90 334	R00-R99	
-	-	1	-	1	1	-	1	1	3	1	2	4	3	R00-R49	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	R70-R94	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	R000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	R02	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	R040	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R068	
-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	1	1	1	-	R074	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	R092	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	R104	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	R11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	R17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	R392	
5 2	6 -	9 2	15 3	22 7	26 12	33 5	46 11	42 26	84 49	82 86	115 119	75 170	87 331	R50-R69	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
R509	Uspesifisert feber	K	1	-	-	-	-	-
R53	Uvelhet og tretthet	M	3	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
R54	Senilitet	M	107	-	-	-	-	-
		K	359	-	-	-	-	-
R570	Kardiogent sjokk	M	2	-	-	-	-	-
R571	Hypovolemisk sjokk	K	1	-	-	-	-	-
R58	Blødning, ikke klassifisert annet sted	K	1	-	-	-	-	-
R630	Anoreksi	M	1	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-
R64	Kakeksi	M	2	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	-
R688	Andre spesifiserte generelle symptomer og tegn	K	1	-	-	-	-	-
R95-R99	Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker	M	561	19	4	-	1	2
		K	466	17	-	-	-	3
R95	Krybbedøds syndrom (SIDS)	M	22	19	3	-	-	-
		K	16	16	-	-	-	-
R960	Plutselig død	M	311	-	-	-	-	-
		K	282	-	-	-	-	-
R961	Død av ukjent årsak mindre enn 24 timer etter symptomenes begynnelse, ikke forklart på annen måte	M	1	-	-	-	-	-
R98	Funnet død (uten påviselig dødsårsak)	M	40	-	-	-	-	-
		K	39	-	-	-	-	-
R990	Dødsårsak ikke fastslått av lege eller annen sakkyndig person	M	55	-	-	-	-	1
		K	40	-	-	-	-	1
R998	Dødsårsak ikke oppgitt	M	17	-	-	-	-	-
		K	10	1	-	-	-	-
R999	Mangler opplysning (dødsfall registrert i folke-register, ikke meldt til Dødsårsaksregisteret)	M	115	-	1	-	1	2
		K	79	-	-	-	-	1
V01-Y89	XX. Ytre årsaker i alt	M	1 341	-	9	10	14	82
		K	918	4	6	3	9	16
V01-X59	Ulykker	M	894	-	9	9	7	34
		K	730	3	5	3	4	7
V01-V99	V99 Transportulykker i alt	M	260	-	4	6	3	29
		K	102	-	2	3	2	5

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	R509
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	R53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	17	26	60		R54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	42	83	228		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	R570
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	R571
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	R58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	R630
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	R64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	R688
															R95-R99
5 2	6 -	9 2	15 3	22 7	26 12	33 5	45 11	42 26	83 47	78 80	96 74	45 83	27 95		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 1	1 -	- -	5 3	7 3	13 3	23 3	24 5	23 13	55 31	45 58	62 45	32 55	20 65		R960
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R961
-	-	-	-	-	4	1	3	2	3	12	12	3	-	-	R98
-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	5	12	10	5	-	
-	-	2 1	5 -	6 3	3 2	3 -	6 3	4 3	7 5	3 7	9 7	3 4	2 4		R990
2 -	1 -	2 1	- -	1 -	- -	1 -	3 -	1 -	3 2	2 1	2 1	- -	1 3		R998
2 1	4 -	5 1	5 2	7 1	6 7	5 1	9 3	12 7	15 5	16 9	13 9	6 14	5 18		R999
98 25	73 23	70 18	78 22	85 31	70 34	62 20	56 24	68 32	104 46	115 85	121 125	112 178	68 192		V01-Y89
48 14	35 8	35 6	43 9	50 13	38 15	41 10	39 18	36 19	77 39	90 74	111 116	100 169	64 184		V01-X59
32 12	16 2	15 3	17 4	13 6	16 7	10 4	15 3	13 8	28 14	14 6	6 5	4 2	2 2		V01-V99

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
V01-V09	Fotgjenger i transportulykke							
		M	36	-	3	5	1	2
		K	25	-	2	1	1	1
V01	Fotgjenger; sammenstøt med sykkel	K	1	-	-	-	-	-
V03	Fotgjenger; kollisjon med bil, lett lastebil eller	M	19	-	-	3	-	2
		K	19	-	2	1	1	-
V04	Fotgjenger; kollisjon med tungt kjøretøy eller buss	M	12	-	2	2	1	-
		K	4	-	-	-	-	1
V05	Fotgjenger; kollisjon med tog eller jernbanekjøretøy	M	4	-	1	-	-	1
		K	1	-	-	-	-	1
V09	Fotgjenger; andre og uspesifiserte transportulykke	M	1	-	-	-	-	-
V10-V19	Syklist i transportulykke							
		M	9	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
V13	Syklist; kollisjon med bil, lett lastebil eller varebil	M	3	-	-	-	-	-
V14	Syklist; kollisjon med tungt kjøretøy eller buss	M	2	-	-	-	-	-
V18	Syklist; transportulykke uten sammenstøt	M	3	-	-	-	-	-
V19	Syklist; andre og uspesifiserte transportulykker	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
V20-V29	Motorsyklist i transportulykke							
		M	22	-	-	-	1	1
V23	Motorsyklist; kollisjon med bil, lett lastebil eller varebil	M	7	-	-	-	1	1
V24	Motorsyklist; kollisjon med tungt kjøretøy eller buss	M	2	-	-	-	-	-
V27	Motorsyklist; kollisjon med fast eller stillestående gjenstand	M	3	-	-	-	-	1
V28	Motorsyklist; transportulykke uten sammenstøt	M	7	-	-	-	-	1
V29	Motorsyklist; andre og uspesifiserte transportulykker	M	3	-	-	-	-	2
		K	1	-	-	-	-	-
V40-V49	Fører/passasjer i personbil i transportulykke							
		M	105	-	-	1	1	13
		K	68	-	-	2	1	11
V43	Person i bil; kollisjon med bil, lett lastebil eller	M	35	-	-	1	-	6
		K	34	-	-	1	-	3
V44	Person i bil; kollisjon med tungt kjøretøy eller buss	M	27	-	-	-	-	1
		K	13	-	-	-	-	2
V47	Person i bil; kollisjon med fast eller stillestående gjenstand	M	8	-	-	-	-	3
		K	7	-	-	-	-	-
V48	Person i bil; transportulykke uten sammenstøt	M	31	-	-	-	1	3
		K	14	-	-	1	1	4
V49	Person i bil; annen og uspesifisert transportulykke	M	4	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
2	2	-	-	2	1	-	2	4	5	2	3	-	1	1	V01-V09
-	-	1	-	1	3	-	-	2	6	3	1	1	1	1	V01
-	1	-	-	1	1	-	-	2	3	2	3	-	1	1	V03
-	-	1	-	1	2	-	-	-	6	3	1	1	-	-	V03
1	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	V04
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	V04
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	V05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V05
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	V09
-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	2	-	1	-	V10-V19
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	V13
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	V14
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	V18
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	V19
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	V20-V29
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	V23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	V24
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V27
3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	V28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	V29
13	4	9	4	3	4	3	6	4	15	5	1	1	1	1	V40-V49
8	2	2	4	4	4	2	3	5	7	3	4	1	1	1	V40-V49
3	1	4	1	1	-	1	2	1	7	3	-	-	1	1	V43
6	2	1	2	2	3	1	2	2	5	-	1	1	-	-	V43
5	1	2	2	2	2	-	2	2	4	-	-	1	-	-	V44
1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	V44
1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	V47
1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	V47
4	1	3	1	-	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	V48
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	V48
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	V49

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år	20-24 år år
V50-V59	Fører/passasjer i lett lastebil eller varebil i transportulykke			M	2	-	-	-	-
V54	Person i lett lastebil eller varebil; kollisjon med tungt kjøretøy eller buss			M	2	-	-	-	-
V60-V69	Fører/passasjer i tungt kjøretøy i transportulykke			M	11	-	-	-	2
V64	Person i tungt kjøretøy; kollisjon med tungt kjøretøy eller buss			M	1	-	-	-	1
V67	Person i tungt kjøretøy; kollisjon med fast eller stilstående gjenstand			M	1	-	-	-	-
V68	Person i tungt kjøretøy; transportulykke uten sammenstøt			M	9	-	-	-	1
V70-V79	Fører/passasjer i buss i transportulykke			M	1	-	-	-	-
V78	Person i buss; på- eller avstigning fra buss uten sammenstøt			M	1	-	-	-	-
V80-V89	Andre transportulykker på land			M	25	-	1	-	-
V83	Person i spesielt industrikjøretøy; transportulykke	K	5	-	-	-	-	-	-
V84	Person i spesielt landbrukskjøretøy; transportulykke	M	2	-	-	-	-	-	-
V86	Person i terregn- eller annet off-road motorkjøretøy; transportulykke	M	12	-	1	-	-	-	-
V89	Uspesifisert kjøretøy; transportulykke	M	8	-	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-	-
V90-V94	Transportulykker på sjøen			M	41	-	-	-	1
V90	Drukning forårsaket av ulykke med sjøfartøy	K	2	-	-	-	-	-	-
V91	Andre ulykker enn drukning forårsaket av ulykke med sjøfartøy	M	3	-	-	-	-	-	1
V91		K	1	-	-	-	-	-	-
V92	Drukning fra sjøfartøy (uten ulykke med fartøy)	M	1	-	-	-	-	-	-
V92		M	29	-	-	-	-	-	-
V92		K	1	-	-	-	-	-	-
V93	Ulykke ombord på sjøfartøy (ikke drukning)	M	3	-	-	-	-	-	-
V94	Annen og uspesifisert sjøtransportulykke	M	5	-	-	-	-	-	-
V95-V97	Transportulykke i luften og i rommet			M	7	-	-	-	2
V95	Luftfartøysulykke; fører/passasjer	K	1	-	-	-	-	-	-
V97	Annen luftfartøyulykke	M	7	-	-	-	-	-	2
V97		K	1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	V50-V59
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	V54
3	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V60-V69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V64
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V67
3	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V68
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	V70-V79
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	V78
4	2	-	4	3	2	2	-	-	5	2	-	-	-	-	V80-V89
2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V83
-	1	-	-	2	1	2	-	-	5	-	-	-	-	-	V84
4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V86
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	V89
2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
5	3	1	7	2	7	5	3	3	-	2	1	1	-	-	V90-V94
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V90
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V91
2	2	1	4	1	6	4	3	2	-	2	1	1	-	-	V92
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V93
2	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	V94
1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V95-V97
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V95
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V97

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år
V98-V99	Andre uspesifiserte transportulykker	M	1	-	-	-	-	1
V99	Uspesifisert transportulykke	M	1	-	-	-	-	1
W00-X59	Andre ulykker i alt	M	634	-	5	3	4	11
		K	628	3	3	-	2	2
W00-W19	Fallulykker	M	376	-	-	-	-	2
		K	487	-	1	-	-	1
W00	Fall på samme nivå i sammenheng med snø og is	M	3	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
W01	Fall på samme nivå som følge av glidning og snubling	M	3	-	-	-	-	-
		K	7	-	-	-	-	-
W02	Fall ved bruk av ski, skøyter, rulleskøyter eller rullebrett	M	3	-	-	-	-	-
W05	Fall ved bruk av rullestol	M	1	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	-	-
W06	Fall i forbindelse med bruk av seng	M	6	-	-	-	-	-
		K	8	-	-	-	-	-
W07	Fall i forbindelse med bruk av stol	M	1	-	-	-	-	-
		K	5	-	1	-	-	-
W08	Fall ved bruk av annet møbel	K	1	-	-	-	-	-
W10	Fall på og fra trapp	M	34	-	-	-	-	-
		K	11	-	-	-	-	-
W11	Fall i og fra stige	M	5	-	-	-	-	-
W12	Fall på og fra stillas	M	1	-	-	-	-	-
W13	Fall fra, ut av eller gjennom bygning eller byggverk	M	13	-	-	-	-	1
		K	2	-	-	-	-	1
W14	Fall fra tre	M	1	-	-	-	-	-
W15	Fall fra fjellskrent (klippe)	M	4	-	-	-	-	1
		K	2	-	-	-	-	-
W17	Annet fall fra et nivå til et annet	M	2	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
W18	Annet fall på samme nivå	M	18	-	-	-	-	-
		K	23	-	-	-	-	-
W19	Uspesifisert fall	M	281	-	-	-	-	-
		K	422	-	-	-	-	-
W20-W49	Ulykke med ikke-levende mekaniske krefter	M	27	-	-	1	1	2
		K	1	-	-	-	-	1
W20	Rammet av fremstikkende, fallende eller kastet gjenstand							

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V98-V99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V99
16 2	19 6	20 3	26 5	37 7	22 8	31 6	24 15	23 11	49 25	76 68	105 111	96 167	62 182	W00-X59	
2 -	2 1	6 1	9 -	6 1	4 1	11 1	7 5	9 6	33 16	59 55	91 84	81 150	53 164	W00-W19	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	W00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	W00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	W01	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	W01	
1 -	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W02	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	W05	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	W05	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	W06	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	W06	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	W07	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	W07	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	W08	
-	-	3 1	2 -	2 1	3 -	2 2	3 -	7 -	5 5	5 -	5 1	2 1	2 1	W10	
-	-	1 -	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	W10	
1 -	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	W11	
1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W12	
-	-	3 -	1 -	1 -	1 -	1 -	-	-	-	1	2	1	-	W13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	W14	
-	-	2 -	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W15	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	W15	
-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	W17	
-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W17	
-	-	-	1 -	-	1 -	-	1 -	1 -	2 1	1 3	2 2	6 8	4 8	W18	
-	-	-	2 -	1 -	1 -	6 1	4 2	5 6	21 14	50 43	75 75	68 135	48 146	W19	
2 -	1 -	1 -	1 -	4 -	3 -	3 -	4 -	1 -	1 -	2 -	-	-	-	W20-W49	
1 -	1 -	-	-	1 -	1 -	-	2 -	-	-	2 -	-	-	-	W20	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år	20-24 år år
W22	Støt mot eller slag av annen gjenstand	M	1	-	-	-	-	-	-
W23	Klemt, knust eller presset i eller mellom	M	8	-	-	-	-	1	-
W24	Heise- eller overføringsutstyr	M	1	-	-	-	-	-	-
W27	Manuelt håndverktøy	M	1	-	-	-	-	-	-
W29	Annet motordrevet håndverktøy og husholdningsredskap	M	1	-	-	-	-	-	-
W33	Skudd fra rifle, hagle og større skytevåpen ved uhell	M	1	-	-	-	-	-	-
W34	Skudd fra andre og uspesifiserte skytevåpen ved uhell	M	1	-	-	-	-	-	-
W40	Eksplosjon i annet materiale	M	3	-	-	1	1	-	-
		K	1	-	-	-	-	1	-
W50-W64 Ulykke med levende mekaniske krefter		M	1	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
W54	Bitt eller spark fra hund	K	1	-	-	-	-	-	-
W55	Bitt eller spark fra andre dyr	M	1	-	-	-	-	-	-
W57	Bitt eller stikk av ikke-giftig insekt og annet ikke-giftig leddyr	K	1	-	-	-	-	-	-
W65-W74 Ulykke med drukning og nedkjøling		M	54	-	3	-	-	3	2
		K	10	-	1	-	1	-	-
W65	Drukning i badekar	M	1	-	1	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
W67	Drukning i svømmebasseng	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
W69	Drukning i sjø	M	10	-	-	-	-	1	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
W70	Drukning som følge av fall i sjø	M	17	-	1	-	-	2	2
		K	4	-	1	-	1	-	-
W74	Uspesifisert drukning	M	25	-	1	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	-
W75-W84 Annen kvelningsulykke		M	31	-	-	-	3	2	-
		K	19	1	-	-	-	-	-
W75	Ulykke ved kvelning i sengen	K	1	1	-	-	-	-	-
W76	Annен ulykke grunnet hengning og kvelning	M	4	-	-	-	2	-	-
W77	Luftmangel grunnet sammenrasing, jord- og andre ras	M	1	-	-	-	-	-	-
W78	Innånding av mageinnhold	M	4	-	-	-	-	1	-
		K	1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age														ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	W22
-	-	-	1	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	W23
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	W24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	W27
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	W29
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	W33
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W34
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	W50-W64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	W54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	W55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	W57
2	4	3	4	7	4	7	2	5	2	4	2	-	1	W65-W74
2	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W67
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	W69
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	1	-	3	2	1	1	2	-	-	-	W70
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	-	1	4	5	3	3	-	3	-	2	2	-	-	W74
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2	1	2	2	-	3	2	3	-	3	3	2	3	-	W75-W84
-	3	-	-	-	1	2	2	-	1	3	4	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W75
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	W76
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W77
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	W78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år
W79	Innånding og svegning av mat med tilstopping av luftveier	M	6	-	-	-	-	-
		K	15	-	-	-	-	-
W80	Innånding og svegning av andre gjenstander med tilstopping av luftveier	M	4	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
W81	Innesperret i oksygenfattig sted ved uhell	M	3	-	-	-	1	-
		K	1	-	-	-	-	-
W84	Uspesifisert pusteproblem	M	9	-	-	-	-	1
W85-W99	Ulykke med elektrisk kraft mv.	M	5	-	-	1	-	-
W85	Elektriske kraftledninger	M	3	-	-	1	-	-
W86	Annen spesifisert elektrisk kraft	M	2	-	-	-	-	-
X00-X09	Ulykke med røyk, brann og flammer	M	37	-	1	1	-	2
		K	30	1	1	-	1	-
X00	Ukontrollert brann i bygning eller byggverk	M	29	-	1	1	-	1
		K	22	1	1	-	-	1
X02	Kontrollert brann i bygning eller byggverk	M	1	-	-	-	-	-
X04	Antenning av svært brennbart materiale	M	1	-	-	-	-	1
		K	1	-	-	-	-	-
X05	Antenning eller smelting av nattøy	M	1	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
X06	Antenning eller smelting av annet plagg eller utstyr	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
X08	Annen spesifisert røyk, brann og flammer	M	1	-	-	-	-	-
X09	Uspesifisert røyk, brann og flammer	M	3	-	-	-	-	-
		K	4	-	-	-	1	-
X10-X19	Ulykke med varm væske, gass, overflate	M	2	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
X11	Varmt springvann	M	1	-	-	-	-	-
X12	Andre varme væsker	M	1	-	-	-	-	-
X19	Annen og uspesifisert varme og varme gjenstander	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
X20-X29	Ulykke med giftige dyr og planter, ytre kontakt	M	2	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
X23	Veps og bier	M	2	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	W79
-	2	-	-	-	1	2	2	-	1	3	2	-	2	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	W80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W81
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	2	1	-	-	-	W84
-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W85-W99
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W85
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W86
3	4	1	3	2	2	1	1	1	4	2	2	5	2	-	X00-X09
-	1	2	2	-	1	1	2	-	3	3	8	3	-	-	
3	3	1	3	2	2	1	1	1	2	2	1	4	-	-	X00
-	1	2	2	-	1	-	2	-	2	3	4	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	X02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	X05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	X06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	X08
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	X09
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	X10-X19
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	X12
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	X19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	X20-X29
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	X23
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år
X30-X39	Ulykke som skyldes naturkrefter			M K	15 4	- -	- -	- -
X31	Sterk naturlig kulde			M K	11 3	- -	- -	- -
X36	Snøras, jordras og andre jordbevegelser			M K	4 1	- -	- -	- -
X40-X49	Forgiftning som følge av ulykke			M K	48 24	- -	1 -	1 1
X40	Forgiftning av analgetika (ikke-opiat), antipyrektika og antireumatika			M	3	-	1	-
X41	Forgiftning av antiepileptika, sedativ-hypnotika, anti-Parkinson middel og hypnotika			M K	17 11	- -	- -	- -
X42	Forgiftning av narkotika og psykodysleptica (hallucinogen)			M	6	-	-	-
X44	Forgiftning av andre og uspesifiserte stoffer, medikamenter og biologiske midler			M K	6 6	- -	- -	- -
X45	Forgiftning av alkohol			M K	12 6	- -	- -	1 1
X46	Forgiftning av organiske løsemidler, halogenerte hydrokarboner og damp fra disse			M	3	-	-	-
X48	Forgiftning av pesticider			K	1	-	-	-
X49	Forgiftning av andre og uspesifiserte kjemikalier og giftige stoffer			M	1	-	-	-
X58-X59	Andre uspesifiserte ulykker			M K	36 49	- 1	- -	1 -
X58	Annen spesifisert årsak til ulykke			M	1	-	-	-
X59	Uspesifisert årsak til ulykke			M K	35 49	- 1	- -	1 -
X60-X84	Selvmord			M K	389 127	- -	- -	6 3
X60	Selvmord med analgetika (ikke-opiat), antipyrektika og antireumatika			M K	1 4	- -	- -	- 1
X61	Selvmord med antiepileptika, sedativ-hypnotika, anti-Parkinson middel og hypnotika			M K	15 23	- -	- -	- 3
X62	Selvmord med narkotika og psykodysleptika (hallucinogen)			M K	5 4	- -	- -	- 1

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
2	1	1	-	1	1	2	1	1	1	1	1	3	-	-	X30-X39
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
1	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	3	-	-	X31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	X36
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	4	6	15	5	3	3	1	1	1	1	-	1	-	X40-X49
-	1	-	2	4	4	1	4	2	1	1	2	-	1	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X40
1	1	2	1	7	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	X41
-	-	-	2	1	2	1	2	-	-	-	1	1	-	1	
1	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	X42
-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X44
-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	1	-	1	3	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	X45
-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	X46
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X48
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X49
1	-	1	1	1	-	1	3	5	2	3	5	6	6	15	X58-X59
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	5	10	13	13	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	X58
1	-	1	1	1	-	1	3	5	2	3	5	6	5	15	X59
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	5	10	13	13	15	
46	34	33	30	30	29	20	12	26	24	21	6	9	1	1	X60-X84
10	11	9	9	13	17	9	4	12	4	6	2	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	X60
-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	2	3	1	3	-	-	2	-	-	-	-	-	X61
1	1	1	2	3	6	-	-	1	-	5	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	X62
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år
X63	Selvmord med andre stoffer som påvirker det autonome nervesystemet	M	1	-	-	-	-	-
X64	Selvmord med andre og uspesifiserte stoffer, medikamenter og biologiske midler	M	9	-	-	-	-	-
		K	15	-	-	-	-	1
X65	Selvmord med alkoholer	M	2	-	-	-	-	-
X67	Selvmord med andre gasser og damp	M	28	-	-	-	-	1
		K	7	-	-	-	-	5
								2
X68	Selvmord med pesticider (plantebeskyttelsesmidler)	K	1	-	-	-	-	-
X69	Selvmord med andre og uspesifiserte kjemikalier	M	1	-	-	-	-	-
X70	Selvmord ved hengning og kvelning	M	141	-	-	-	3	9
		K	38	-	-	-	2	3
X71	Selvmord ved drukning	M	19	-	-	-	1	-
		K	17	-	-	-	1	-
X72	Selvmord med skudd fra håndvåpen	M	22	-	-	-	1	-
X73	Selvmord med skudd fra rifle, hagle og større skytevåpen	M	63	-	-	-	-	5
X74	Selvmord med skudd fra annet og uspesifisert skytevåpen	M	38	-	-	-	-	10
		K	2	-	-	-	-	-
X75	Selvmord med eksplosive stoffer	M	5	-	-	-	1	-
X76	Selvmord ved røyk, brann og flammer	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
X78	Selvmord med skarp gjenstand	M	13	-	-	-	-	1
		K	3	-	-	-	-	-
X80	Selvmord ved utsprang fra høyt sted	M	15	-	-	-	-	1
		K	5	-	-	-	-	-
X81	Selvmord ved å kaste eller legge seg foran gjenstand i bevegelse	M	3	-	-	-	-	2
		K	3	-	-	-	-	-
X82	Selvmord med motorkjøretøy	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
X83	Selvmord med andre spesifiserte metoder	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
X84	Selvmord med uspesifisert metode	M	5	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
X85-Y09	Drap	M	25	-	-	1	1	-
		K	22	1	1	-	1	3
X85	Drap med stoffer, medikamenter og biologiske middel	K	1	-	-	-	-	-
X88	Drap med gass og damp	K	1	-	1	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age														ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	X63
1	-	1	1	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	X64
1	1	2	2	1	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	X65
4	3	4	2	2	2	1	-	2	1	1	-	-	-	X67
1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	X69
17	15	9	15	9	10	5	6	11	6	7	3	1	-	X70
4	3	3	-	6	2	1	2	7	2	-	1	-	-	-
3	2	3	1	2	1	1	-	-	2	1	-	2	-	X71
-	1	1	-	2	3	2	1	1	2	1	1	-	1	-
2	3	-	-	3	1	1	-	2	2	1	-	1	1	X72
8	3	9	5	3	4	5	1	5	5	2	2	-	-	X73
2	1	3	3	3	2	2	1	-	4	5	-	2	-	X74
1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	X75
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X76
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	3	-	-	2	1	2	-	-	1	-	1	-	X78
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
4	3	-	-	1	2	-	1	1	-	2	-	-	-	X80
1	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	X81
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X82
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	X83
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	X84
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	1	3	4	1	-	1	3	1	2	1	-	-	X85-Y09
-	4	3	2	1	2	1	-	-	-	2	-	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X88

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder				
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år år	10-14 år år	15-19 år år
X91	Drap med hengning og kvelning	M	1	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
X93	Drap med skudd av håndvåpen	M	3	-	-	-	-	1
		K	2	-	-	-	-	1
X94	Drap med skudd av rifle, hagle eller større skytevåpen	M	2	-	-	-	1	-
		K	1	-	-	-	-	1
X95	Drap med skudd av annet og uspesifisert skytevåpen	M	2	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
X99	Drap med skarp gjenstand	M	11	-	-	1	-	-
		K	10	-	-	-	1	-
Y00	Drap med stump gjenstand	M	3	-	-	-	-	-
Y04	Drap med fysisk makt, ubevæpnet slagsmål	M	3	-	-	-	-	-
		K	1	1	-	-	-	-
Y09	Andre drap, uspesifisert	K	1	-	-	-	-	1
Y10-Y34	Usikker ytre årsak	M	8	-	-	-	-	1
		K	7	-	-	-	-	-
Y11	Usikker ytre årsak til forgiftning med antiepileptika, sedativ-hypnotika, anti-Parkinson midler	K	1	-	-	-	-	-
Y12	Usikker ytre årsak til forgiftning med narkotika og psykodysleptika (hallucinogen)	M	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-
Y14	Usikker ytre årsak til forgiftning med andre og uspesifiserte stoffer, medikamenter og biologiske midler	M	1	-	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-
Y21	Usikker ytre årsak til drukning	M	1	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-
Y29	Usikker ytre årsak til forgiftning med pesticider	M	1	-	-	-	-	1
Y30	Usikker ytre årsak til fall fra høyt sted	M	1	-	-	-	-	-
Y32	Usikker ytre årsak til skade med motorkjøretøy	M	1	-	-	-	-	-
Y34	Usikker ytre årsak til skade. Uspesifisert hendelse	M	2	-	-	-	-	1
Y40-Y84	Komplikasjoner ved medisinsk og kirurgisk behandling	K	1	-	-	-	-	-
Y654	Uhell under medisinsk eller kirurgisk behandling; utelatt innføring eller fjerning av tube eller instrument	K	1	-	-	-	-	-
Y85-Y89	Senfølger etter ytre årsaker	M	25	-	-	-	-	1
		K	31	-	-	-	1	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age															ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X91
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	X93
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X95
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	2	2	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	X99
-	3	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y00
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	Y04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y09
-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	Y10-Y34
-	-	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y11
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y12
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y14
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y21
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Y30
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y32
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Y40-Y84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Y654
-	1	-	1	1	1	1	4	3	2	2	3	3	2	3	Y85-Y89
1	-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	5	8	6	3	-

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	Kjønn Sex	Alle All	Alder					
				Under 1 år year	1-4 år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
Y850	Følgetilstand etter ulykke med motorkjøretøy	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	1	-
Y859	Følgetilstand etter andre og uspesifiserte transportulykker	M	4	-	-	-	-	-	1
		K	2	-	-	-	-	-	-
Y86	Følgetilstand etter andre ulykker	M	15	-	-	-	-	-	-
		K	27	-	-	-	1	-	-
Y870	Følgetilstand etter selvmord	K	1	-	-	-	-	-	-
Y872	Følgetilstand etter hendelse med usikker hensikt	M	2	-	-	-	-	-	-
Y883	Følgetilstand etter kirurgisk og medisinsk prosedyre uten merknad om uhell ved tidspunkt for død	M	1	-	-	-	-	-	-
Y899	Følgetilstand etter uspesifisert ytre årsak	M	2	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Age														ICD-10
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Y850
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	Y859
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	2	2	2	2	Y86
-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	4	8	6	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y870
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Y872
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Y883
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	Y899

Tabell 2. Multiple dødsårsaker. Underliggende årsak (A) og nevnt komplikasjon og/eller medvirkende årsak (B). 1996

Europeisk forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	I alt		Alder					
	Total		Under 1 år year		1-14 år		15-24 år	
	A	B	A	B	A	B	A	B
I ALT TOTAL								
I alt Total	43 919	60 338	252	504	140	156	273	467
Menn Males	22 127	31 725	144	295	91	112	200	334
Kvinner Females	21 792	28 613	108	209	49	44	73	133
Dødsfall av sykdommer (A00-R99)								
<i>Deaths from diseases, total</i>								
I alt	41 660	52 685	248	299	89	69	104	130
Menn	20 786	27 375	144	185	58	49	72	86
Kvinner	20 874	25 310	104	114	31	20	32	44
01 INFEKSIØSE INKL. PARASITTÆRE SYKDOMMER (A00-B99)								
I alt	436	852	2	6	12	7	3	5
Menn	221	445	-	6	9	3	3	2
Kvinner	215	407	2	-	3	4	-	3
02 Tuberkulose (A15-A19,B90)								
I alt	57	105	-	-	-	-	-	-
Menn	33	57	-	-	-	-	-	-
Kvinner	24	48	-	-	-	-	-	-
03 Meningokokkinfeksjon (A39)								
I alt	13		1		7		1	
Menn	6		-		4		1	
Kvinner	7		1		3		-	
04 AIDS (HIV-sykdom) (B20-B24)								
I alt	49	4	-	-	-	-	-	-
Menn	45	2	-	-	-	-	-	-
Kvinner	4	2	-	-	-	-	-	-
05 Akutt hepatitt og kronisk virushepatitt (B15-B19)								
I alt	4	12	-	-	-	-	-	-
Menn	3	11	-	-	-	-	-	-
Kvinner	1	1	-	-	-	-	-	-
06 SVULSTER (C00-D48)								
I alt	10 960	4 645	4	-	29	1	27	4
Menn	5 786	2 649	1	-	18	-	17	2
Kvinner	5 174	1 996	3	-	11	1	10	2
07 Ondartet svulster (C00-C97)								
I alt	10 643	4 508	1	-	26	1	27	4
Menn	5 637	2 583	-	-	16	-	17	2
Kvinner	5 006	1 925	1	-	10	1	10	2
08 Ondartet svulst i leppe, i munnhulen og svelget (C00-C14)								
I alt	153	141	-	-	-	-	2	-
Menn	98	99	-	-	-	-	-	-
Kvinner	55	42	-	-	-	-	2	-
09 Ondartet svulst i spiserøret (C15)								
I alt	125	10	-	-	-	-	-	-
Menn	91	7	-	-	-	-	-	-
Kvinner	34	3	-	-	-	-	-	-
10 Ondartet svulst i magesekken (C16)								
I alt	572	118	-	-	-	-	-	-
Menn	349	76	-	-	-	-	-	-
Kvinner	223	42	-	-	-	-	-	-

Multiple causes of deaths. Deaths by underlying cause (A) and diagnosis coded as associated cause (B). 1996

Age												Short-list ICD-10	
25-34 år		35-44 år		45-54 år		55-64 år		65-74 år		75 år og over			
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
498	785	802	1 176	1 871	2 274	3 048	3 673	8 315	11 033	28 720	40 270	A00-Y89	
366	607	506	857	1 156	1 609	1 927	2 577	5 221	7 227	12 516	18 107		
132	178	296	319	715	665	1 121	1 096	3 094	3 806	16 204	22 163		
279	279	614	636	1 651	1 625	2 886	3 014	8 065	9 909	27 724	36 724	A00-R99	
195	198	358	444	1 001	1 126	1 809	2 108	5 049	6 525	12 100	16 654		
84	81	256	192	650	499	1 077	906	3 016	3 384	15 624	20 070		
15	15	21	23	24	40	19	58	62	194	278	504	A00-B99	
11	11	19	17	22	27	12	35	34	114	111	230		
4	4	2	6	2	13	7	23	28	80	167	274		
-	-	2	1	2	1	1	1	11	18	41	84	A15-A19,	
-	-	2	-	2	1	1	-	6	14	22	42	B90	
-	-	-	1	-	-	-	1	5	4	19	42		
1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	A39	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1		
13	3	15	1	14	-	5	-	2	-	-	-	B20-B24	
10	1	14	1	14	-	5	-	2	-	-	-		
3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	4	-	4	1	1	-	1	-	2	3	-	B15-B19	
-	4	-	4	1	1	-	1	-	1	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
64	7	233	25	791	86	1 353	201	3 030	911	5 429	3 410	C00-D48	
28	4	69	13	352	42	712	123	1 776	578	2 813	1 887		
36	3	164	12	439	44	641	78	1 254	333	2 616	1 523		
63	7	233	25	784	84	1 340	191	2 977	877	5 192	3 319	C00-C97	
28	4	69	13	347	40	708	117	1 744	556	2 708	1 851		
35	3	164	12	437	44	632	74	1 233	321	2 484	1 468		
1	-	2	-	16	4	32	13	49	43	51	81	C00-C14	
1	-	1	-	13	4	19	12	33	33	31	50		
-	-	1	-	3	-	13	1	16	10	20	31		
-	-	3	-	11	-	16	1	44	6	51	3	C15	
-	-	1	-	8	-	13	1	33	5	36	1		
-	-	2	-	3	-	3	-	11	1	15	2		
3	-	6	-	41	3	73	9	140	25	309	81	C16	
2	-	4	-	28	-	47	9	99	21	169	46		
1	-	2	-	13	3	26	-	41	4	140	35		

**Tabell 2 (forts.). Multiple dødsårsaker. Underliggende årsak (A) og
nevnt komplikasjon og/eller medvirkende årsak (B). 1996**

Europeisk forkortet dødsårsaksliste <i>European short-list for causes of death</i>	I alt <i>Total</i>		Under 1 år <i>year</i>		Alder			
	A	B	A	B	A	B	A	B
11 Ondartet svulst i tykktarm og overgang mellom sigmoideum og endetarm (C18-C19)								
I alt	998	449	-	-	-	-	1	-
Menn	442	232	-	-	-	-	1	-
Kvinner	556	217	-	-	-	-	-	-
12 Ondartet svulst i endetarmen og endetarms-åpningen og analkanal (C20-C21)								
I alt	532	231	-	-	-	-	-	-
Menn	288	133	-	-	-	-	-	-
Kvinner	244	98	-	-	-	-	-	-
13 Ondartet svulst i lever og intrahepatiske galleganger (C22)								
I alt	86	21	-	-	-	-	-	-
Menn	51	17	-	-	-	-	-	-
Kvinner	35	4	-	-	-	-	-	-
14 Ondartet svulst i bukspyttkjertel (C25)								
I alt	585	20	-	-	-	-	-	-
Menn	279	9	-	-	-	-	-	-
Kvinner	306	11	-	-	-	-	-	-
15 Ondartet svulst i strupen, luftrør, bronkie og lunge (C32-C34)								
I alt	1 723	204	-	-	-	-	-	-
Menn	1 154	154	-	-	-	-	-	-
Kvinner	569	50	-	-	-	-	-	-
16 Malignt melanom i hud (C43)								
I alt	201	181	-	-	-	-	-	-
Menn	114	88	-	-	-	-	-	-
Kvinner	87	93	-	-	-	-	-	-
17 Ondartet svulst i bryst (C50)								
I alt	830	510	-	-	-	-	-	-
Menn	7	3	-	-	-	-	-	-
Kvinner	823	507	-	-	-	-	-	-
18 Ondartet svulst i livmorhals (C53)								
I alt	134	64	-	-	-	-	-	-
Kvinner	134	64	-	-	-	-	-	-
19 Ondartet svulst i andre deler av livmoren (C54-C55)								
I alt	120	128	-	-	-	-	-	-
Kvinner	120	128	-	-	-	-	-	-
20 Ondartet svulst i eggstokk (C56)								
I alt	331	72	-	-	-	-	-	-
Kvinner	331	72	-	-	-	-	-	-
21 Ondartet svulst i blærehalskjertel (C61)								
I alt	1 162	778	-	-	-	-	-	-
Menn	1 162	778	-	-	-	-	-	-
22 Ondartet svulst i nyre, unntatt nyrebekken (C64)								
I alt	244	101	-	-	-	-	-	-
Menn	147	63	-	-	-	-	-	-
Kvinner	97	38	-	-	-	-	-	-
23 Ondartet svulst i urinblære (C67)								
I alt	365	408	-	-	-	-	-	-
Menn	252	314	-	-	-	-	-	-
Kvinner	113	94	-	-	-	-	-	-

Multiple causes of deaths. Deaths by underlying cause (A) and diagnosis coded as associated cause (B). 1996

Age												Short-list ICD-10	
25-34 år		35-44 år		45-54 år		55-64 år		65-74 år		75 år og over			
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
5	-	4	3	60	6	125	8	251	76	552	356	C18-C19	
1	-	1	-	29	5	61	6	136	43	213	178		
4	-	3	3	31	1	64	2	115	33	339	178		
1	1	7	-	29	1	73	4	140	45	282	180	C20-C21	
-	-	3	-	18	1	48	3	92	27	127	102		
1	1	4	-	11	-	25	1	48	18	155	78		
-	-	4	-	5	2	11	3	22	7	44	9	C22	
-	-	4	-	2	2	8	2	16	7	21	6		
-	-	-	-	3	-	3	1	6	-	23	3		
							1		5		14		
2	-	6	-	39	-	79	-	176	5	283	4	C25	
2	-	3	-	23	-	43	1	94	-	114	10		
-	-	3	-	16	-	36	-	82	-	169	-		
3	-	28	-	152	7	303	16	670	83	567	98	C32-C34	
2	-	13	-	76	3	202	11	466	56	395	84		
1	-	15	-	76	4	101	5	204	27	172	14		
-	1	12	-	38	4	35	15	44	30	72	131	C43	
-	1	7	-	25	1	17	8	28	18	37	60		
-	-	5	-	13	3	18	7	16	12	35	71		
6	-	58	3	104	8	131	20	182	67	349	412	C50	
-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	4	2		
6	-	58	3	104	8	128	20	182	66	345	410		
5	-	14	4	21	4	16	5	32	15	46	36	C53	
5	-	14	4	21	4	16	5	32	15	46	36		
-	-	2	1	5	-	11	7	36	30	66	90	C54-C55	
-	-	2	1	5	-	11	7	36	30	66	90		
3	1	12	1	44	5	50	2	92	20	130	43	C56	
3	1	12	1	44	5	50	2	92	20	130	43		
-	-	-	-	8	1	62	16	267	126	825	635	C61	
-	-	-	-	8	1	62	16	267	126	825	635		
1	-	4	1	21	3	31	6	78	28	109	63	C64	
1	-	2	1	15	3	21	4	49	19	59	36		
-	-	2	-	6	-	10	2	29	9	50	27		
-	1	2	1	3	4	21	11	92	78	247	313	C67	
-	1	1	1	2	2	15	11	66	61	168	238		
-	-	1	-	1	2	6	-	26	17	79	75		

**Tabell 2 (forts.). Multiple dødsårsaker. Underliggende årsak (A) og
nevnt komplikasjon og/eller medvirkende årsak (B). 1996**

Europeisk forkortet dødsårsaksliste <i>European short-list for causes of death</i>	I alt				Alder			
	<i>Total</i>		<i>Under 1 år year</i>		<i>1-14 år</i>		<i>15-24 år</i>	
	A	B	A	B	A	B	A	B
24 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev (C81-C96)								
I alt	924	243	-	-	7	-	9	2
Menn	493	153	-	-	5	-	7	2
Kvinner	431	90	-	-	2	-	2	-
25 SYKDOMMER I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER, FORSTYRRELSE I IMMUNSYSTEMET(D50-D98)								
I alt	107	340	-	3	2	1	-	2
Menn	42	145	-	2	2	1	-	2
Kvinner	65	195	-	1	-	-	-	-
26 INDRESEKRETORISKE SYKDOMMER, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTE SYKDOMMER (E00-E90)								
I alt	675	2 970	6	3	2	1	10	-
Menn	313	1 278	3	2	-	1	9	-
Kvinner	362	1 692	3	1	2	-	1	-
27 Sukkersyke (E10-E14)								
I alt	506	2 417	-	-	-	1	5	-
Menn	249	1 074	-	-	-	1	5	-
Kvinner	257	1 343	-	-	-	-	-	-
28 PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSMESSIGE FORSTYRRELSE (F00-F99)								
I alt	1 121	2 560	-	-	-	2	19	21
Menn	546	1 117	-	-	-	2	14	19
Kvinner	575	1 443	-	-	-	-	5	2
29 Alkoholbetingende psykoser/ avhengighet av alkohol(F10)								
I alt	214	272	-	-	-	-	1	2
Menn	172	230	-	-	-	-	-	2
Kvinner	42	42	-	-	-	-	1	-
30 Avhengighet av stoff eller medikamenter (F11-F16,F18-F19)								
I alt	191	34	-	-	-	-	18	6
Menn	165	23	-	-	-	-	14	6
Kvinner	26	11	-	-	-	-	4	-
31 SYKDOMMER I NERVESYSTEMET OG SANSEORGANENE (G00-H95)								
I alt	891	1 306	7	5	13	12	15	16
Menn	438	713	6	2	5	8	9	10
Kvinner	453	593	1	3	8	4	6	6
32 Hjernehinnebetennelse (meningitt) (G00-G03)								
I alt	20	15	-	-	2	1	1	2
Menn	10	9	-	-	-	-	1	-
Kvinner	10	6	-	-	2	1	-	2
33 SYKDOMMER I SIRKULASJONS- ORGANENE (I00-I99)								
I alt	19 498	19 206	1	18	4	12	10	21
Menn	9 651	10 273	-	10	2	11	8	14
Kvinner	9 847	8 933	1	8	2	1	2	7
34 Ischemisk hjertesykdom (I20-I25)								
I alt	8 991	5 008	-	2	-	2	2	2
Menn	5 127	3 095	-	-	-	2	2	2
Kvinner	3 864	1 913	-	2	-	-	-	-

Multiple causes of deaths. Deaths by underlying cause (A) and diagnosis coded as associated cause (B). 1996

Age												Short-list ICD-10	
25-34 år		35-44 år		45-54 år		55-64 år		65-74 år		75 år og over			
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
7	2	21	5	70	8	98	15	261	71	451	140	C81-C96	
4	2	11	5	43	6	56	11	163	51	204	76		
3	-	10	-	27	2	42	4	98	20	247	64		
2	6	2	4	4	8	5	17	12	53	80	246	D50-D98	
1	3	-	1	4	7	3	9	3	33	29	87		
1	3	2	3	-	1	2	8	9	20	51	159		
14	4	24	20	37	82	56	146	128	546	398	2 168	E00-E90	
10	1	12	11	26	53	34	96	72	323	147	791		
4	3	12	9	11	29	22	50	56	223	251	1 377		
8	2	15	11	22	50	40	99	101	446	315	1 808	E10-E14	
8	1	6	8	17	35	26	67	57	279	130	683		
-	1	9	3	5	15	14	32	44	167	185	1 125		
92	39	90	61	63	102	59	108	105	241	693	1 986	F00-F99	
80	28	74	47	46	76	46	85	73	151	213	709		
12	11	16	14	17	26	13	23	32	90	480	1 277		
3	10	20	30	45	53	53	60	62	69	30	48	F10	
2	8	17	22	33	49	42	51	53	58	25	40		
1	2	3	8	12	4	11	9	9	11	5	8		
88	12	66	8	14	4	3	3	1	1	1	1	- F11-F16,	
78	9	57	5	12	2	3	1	-	-	1	1	- F18-F20	
10	3	9	3	2	2	-	2	1	1	-	-		
19	19	25	51	63	86	69	100	173	239	507	778	G00-H95	
13	13	15	36	35	61	37	68	90	155	228	360		
6	6	10	15	28	25	32	32	83	84	279	418		
-	1	1	-	1	4	2	1	4	3	9	3		
-	-	1	-	1	4	1	-	1	3	5	2	G00-G03	
-	1	-	-	-	-	1	1	3	-	4	1		
41	55	128	180	438	534	910	1 166	3 441	3 999	14 525	13 221	I00-I99	
31	45	101	129	355	400	703	853	2 319	2 726	6 132	6 085		
10	10	27	51	83	134	207	313	1 122	1 273	8 393	7 136		
9	13	63	60	300	179	583	398	1 958	1 262	6 076	3 090	I20-I25	
9	12	55	44	259	149	469	321	1 398	930	2 935	1 635		
-	1	8	16	41	30	114	77	560	332	3 141	1 455		

**Tabell 2 (forts.). Multiple dødsårsaker. Underliggende årsak (A) og
nevnt komplikasjon og/eller medvirkende årsak (B). 1996**

Europeisk forkortet dødsårsaksliste <i>European short-list for causes of death</i>	I alt <i>Total</i>		Under 1 år <i>year</i>		Alder			
	A	B	A	B	A	B	A	B
35 Andre hjertesykdommer (eksl. reumatiske og hjerteklaffsykdommer) (I30-I52)								
I alt	3 435	6 309	-	8	2	3	4	15
Menn	1 380	3 180	-	5	1	3	4	10
Kvinner	2 055	3 129	-	3	1	-	-	5
35 Karsykdommer i hjernen (I60-I69)								
I alt	5 220	2 924	-	1	1	5	1	2
Menn	2 180	1 432	-	-	1	5	1	1
Kvinner	3 040	1 492	-	1	-	-	-	1
37 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSS- ORGANENE (J00-J99)								
I alt	3 933	8 823	10	18	1	15	3	25
Menn	1 886	4 818	6	15	1	12	-	18
Kvinner	2 047	4 005	4	3	-	3	3	7
38 Influensa (J10-J11)								
I alt	47	11	-	-	-	-	-	-
Menn	14	6	-	-	-	-	-	-
Kvinner	33	5	-	-	-	-	-	-
39 Lungebetennelse (J12-J18)								
I alt	2 086	5 650	7	14	-	6	-	14
Menn	826	2 912	4	11	-	5	-	11
Kvinner	1 260	2 738	3	3	-	1	-	3
40 Kroniske sykdommer i nedre luftveier (J40-J47)								
I alt	1 548	1 867	-	1	-	2	1	2
Menn	903	1 171	-	1	-	2	-	1
Kvinner	645	696	-	-	-	-	1	1
41 Astma (J45-J46)								
I alt	292	447	-	-	-	-	1	2
Menn	145	228	-	-	-	-	-	1
Kvinner	147	219	-	-	-	-	1	1
42 SYKDOMMER I FORDØYELSESS- ORGANENE (K00-K93)								
I alt	1 310	2 004	1	6	-	5	1	12
Menn	649	1 093	1	6	-	3	1	7
Kvinner	661	911	-	-	-	2	-	5
43 Sår i magesekk, tolvfingertarm og magesår (K25-K28)								
I alt	255	251	-	-	-	-	-	-
Menn	132	148	-	-	-	-	-	-
Kvinner	123	103	-	-	-	-	-	-
44 Kronisk leversykdom (K70,K73-K74)								
I alt	241	200	-	1	-	-	-	4
Menn	171	138	-	1	-	-	-	2
Kvinner	70	62	-	-	-	-	-	2
45 SYKDOM I HUD OG UNDERHUD (L00-L99)								
I alt	39	144	-	-	-	-	-	-
Menn	19	58	-	-	-	-	-	-
Kvinner	20	86	-	-	-	-	-	-
46 SYKDOM I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET (M00-M99)								
I alt	300	568	-	-	1	1	-	1
Menn	95	152	-	-	1	1	-	-
Kvinner	205	416	-	-	-	-	-	1

Multiple causes of deaths. Deaths by underlying cause (A) and diagnosis coded as associated cause (B). 1996

Age													Short-list ICD-10
25-34 år		35-44 år		45-54 år		55-64 år		65-74 år		75 år og over			
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
13	23	19	48	38	178	72	311	344	1 093	2 943	4 630	I30-I52	
11	20	16	40	32	140	55	244	221	751	1 040	1 967		
2	3	3	8	6	38	17	67	123	342	1 903	2 663		
15	6	40	26	69	53	151	96	739	476	4 204	2 259	I60-I69	
9	4	24	14	43	34	102	66	427	309	1 573	999		
6	2	16	12	26	19	49	30	312	167	2 631	1 260		
3	39	7	66	54	254	167	502	541	1 682	3 147	6 222	J00-J99	
-	21	5	38	28	147	93	335	331	1 090	1 422	3 142		
3	18	2	28	26	107	74	167	210	592	1 725	3 080		
-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	42	9	J10-J11	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	12	5		
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	30	4		
2	23	1	39	13	135	18	245	98	854	1 947	4 320	J12-J18	
-	12	1	24	7	71	9	167	62	550	743	2 061		
2	11	-	15	6	64	9	78	36	304	1 204	2 259		
-	3	4	4	34	53	133	154	383	520	993	1 128	J40-J47	
-	1	2	1	15	37	72	107	228	343	586	678		
-	2	2	3	19	16	61	47	155	177	407	450		
-	1	3	1	13	13	31	39	69	126	175	265	J45-J46	
-	-	2	-	8	9	17	29	40	79	78	110		
-	1	1	1	5	4	14	10	29	47	97	155		
8	41	31	79	80	130	106	179	208	440	875	1 112	K00-K93	
7	30	27	60	64	85	68	119	131	288	350	495		
1	11	4	19	16	45	38	60	77	152	525	617		
1	1	-	5	5	6	9	19	24	60	216	160	K25-K28	
1	-	-	4	4	4	4	12	17	41	106	87		
-	1	-	1	1	2	5	7	7	19	110	73		
3	12	25	30	59	38	55	36	58	44	41	35	K70,	
3	8	22	25	51	29	38	29	40	28	17	16	K73-K74	
-	4	3	5	8	9	17	7	18	16	24	19		
-	-	-	-	1	2	-	3	3	26	35	113	L00-L99	
-	-	-	-	1	2	-	2	2	15	16	39		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	19	74		
1	1	4	2	11	13	21	17	79	102	183	431	M00-M99	
1	-	1	1	6	9	7	8	38	48	41	85		
-	1	3	1	5	4	14	9	41	54	142	346		

**Tabell 2 (forts.). Multiple dødsårsaker. Underliggende årsak (A) og
nevnt komplikasjon og/eller medvirkende årsak (B). 1996**

Europeisk forkortet dødsårsaksliste <i>European short-list for causes of death</i>	I alt				Alder			
	<i>Total</i>		<i>Under 1 år year</i>		1-14 år		15-24 år	
	A	B	A	B	A	B	A	B
47 Leddgikt og artrose (M05-M06,M15-M19)								
I alt	148	242	-	-	-	-	-	-
Menn	36	59	-	-	-	-	-	-
Kvinner	112	183	-	-	-	-	-	-
48 SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSSORGANER (N00-N99)								
I alt	571	1 648	-	4	1	1	-	3
Menn	285	979	-	4	1	1	-	2
Kvinner	286	669	-	-	-	-	-	1
49 Sykdommer i nyre og urinleider (N00-N29)								
I alt	359	1 166	-	4	1	-	-	2
Menn	183	704	-	4	1	-	-	1
Kvinner	176	462	-	-	-	-	-	1
50 SYKDOMMER I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG (O00-O99)								
I alt	1	-	-	-	-	-	-	-
Kvinner	1	-	-	-	-	-	-	-
51 VISSE TILSTANDER VED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN (P00-P96)								
I alt	111	195	109	195	1	-	-	-
Menn	71	123	70	123	1	-	-	-
Kvinner	40	72	39	72	-	-	-	-
52 MEDFØDTE MISDANNELSER (Q00-Q99)								
I alt	163	82	72	39	18	5	9	2
Menn	90	42	38	13	13	3	6	1
Kvinner	73	40	34	26	5	2	3	1
53 Medfødte misdannelser i nervesystemet (Q00-Q07)								
I alt	14	4	8	4	4	-	-	-
Menn	11	1	6	1	3	-	-	-
Kvinner	3	3	2	3	1	-	-	-
54 Medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet (Q20-Q28)								
I alt	61	46	25	28	7	3	7	-
Menn	31	21	10	10	5	2	5	-
Kvinner	30	25	15	18	2	1	2	-
55 SYMTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER (R00-R99)								
I alt	1 544	7 342	36	2	5	6	7	18
Menn	694	3 490	19	2	5	3	5	9
Kvinner	850	3 852	17	-	-	3	2	9
56 Plutselig død av ukjent årsak hos spedbarn (krybbedøds syndrom) (R95)								
I alt	38	-	35	-	3	-	-	-
Menn	22	-	19	-	3	-	-	-
Kvinner	16	-	16	-	-	-	-	-
57 Ukjente og uspesifiserte årsaker (R96-R99)								
I alt	989	4 466	1	2	2	4	7	17
Menn	539	2 509	-	2	2	3	5	8
Kvinner	450	1 957	1	-	-	1	2	9

Multiple causes of deaths. Deaths by underlying cause (A) and diagnosis coded as associated cause (B). 1996

Age												Short-list ICD-10	
25-34 år		35-44 år		45-54 år		55-64 år		65-74 år		75 år og over			
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
-	-	-	-	2	5	6	7	36	45	104	185	M05-M06,	
-	-	-	-	1	4	-	2	14	21	21	32	M15-M19	
-	-	-	-	1	1	6	5	22	24	83	153		
-	4	7	20	4	43	10	85	65	276	484	1 212	N00-N99	
-	3	3	8	2	27	7	49	45	183	227	702		
-	1	4	12	2	16	3	36	20	93	257	510		
-	4	6	20	3	38	9	68	46	212	294	818	N00-N29	
-	3	3	8	2	24	6	36	35	135	136	493		
-	1	3	12	1	14	3	32	11	77	158	325		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	7	11	3	12	5	15	6	12	11	8	4	Q00-Q99	
2	3	7	1	10	4	7	5	5	9	2	3		
4	4	4	2	2	1	8	1	7	2	6	1		
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Q00-Q07	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	6	6	1	4	1	4	1	1	3	3	3	Q20-Q28	
2	3	4	-	3	1	2	-	-	3	-	2		
2	3	2	1	1	-	2	1	1	-	3	1		
13	42	30	102	69	240	96	426	206	1 189	1 082	5 317	R00-R99	
11	36	25	82	50	186	80	321	130	812	369	2 039		
2	6	5	20	19	54	16	105	76	377	713	3 278		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	39	29	88	67	206	94	364	198	958	578	2 788	R96-R99	
11	34	24	75	48	164	78	288	125	675	246	1 260		
2	5	5	13	19	42	16	76	73	283	332	1 528		

**Tabell 2 (forts.). Multiple dødsårsaker. Underliggende årsak (A) og
nevnt komplikasjon og/eller medvirkende årsak (B). 1996**

Europeisk forkortet dødsårsaksliste <i>European short-list for causes of death</i>	I alt				Alder			
	<i>Total</i>		<i>Under 1 år year</i>		1-14 år		15-24 år	
	A	B	A	B	A	B	A	B
58 Voldsomme dødsfall i alt (V01-Y89)								
<i>Violent deaths, total</i>								
I alt	2 259	560	4	-	51	1	169	4
Menn	1 341	213	-	-	33	-	128	3
Kvinner	918	347	4	-	18	1	41	1
59 ULYKKER (V01-X59, Y85-Y86)								
I alt	1 674	523	3	-	38	1	85	4
Menn	914	192	-	-	25	-	63	3
Kvinner	760	331	3	-	13	1	22	1
60 Transportulykker (V01-V99,Y85)								
I alt	370	4	-	-	20	-	65	1
Menn	265	1	-	-	13	-	47	-
Kvinner	105	3	-	-	7	-	18	1
61 Fallulykker (W00-W19)								
I alt	863	:	-	:	1	:	4	:
Menn	376	:	-	:	-	:	3	:
Kvinner	487	:	-	:	1	:	1	:
62 Forgiftningsulykker (X40-X49)								
I alt	72	14	-	-	1	-	2	2
Menn	48	10	-	-	1	-	1	2
Kvinner	24	4	-	-	-	-	1	-
63 SELVMORD (X60-X84,Y87.0)								
I alt	517	-	-	-	9	-	78	-
Menn	389	-	-	-	6	-	62	-
Kvinner	128	-	-	-	3	-	16	-
64 DRAP, OVERFALL (X85-Y09,Y87.1)								
I alt	47	-	1	-	4	-	4	-
Menn	25	-	-	-	2	-	1	-
Kvinner	22	-	1	-	2	-	3	-
65 SKADE DER DET ER UKJENT OM ÅRSAKEN ER ET UHELL ELLER ER PÅFØRT MED HENSIKT (Y10-Y34, Y87.2)								
I alt	17	-	-	-	-	-	2	-
Menn	10	-	-	-	-	-	2	-
Kvinner	7	-	-	-	-	-	-	-

Multiple causes of deaths. Deaths by underlying cause (A) and diagnosis coded as associated cause (B). 1996

Age												Short-list ICD-10	
25-34 år		35-44 år		45-54 år		55-64 år		65-74 år		75 år og over			
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
219	4	188	4	220	13	162	26	250	65	996	443	V01-Y89	
171	3	148	2	155	11	118	22	172	32	416	140		
48	1	40	2	65	2	44	4	78	33	580	303		
105	3	94	4	118	12	112	22	180	55	939	422	V01-X59,	
83	2	79	2	89	10	83	18	118	26	374	131	Y85-Y86	
22	1	15	2	29	2	29	4	62	29	565	291		
62	-	40	-	42	-	33	1	64	1	44	1	V01-V99,	
48	-	33	-	29	-	26	1	42	-	27	-	Y85	
14	-	7	-	13	-	7	-	22	1	17	1		
5	:	16	:	12	:	24	:	64	:	737	:	W00-W19	
4	:	15	:	10	:	18	:	42	:	284	:		
1	:	1	:	2	:	6	:	22	:	453	:		
7	1	12	-	28	2	11	3	5	-	6	6	X40-X49	
6	1	10	-	20	1	6	2	2	-	2	4		
1	-	2	-	8	1	5	1	3	-	4	2		
102	-	81	-	89	-	45	-	66	-	47	-	X60-X84,	
80	-	63	-	59	-	32	-	50	-	37	-	Y87.0	
22	-	18	-	30	-	13	-	16	-	10	-		
9	-	9	-	8	-	2	-	4	-	6	-	X85-Y09,	
5	-	4	-	5	-	1	-	4	-	3	-	Y87.1	
4	-	5	-	3	-	1	-	-	-	3	-		
3	-	4	-	5	-	1	-	-	-	2	-	Y10-Y34,	
3	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	Y87.2	
-	-	2	-	3	-	1	-	-	-	1	-		

Tabell 3. Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Europeisk forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	I alt Total	Alder Age									
		Under 1 år year	1-6 år years	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over and over
DØDSFALL I ALT DEATHS, TOTAL											
I alt Total	43 919	252	80	60	273	498	802	1 871	3 048	8 315	28 720
Menn Males	22 127	144	50	41	200	366	506	1 156	1 927	5 221	12 516
Kvinner Females	21 792	108	30	19	73	132	296	715	1 121	3 094	16 204
Dødsfall av sykdommer (A00-R99)											
<i>Deaths from diseases, total</i>											
I alt	41 660	248	59	30	104	279	614	1 651	2 886	8 065	27 724
Menn	20 786	144	38	20	72	195	358	1 001	1 809	5 049	12 100
Kvinner	20 874	104	21	10	32	84	256	650	1 077	3 016	15 624
01 INFEKSIØSE INKL. PARASITTÆRE SYKDOMMER (A00-B99)											
I alt	436	2	11	1	3	15	21	24	19	62	278
Menn	221	-	8	1	3	11	19	22	12	34	111
Kvinner	215	2	3	-	-	4	2	2	7	28	167
02 Tuberkulose (A15-A19,B90)											
I alt	57	-	-	-	-	-	2	2	1	11	41
Menn	33	-	-	-	-	-	2	2	1	6	22
Kvinner	24	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19
03 Meningokokkinfeksjon (A39)											
I alt	13	1	7	-	1	1	-	-	-	2	1
Menn	6	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-
Kvinner	7	1	3	-	-	-	-	-	-	2	1
04 AIDS (HIV-sykdom) (B20-B24)											
I alt	49	-	-	-	-	13	15	14	5	2	-
Menn	45	-	-	-	-	10	14	14	5	2	-
Kvinner	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
05 Akutt hepatitt og kronisk virushepatitt (B15-B19)											
I alt	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Menn	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Kvinner	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
06 SVULSTER (C00-D48)											
I alt	10 960	4	17	12	27	64	233	791	1 353	3 030	5 429
Menn	5 786	1	10	8	17	28	69	352	712	1 776	2 813
Kvinner	5 174	3	7	4	10	36	164	439	641	1 254	2 616
07 Ondartet svulster (C00-C97)											
I alt	10 643	1	15	11	27	63	233	784	1 340	2 977	5 192
Menn	5 637	-	9	7	17	28	69	347	708	1 744	2 708
Kvinner	5 006	1	6	4	10	35	164	437	632	1 233	2 484
08 Ondartet svulst i leppe, i munnhulen og svelget (C00-C14)											
I alt	153	-	-	-	2	1	2	16	32	49	51
Menn	98	-	-	-	-	1	1	13	19	33	31
Kvinner	55	-	-	-	2	-	1	3	13	16	20
09 Ondartet svulst i spiserøret (C15)											
I alt											
Menn	125	-	-	-	-	-	3	11	16	44	51
Kvinner	91	-	-	-	-	-	1	8	13	33	36
	34	-	-	-	-	-	2	3	3	11	15
10 Ondartet svulst i magesekken (C16)											
I alt	572	-	-	-	-	3	6	41	73	140	309
Menn	349	-	-	-	-	2	4	28	47	99	169
Kvinner	223	-	-	-	-	1	2	13	26	41	140

Tabell 3 (forts.) Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Europeisk forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	I alt <i>Total</i>	Alder Age									
		Under 1 år <i>year</i>	1-6 år <i>years</i>	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over <i>and over</i>
11 Ondartet svulst i tykktarm og overgang mellom sigmoideum og endetarm (C18-C19)											
I alt	998	-	-	-	1	5	4	60	125	251	552
Menn	442	-	-	-	1	1	1	29	61	136	213
Kvinner	556	-	-	-	-	4	3	31	64	115	339
12 Ondartet svulst i endetarmen og endetarmsåpningen og analkanal (C20-C21)											
I alt	532	-	-	-	-	1	7	29	73	140	282
Menn	288	-	-	-	-	-	3	18	48	92	127
Kvinner	244	-	-	-	-	1	4	11	25	48	155
13 Ondartet svulst i lever og intrahepatiske galleganger (C22)											
I alt	86	-	-	-	-	-	4	5	11	22	44
Menn	51	-	-	-	-	-	4	2	8	16	21
Kvinner	35	-	-	-	-	-	-	3	3	6	23
14 Ondartet svulst i bukspyttkjertel (C25)											
I alt	585	-	-	-	-	2	6	39	79	176	283
Menn	279	-	-	-	-	2	3	23	43	94	114
Kvinner	306	-	-	-	-	-	3	16	36	82	169
15 Ondartet svulst istrupen, luftrør, bronkie og lunge (C32-C34)											
I alt	1 723	-	-	-	-	3	28	152	303	670	567
Menn	1 154	-	-	-	-	2	13	76	202	466	395
Kvinner	569	-	-	-	-	1	15	76	101	204	172
16 Malignt melanom i hud (C43)											
I alt	201	-	-	-	-	-	12	38	35	44	72
Menn	114	-	-	-	-	-	7	25	17	28	37
Kvinner	87	-	-	-	-	-	5	13	18	16	35
17 Ondartet svulst i bryst (C50)											
I alt	830	-	-	-	-	6	58	104	131	182	349
Menn	7	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4
Kvinner	823	-	-	-	-	6	58	104	128	182	345
18 Ondartet svulst i livmorhals (C53)											
I alt	134	-	-	-	-	5	14	21	16	32	46
Kvinner	134	-	-	-	-	5	14	21	16	32	46
19 Ondartet svulst i andre deler av livmoren (C54-C55)											
I alt	120	-	-	-	-	-	2	5	11	36	66
Kvinner	120	-	-	-	-	-	2	5	11	36	66
20 Ondartet svulst i eggstokk (C56)											
I alt	331	-	-	-	-	3	12	44	50	92	130
Kvinner	331	-	-	-	-	3	12	44	50	92	130
21 Ondartet svulst i blærehalskjertel (C61)											
I alt	1 162	-	-	-	-	-	-	8	62	267	825
Menn	1 162	-	-	-	-	-	-	8	62	267	825
22 Ondartet svulst i nyre, unntatt nyrebekken (C64)											
I alt	244	-	-	-	-	1	4	21	31	78	109
Menn	147	-	-	-	-	1	2	15	21	49	59
Kvinner	97	-	-	-	-	-	2	6	10	29	50

Tabell 3 (forts.) Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996
Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Europeisk forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	I alt Total	Alder Age									
		Under 1 år year	1-6 år years	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over and over
23 Ondartet svulst i urinblære (C67)											
I alt	365	-	-	-	-	-	2	3	21	92	247
Menn	252	-	-	-	-	-	1	2	15	66	168
Kvinner	113	-	-	-	-	-	1	1	6	26	79
24 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev (C81-C96)											
I alt	924	-	4	3	9	7	21	70	98	261	451
Menn	493	-	2	3	7	4	11	43	56	163	204
Kvinner	431	-	2	-	2	3	10	27	42	98	247
25 SYKDOMMER I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER, FORSTYRRELSE I IMMUNSYSTEMET(D50-D89)											
I alt	107	-	2	-	-	2	2	4	5	12	80
Menn	42	-	2	-	-	1	-	4	3	3	29
Kvinner	65	-	-	-	-	1	2	-	2	9	51
26 INDRESEKRETORISKE SYKDOMMER, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTE SYKDOMMER (E00-E90)											
I alt	675	6	1	1	10	14	24	37	56	128	398
Menn	313	3	-	-	9	10	12	26	34	72	147
Kvinner	362	3	1	1	1	4	12	11	22	56	251
27 Sukkersyke (E10-E14)											
I alt	506	-	-	-	5	8	15	22	40	101	315
Menn	249	-	-	-	5	8	6	17	26	57	130
Kvinner	257	-	-	-	-	-	9	5	14	44	185
28 PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSMESSIGE FORSTYRRELSE (F00-F99)											
I alt	1 121	-	-	-	19	92	90	63	59	105	693
Menn	546	-	-	-	14	80	74	46	46	73	213
Kvinner	575	-	-	-	5	12	16	17	13	32	480
29 Alkoholbetegnende psykoser/ avhengighet av alkohol(F10)											
I alt	214	-	-	-	1	3	20	45	53	62	30
Menn	172	-	-	-	-	2	17	33	42	53	25
Kvinner	42	-	-	-	1	1	3	12	11	9	5
30 Avhengighet av stoff eller medikamenter (F11-F16,F18-F19)											
I alt	191	-	-	-	18	88	66	14	3	1	1
Menn	165	-	-	-	14	78	57	12	3	-	1
Kvinner	26	-	-	-	4	10	9	2	-	1	-
31 SYKDOMMER I NERVESYSTEMET OG SANSEORGANENE (G00-H95)											
I alt	891	7	8	5	15	19	25	63	69	173	507
Menn	438	6	2	3	9	13	15	35	37	90	228
Kvinner	453	1	6	2	6	6	10	28	32	83	279
32 Hjernehinnebetennelse (meningitt) (G00-G03)											
I alt	20	-	1	1	1	-	1	1	2	4	9
Menn	10	-	-	-	1	-	1	1	1	1	5
Kvinner	10	-	1	1	-	-	-	-	1	3	4
33 SYKDOMMER I SIRKULASJONS- ORGANENE (I00-I99)											
I alt	19 498	1	2	2	10	41	128	438	910	3 441	14 525
Menn	9 651	-	1	1	8	31	101	355	703	2 319	6 132
Kvinner	9 847	1	1	1	2	10	27	83	207	1 122	8 393

Tabell 3 (forts.) Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

	Europeisk forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	I alt Total	Alder Age									
			Under 1 år year	1-6 år years	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over and over
34	Iskemisk hjertesykdom (I20-I25)											
	I alt	8 991	-	-	-	2	9	63	300	583	1 958	6 076
	Menn	5 127	-	-	-	2	9	55	259	469	1 398	2 935
	Kvinner	3 864	-	-	-	-	-	8	41	114	560	3 141
35	Andre hjertesykdommer (eksl. reumatiske og hjerteklaffsykdommer) (I30-I52)											
	I alt	3 435	-	1	1	4	13	19	38	72	344	2 943
	Menn	1 380	-	-	1	4	11	16	32	55	221	1 040
	Kvinner	2 055	-	1	-	-	2	3	6	17	123	1 903
36	Karsykdommer i hjernen (I60-I69)											
	I alt	5 220	-	1	-	1	15	40	69	151	739	4 204
	Menn	2 180	-	1	-	1	9	24	43	102	427	1 573
	Kvinner	3 040	-	-	-	-	6	16	26	49	312	2 631
37	SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSORGANENE (J00-J99)											
	I alt	3 933	10	1	-	3	3	7	54	167	541	3 147
	Menn	1 886	6	1	-	-	-	5	28	93	331	1 422
	Kvinner	2 047	4	-	-	3	3	2	26	74	210	1 725
38	Influensa (J10-J11)											
	I alt	47	-	-	-	-	-	-	-	2	3	42
	Menn	14	-	-	-	-	-	-	-	2	-	12
	Kvinner	33	-	-	-	-	-	-	-	-	3	30
39	Lungebetennelse (J12-J18)											
	I alt	2 086	7	-	-	-	2	1	13	18	98	1 947
	Menn	826	4	-	-	-	-	1	7	9	62	743
	Kvinner	1 260	3	-	-	-	2	-	6	9	36	1 204
40	Kroniske sykdommer i nedre luftveier (J40-J47)											
	I alt	1 548	-	-	-	1	-	4	34	133	383	993
	Menn	903	-	-	-	-	-	2	15	72	228	586
	Kvinner	645	-	-	-	1	-	2	19	61	155	407
41	Astma (J45-J46)											
	I alt	292	-	-	-	1	-	3	13	31	69	175
	Menn	145	-	-	-	-	-	2	8	17	40	78
	Kvinner	147	-	-	-	1	-	1	5	14	29	97
42	SYKDOMMER I FORDØYELSESSORGANENE (K00-K93)											
	I alt	1 310	1	-	-	1	8	31	80	106	208	875
	Menn	649	1	-	-	1	7	27	64	68	131	350
	Kvinner	661	-	-	-	-	1	4	16	38	77	525
43	Sår i magesekkk, tolvfingertarm og magesår (K25-K28)											
	I alt	255	-	-	-	-	1	-	5	9	24	216
	Menn	132	-	-	-	-	1	-	4	4	17	106
	Kvinner	123	-	-	-	-	-	-	1	5	7	110
44	Kronisk leveresykdom (K70,K73-K74)											
	I alt	241	-	-	-	-	3	25	59	55	58	41
	Menn	171	-	-	-	-	3	22	51	38	40	17
	Kvinner	70	-	-	-	-	-	3	8	17	18	24
45	SYKDOM I HUD OG UNDERHUD (L00-L99)											
	I alt	39	-	-	-	-	-	-	1	-	3	35
	Menn	19	-	-	-	-	-	-	1	-	2	16
	Kvinner	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19

Tabell 3 (forts.) Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996
Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Europeisk forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	I alt Total	Alder Age									
		Under 1 år year	1-6 år years	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over and over
46 SYKDOM I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET (M00-M99)											
I alt	300	-	-	1	-	1	4	11	21	79	183
Menn	95	-	-	1	-	1	1	6	7	38	41
Kvinner	205	-	-	-	-	-	3	5	14	41	142
47 Leddgikt og artrose (M05-M06,M15-M19)											
I alt	148	-	-	-	-	-	-	2	6	36	104
Menn	36	-	-	-	-	-	-	1	-	14	21
Kvinner	112	-	-	-	-	-	-	1	6	22	83
48 SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNNSORGANER (N00-N99)											
I alt	571	-	1	-	-	-	7	4	10	65	484
Menn	285	-	1	-	-	-	3	2	7	45	227
Kvinner	286	-	-	-	-	-	4	2	3	20	257
49 Sykdommer i nyre og urinleder (N00-N29)											
I alt	359	-	1	-	-	-	6	3	9	46	294
Menn	183	-	1	-	-	-	3	2	6	35	136
Kvinner	176	-	-	-	-	-	3	1	3	11	158
50 SYKDOMMER I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG (O00-O99)											
I alt	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kvinner	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
51 VISSE TILSTANDER VED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN (P00-P96)											
I alt	111	109	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Menn	71	70	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kvinner	40	39	-	-	-	-	1	-	-	-	-
52 MEDFØDTE MISDANNELSER (Q00-Q99)											
I alt	163	72	11	7	9	6	11	12	15	12	8
Menn	90	38	8	5	6	2	7	10	7	5	2
Kvinner	73	34	3	2	3	4	4	2	8	7	6
53 Medfødte misdannelser i nervesystemet (Q00-Q07)											
I alt	14	8	3	1	-	-	1	-	-	1	-
Menn	11	6	2	1	-	-	1	-	-	1	-
Kvinner	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
54 Medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet (Q20-Q28)											
I alt	61	25	5	2	7	4	6	4	4	1	3
Menn	31	10	3	2	5	2	4	3	2	-	-
Kvinner	30	15	2	-	2	2	2	1	2	1	3
55 SYMTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER (R00-R99)											
I alt	1 544	36	4	1	7	13	30	69	96	206	1 082
Menn	694	19	4	1	5	11	25	50	80	130	369
Kvinner	850	17	-	-	2	2	5	19	16	76	713
56 Plutselig død av ukjent årsak hos spedbarn (krybbedøds syndrom) (R95)											
I alt	38	35	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Menn	22	19	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Kvinner	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 3 (forts.) Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996
Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996

Europeisk forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	I alt Total	Alder Age									
		Under 1 år year	1-6 år years	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over and over
57 Ukjente og uspesifiserte årsaker (R96-R99)											
I alt	989	1	1	1	7	13	29	67	94	198	578
Menn	539	-	1	1	5	11	24	48	78	125	246
Kvinner	450	1	-	-	2	2	5	19	16	73	332
58 Voldsomme dødsfall i alt (V01-Y89)											
<i>Violent deaths, total</i>											
I alt	2 259	4	21	30	169	219	188	220	162	250	996
Menn	1 341	-	12	21	128	171	148	155	118	172	416
Kvinner	918	4	9	9	41	48	40	65	44	78	580
59 ULYKKER (V01-X59,Y85-Y86)											
I alt	1 674	3	20	18	85	105	94	118	112	180	939
Menn	914	-	12	13	63	83	79	89	83	118	374
Kvinner	760	3	8	5	22	22	15	29	29	62	565
60 Transportulykker (V01-V99,Y85)											
I alt	370	-	10	10	65	62	40	42	33	64	44
Menn	265	-	5	8	47	48	33	29	26	42	27
Kvinner	105	-	5	2	18	14	7	13	7	22	17
61 Fallulykker (W00-W19)											
I alt	863	-	1	-	4	5	16	12	24	64	737
Menn	376	-	-	-	3	4	15	10	18	42	284
Kvinner	487	-	1	-	1	1	1	2	6	22	453
62 Forgiftningsulykker (X40-X49)											
I alt	72	-	1	-	2	7	12	28	11	5	6
Menn	48	-	1	-	1	6	10	20	6	2	2
Kvinner	24	-	-	-	1	1	2	8	5	3	4
63 SELVMORD (X60-X84,Y87.0)											
I alt	517	-	-	9	78	102	81	89	45	66	47
Menn	389	-	-	6	62	80	63	59	32	50	37
Kvinner	128	-	-	3	16	22	18	30	13	16	10
64 DRAP, OVERFALL (X85-Y09,Y87.1)											
I alt	47	1	1	3	4	9	9	8	2	4	6
Menn	25	-	-	2	1	5	4	5	1	4	3
Kvinner	22	1	1	1	3	4	5	3	1	-	3
65 SKADE DER DET ER UKJENT OM ÅRSAKEN ER ET UHELL ELLER ER PÅFØRT MED HENSIKT (Y10-Y34,Y87.2)											
I alt	17	-	-	-	2	3	4	5	1	-	2
Menn	10	-	-	-	2	3	2	2	-	-	1
Kvinner	7	-	-	-	-	-	2	3	1	-	1

Tabell 4. Dødlighet etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996. Pr. 100 000 innbyggere
Death rates by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996. Pr. 100 000 population

Europeisk forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	I alt <i>Total</i>	Alder Age									
		Under 1 år <i>year</i>	1-6 år <i>years</i>	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over <i>and over</i>
DØDSFALL I ALT DEATHS, TOTAL											
I alt Total	1 002,4	416,4	21,9	13,9	47,4	73,6	127,6	325,4	818,5	2 297,5	8 648,8
Menn Males	1 021,4	462,0	26,6	18,5	68,1	105,8	157,7	393,3	1 050,7	3 140,4	10 285,2
Kvinner Females	983,9	368,0	16,9	9,0	25,8	40,0	96,2	254,4	593,2	1 581,3	7 702,3
Dødsfall av sykdommer (A00-R99)											
<i>Deaths from diseases, total</i>											
I alt	950,9	409,8	16,1	6,9	18,0	41,3	97,7	287,1	775,0	2 228,4	8 348,9
Menn	959,5	462,0	20,2	9,0	24,5	56,4	111,6	340,6	986,3	3 037,0	9 943,3
Kvinner	942,4	354,4	11,8	4,7	11,3	25,4	83,2	231,2	569,9	1 541,4	7 426,6
01 INFEKSIØSE INKL. PARASITTÆRE SYKDOMMER (A00-B99)											
I alt	10,0	3,3	3,0	0,2	0,5	2,2	3,3	4,2	5,1	17,1	83,7
Menn	10,2	0,0	4,3	0,5	1,0	3,2	5,9	7,5	6,5	20,5	91,2
Kvinner	9,7	6,8	1,7	0,0	0,0	1,2	0,7	0,7	3,7	14,3	79,4
02 Tuberkulose (A15-A19,B90)											
I alt	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	3,0	12,3
Menn	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,5	3,6	18,1
Kvinner	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	9,0
03 Meningokokkinfeksjon (A39)											
I alt	0,3	1,7	1,9	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3
Menn	0,3	0,0	2,1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kvinner	0,3	3,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5
04 AIDS (HIV-sykdom) (B20-B24)											
I alt	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,4	2,4	1,3	0,6	0,0
Menn	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	4,4	4,8	2,7	1,2	0,0
Kvinner	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
05 Akutt hepatitt og kronisk virushepatitt (B15-B19)											
I alt	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,9
Menn	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,6
Kvinner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
06 SVULSTER (C00-D48)											
I alt	250,2	6,6	4,7	2,8	4,7	9,5	37,1	137,6	363,3	837,2	1 634,9
Menn	267,1	3,2	5,3	3,6	5,8	8,1	21,5	119,8	388,2	1 068,3	2 311,6
Kvinner	233,6	10,2	3,9	1,9	3,5	10,9	53,3	156,2	339,2	640,9	1 243,5
07 Ondartet svulster (C00-C97)											
I alt	242,9	1,7	4,1	2,5	4,7	9,3	37,1	136,3	359,8	822,6	1 563,5
Menn	260,2	0,0	4,8	3,2	5,8	8,1	21,5	118,1	386,0	1 049,0	2 225,3
Kvinner	226,0	3,4	3,4	1,9	3,5	10,6	53,3	155,5	334,4	630,2	1 180,7
08 Ondartet svulst i leppe, i munnhulen og svelget (C00-C14)											
I alt	3,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,3	2,8	8,6	13,5	15,4
Menn	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	4,4	10,4	19,8	25,5
Kvinner	2,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,3	1,1	6,9	8,2	9,5
09 Ondartet svulst i spiserøret (C15)											
I alt	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,9	4,3	12,2	15,4
Menn	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,7	7,1	19,8	29,6
Kvinner	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	1,6	5,6	7,1
10 Ondartet svulst i magesekken (C16)											
I alt	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	7,1	19,6	38,7	93,1
Menn	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,2	9,5	25,6	59,5	138,9
Kvinner	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	4,6	13,8	21,0	66,5

Tabell 4 (forts.) Dødlighet etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996. Pr. 100 000 innbyggere
Death rates by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996. Pr. 100 000 population

Europeisk forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	I alt Total	Alder Age									
		Under 1 år year	1-6 år years	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over and over
11 Ondartet svulst i tykktarm og overgang mellom sigmoideum og endetarm (C18-C19)											
I alt	22,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,6	10,4	33,6	69,4	166,2
Menn	20,4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	9,9	33,3	81,8	175,0
Kvinner	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	11,0	33,9	58,8	161,1
12 Ondartet svulst i endetarmen og endetarmsåpningen og analkanal (C20-C21)											
I alt	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	5,0	19,6	38,7	84,9
Menn	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	6,1	26,2	55,3	104,4
Kvinner	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	3,9	13,2	24,5	73,7
13 Ondartet svulst i lever og intrahepatiske galleganger (C22)											
I alt	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,9	3,0	6,1	13,3
Menn	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,7	4,4	9,6	17,3
Kvinner	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,6	3,1	10,9
14 Ondartet svulst i bukspyttkjertel (C25)											
I alt	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	6,8	21,2	48,6	85,2
Menn	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,9	7,8	23,4	56,5	93,7
Kvinner	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,7	19,1	41,9	80,3
15 Ondartet svulst istrupen, luftrør, bronkie og lunge (C32-C34)											
I alt	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,5	26,4	81,4	185,1	170,7
Menn	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	4,1	25,9	110,1	280,3	324,6
Kvinner	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,9	27,0	53,4	104,3	81,8
16 Malignt melanom i hud (C43)											
I alt	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	6,6	9,4	12,2	21,7
Menn	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	8,5	9,3	16,8	30,4
Kvinner	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	4,6	9,5	8,2	16,6
17 Ondartet svulst i bryst (C50)											
I alt	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	9,2	18,1	35,2	50,3	105,1
Menn	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	3,3
Kvinner	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	18,9	37,0	67,7	93,0	164,0
18 Ondartet svulst i livmorhals (C53)											
Kvinner	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	4,4	7,1	8,7	19,2	37,8
19 Ondartet svulst i andre deler av livmoren (C54-C55)											
Kvinner	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,7	6,0	21,7	54,2
20 Ondartet svulst i eggstokk (C56)											
Kvinner	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,7	15,0	27,3	55,3	106,8
21 Ondartet svulst i blærehalskjertel (C61)											
Menn	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	33,8	160,6	678,0
22 Ondartet svulst i nyre, unntatt nyrebekken (C64)											
I alt	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	3,7	8,3	21,6	32,8
Menn	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	5,1	11,4	29,5	48,5
Kvinner	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,1	5,3	14,8	23,8

Tabell 4 (forts.) Dødlighet etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996. Pr. 100 000 innbyggere
Death rates by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996. Pr. 100 000 population

Europeisk forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	I alt <i>Total</i>	Alder Age									
		Under 1 år <i>year</i>	1-6 år <i>years</i>	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over <i>and over</i>
23 Ondartet svulst i urinblære (C67)											
I alt	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	5,6	25,4	74,4
Menn	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	8,2	39,7	138,1
Kvinner	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	3,2	13,3	37,6
24 Ondartet svulst i lymfatiske og bloddannende vev (C81-C96)											
I alt	21,1	0,0	1,1	0,7	1,6	1,0	3,3	12,2	26,3	72,1	135,8
Menn	22,8	0,0	1,1	1,4	2,4	1,2	3,4	14,6	30,5	98,0	167,6
Kvinner	19,5	0,0	1,1	0,0	0,7	0,9	3,3	9,6	22,2	50,1	117,4
25 SYKDOMMER I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER, FORSTYRRELSE I IMMUNSYSTEMET(D50-D89)											
I alt	2,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	1,3	3,3	24,1
Menn	1,9	0,0	1,1	0,0	0,0	0,3	0,0	1,4	1,6	1,8	23,8
Kvinner	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	1,1	4,6	24,2
26 INDRESEKRETORISKE SYKDOMMER, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTE SYKDOMMER (E00-E90)											
I alt	15,4	9,9	0,3	0,2	1,7	2,1	3,8	6,4	15,0	35,4	119,9
Menn	14,4	9,6	0,0	0,0	3,1	2,9	3,7	8,8	18,5	43,3	120,8
Kvinner	16,3	10,2	0,6	0,5	0,4	1,2	3,9	3,9	11,6	28,6	119,3
27 Sukkersyke (E10-E14)											
I alt	11,5	0,0	0,0	0,0	0,9	1,2	2,4	3,8	10,7	27,9	94,9
Menn	11,5	0,0	0,0	0,0	1,7	2,3	1,9	5,8	14,2	34,3	106,8
Kvinner	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	1,8	7,4	22,5	87,9
28 PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSMESSIGE FORSTYRRELSE (F00-F99)											
I alt	25,6	0,0	0,0	0,0	3,3	13,6	14,3	11,0	15,8	29,0	208,7
Menn	25,2	0,0	0,0	0,0	4,8	23,1	23,1	15,7	25,1	43,9	175,0
Kvinner	26,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,6	5,2	6,0	6,9	16,4	228,2
29 Alkoholbetingede psykoser/avhengighet av alkohol(F10)											
I alt	4,9	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	3,2	7,8	14,2	17,1	9,0
Menn	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	5,3	11,2	22,9	31,9	20,5
Kvinner	1,9	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	1,0	4,3	5,8	4,6	2,4
30 Avhengighet av stoff eller medikamenter (F11-F16,F18-F19)											
I alt	4,4	0,0	0,0	0,0	3,1	13,0	10,5	2,4	0,8	0,3	0,3
Menn	7,6	0,0	0,0	0,0	4,8	22,6	17,8	4,1	1,6	0,0	0,8
Kvinner	1,2	0,0	0,0	0,0	1,4	3,0	2,9	0,7	0,0	0,5	0,0
31 SYKDOMMER I NERVESYSTEMET OG SANSEORGANENE (G00-H95)											
I alt	20,3	11,6	2,2	1,2	2,6	2,8	4,0	11,0	18,5	47,8	152,7
Menn	20,2	19,2	1,1	1,4	3,1	3,8	4,7	11,9	20,2	54,1	187,4
Kvinner	20,5	3,4	3,4	0,9	2,1	1,8	3,3	10,0	16,9	42,4	132,6
32 Hjernehinnebetennelse (meningitt) (G00-G03)											
I alt	0,5	0,0	0,3	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,5	1,1	2,7
Menn	0,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,5	0,6	4,1
Kvinner	0,5	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	1,9
33 SYKDOMMER I SIRKULASJONS-ORGANENE (I00-I99)											
I alt	445,0	1,7	0,5	0,5	1,7	6,1	20,4	76,2	244,4	950,8	4 374,1
Menn	445,5	0,0	0,5	0,5	2,7	9,0	31,5	120,8	383,3	1 394,9	5 039,0
Kvinner	444,6	3,4	0,6	0,5	0,7	3,0	8,8	29,5	109,5	573,4	3 989,5

Tabell 4 (forts.) Dødlighet etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996. Pr. 100 000 innbyggere
Death rates by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996. Pr. 100 000 population

Europeisk forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	Total year	Alder Age										
		Under 1 år years	1-6 år	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over and over	
		I alt										
34 Ischemisk hjertesykdom (I20-I25)		205,2	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	10,0	52,2	156,6	541,0	1 829,7
I alt		236,7	0,0	0,0	0,0	0,7	2,6	17,1	88,1	255,7	840,9	2 411,9
Menn		174,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	14,6	60,3	286,2	1 493,0	
Kvinner												
35 Andre hjertesykdommer (eksl. reumatiske og hjerteklaffsykdommer) (I30-I52)		78,4	0,0	0,3	0,2	0,7	1,9	3,0	6,6	19,3	95,0	886,3
I alt		63,7	0,0	0,0	0,5	1,4	3,2	5,0	10,9	30,0	132,9	854,6
Menn		92,8	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	1,0	2,1	9,0	62,9	904,6
Kvinner												
36 Karsykdommer i hjernen (I60-I69)		119,1	0,0	0,3	0,0	0,2	2,2	6,4	12,0	40,6	204,2	1 266,0
I alt		100,6	0,0	0,5	0,0	0,3	2,6	7,5	14,6	55,6	256,8	1 292,6
Menn		137,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	5,2	9,2	25,9	159,5	1 250,6
Kvinner												
37 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSORGANENE (J00-J99)		89,8	16,5	0,3	0,0	0,5	0,4	1,1	9,4	44,8	149,5	947,7
I alt		87,1	19,2	0,5	0,0	0,0	0,0	1,6	9,5	50,7	199,1	1 168,5
Menn		92,4	13,6	0,0	0,0	1,1	0,9	0,7	9,2	39,2	107,3	819,9
Kvinner												
38 Influensa (J10-J11)		1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	12,6
I alt		0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	9,9
Menn		1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	14,3
Kvinner												
39 Lungebetennelse (J12-J18)		47,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	2,3	4,8	27,1	586,3
I alt		38,1	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,4	4,9	37,3	610,6
Menn		56,9	10,2	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	2,1	4,8	18,4	572,3
Kvinner												
40 Kroniske sykdommer i nedre luftveier (J40-J47)		35,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,6	5,9	35,7	105,8	299,0
I alt		41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	5,1	39,3	137,1	481,6
Menn		29,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,7	6,8	32,3	79,2	193,5
Kvinner												
41 Astma (J45-J46)		6,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	2,3	8,3	19,1	52,7
I alt		6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,7	9,3	24,1	64,1
Menn		6,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	1,8	7,4	14,8	46,1
Kvinner												
42 SYKDOMMER I FORDØYELSESSORGANENE (K00-K93)		29,9	1,7	0,0	0,0	0,2	1,2	4,9	13,9	28,5	57,5	263,5
I alt		30,0	3,2	0,0	0,0	0,3	2,0	8,4	21,8	37,1	78,8	287,6
Menn		29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	5,7	20,1	39,4	249,5
Kvinner												
43 Sår i magesekk, tolvfingertarm og magesår (K25-K28)		5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,9	2,4	6,6	65,0
I alt		6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,4	2,2	10,2	87,1
Menn		5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,6	3,6	52,3
Kvinner												
44 Kronisk leveresykdom (K70,K73-K74)		5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,0	10,3	14,8	16,0	12,3
I alt		7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	6,9	17,4	20,7	24,1	14,0
Menn		3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,8	9,0	9,2	11,4
Kvinner												
45 SYKDOM I HUD OG UNDERHUD (L00-L99)		0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,8	10,5
I alt		0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,2	13,1
Menn		0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	9,0
Kvinner												

Tabell 4 (forts.) Dødlighet etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996. Pr. 100 000 innbyggere
Death rates by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996. Pr. 100 000 population

European forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	I alt <i>Total</i>	Alder Age									
		Under 1 år <i>year</i>	1-6 år <i>years</i>	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over <i>and over</i>
46 SYKDOM I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET (M00-M99)											
I alt	6,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,6	1,9	5,6	21,8	55,1
Menn	4,4	0,0	0,0	0,5	0,0	0,3	0,3	2,0	3,8	22,9	33,7
Kvinner	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,8	7,4	21,0	67,5	
47 Leddgikt og artrose (M05-M06,M15-M19)											
I alt	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,6	9,9	31,3
Menn	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	8,4	17,3
Kvinner	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,2	11,2	39,5
48 SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANER (N00-N99)											
I alt	13,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,1	0,7	2,7	18,0	145,8
Menn	13,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,9	0,7	3,8	27,1	186,5
Kvinner	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,7	1,6	10,2	122,2
49 Sykdommer i nyre og urinleder (N00-N29)											
I alt	8,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	2,4	12,7	88,5
Menn	8,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,9	0,7	3,3	21,1	111,8
Kvinner	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,4	1,6	5,6	75,1
50 SYKDOMMER I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG (O00-O99)											
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kvinner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51 VISSE TILSTANDER VED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN (P00-P96)											
I alt	2,5	180,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Menn	3,3	224,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kvinner	1,8	132,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
52 MEDFØDTE MISDANNELSER (Q00-Q99)											
I alt	3,7	119,0	3,0	1,6	1,6	0,9	1,8	2,1	4,0	3,3	2,4
Menn	4,2	121,9	4,3	2,3	2,0	0,6	2,2	3,4	3,8	3,0	1,6
Kvinner	3,3	115,9	1,7	0,9	1,1	1,2	1,3	0,7	4,2	3,6	2,9
53 Medfødte misdannelser i nervesystemet (Q00-Q07)											
I alt	0,3	13,2	0,8	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0
Menn	0,5	19,2	1,1	0,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,6	0,0
Kvinner	0,1	6,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54 Medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet (Q20-Q28)											
I alt	1,4	41,3	1,4	0,5	1,2	0,6	1,0	0,7	1,1	0,3	0,9
Menn	1,4	32,1	1,6	0,9	1,7	0,6	1,2	1,0	1,1	0,0	0,0
Kvinner	1,4	51,1	1,1	0,0	0,7	0,6	0,7	0,4	1,1	0,5	1,4
55 SYMTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER (R00-R99)											
I alt	35,2	59,5	1,1	0,2	1,2	1,9	4,8	12,0	25,8	56,9	325,8
Menn	32,0	61,0	2,1	0,5	1,7	3,2	7,8	17,0	43,6	78,2	303,2
Kvinner	38,4	57,9	0,0	0,0	0,7	0,6	1,6	6,8	8,5	38,8	338,9
56 Plutselig død av ukjent årsak hos spedbarn (krybbedøds syndrom) (R95)											
I alt	0,9	57,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menn	1,0	61,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kvinner	0,7	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabell 4 (forts.) Dødlighet etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996. Pr. 100 000 innbyggere
Death rates by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1996. Pr. 100 000 population

Europeisk forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	I alt Total	Alder Age									
		Under 1 år year	1-6 år years	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over and over
57 Ukjente og uspesifiserte årsaker (R96-R99)											
I alt	22,6	1,7	0,3	0,2	1,2	1,9	4,6	11,7	25,2	54,7	174,1
Menn	24,9	0,0	0,5	0,5	1,7	3,2	7,5	16,3	42,5	75,2	202,2
Kvinner	20,3	3,4	0,0	0,0	0,7	0,6	1,6	6,8	8,5	37,3	157,8
58 Voldsomme dødsfall i alt (V01-Y89)											
<i>Violent deaths, total</i>											
I alt	51,6	6,6	5,7	6,9	29,3	32,4	29,9	38,3	43,5	69,1	299,9
Menn	61,9	0,0	6,4	9,5	43,6	49,4	46,1	52,7	64,3	103,5	341,9
Kvinner	41,4	13,6	5,1	4,3	14,5	14,5	13,0	23,1	23,3	39,9	275,7
59 ULYKKER (V01-X59,Y85-Y86)											
I alt	38,2	5,0	5,5	4,2	14,7	15,5	15,0	20,5	30,1	49,7	282,8
Menn	42,2	0,0	6,4	5,9	21,5	24,0	24,6	30,3	45,3	71,0	307,3
Kvinner	34,3	10,2	4,5	2,4	7,8	6,7	4,9	10,3	15,3	31,7	268,6
60 Transportulykker (V01-V99,Y85)											
I alt	8,4	0,0	2,7	2,3	11,3	9,2	6,4	7,3	8,9	17,7	13,3
Menn	12,2	0,0	2,7	3,6	16,0	13,9	10,3	9,9	14,2	25,3	22,2
Kvinner	4,7	0,0	2,8	0,9	6,4	4,2	2,3	4,6	3,7	11,2	8,1
61 Fallulykker (W00-W19)											
I alt	19,7	0,0	0,3	0,0	0,7	0,7	2,5	2,1	6,4	17,7	221,9
Menn	17,4	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	4,7	3,4	9,8	25,3	233,4
Kvinner	22,0	0,0	0,6	0,0	0,4	0,3	0,3	0,7	3,2	11,2	215,3
62 Forgiftningsulykker (X40-X49)											
I alt	1,6	0,0	0,3	0,0	0,3	1,0	1,9	4,9	3,0	1,4	1,8
Menn	2,2	0,0	0,5	0,0	0,3	1,7	3,1	6,8	3,3	1,2	1,6
Kvinner	1,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,7	2,8	2,6	1,5	1,9
63 SELVMORD (X60-X84,Y87.0)											
I alt	11,8	0,0	0,0	2,1	13,5	15,1	12,9	15,5	12,1	18,2	14,2
Menn	18,0	0,0	0,0	2,7	21,1	23,1	19,6	20,1	17,4	30,1	30,4
Kvinner	5,8	0,0	0,0	1,4	5,7	6,7	5,9	10,7	6,9	8,2	4,8
64 DRAP, OVERFALL (X85-Y09,Y87.1)											
I alt	1,1	1,7	0,3	0,7	0,7	1,3	1,4	1,4	0,5	1,1	1,8
Menn	1,2	0,0	0,0	0,9	0,3	1,4	1,2	1,7	0,5	2,4	2,5
Kvinner	1,0	3,4	0,6	0,5	1,1	1,2	1,6	1,1	0,5	0,0	1,4
65 SKADE DER DET ER UKJENT OM PÅFØRT MED HENSIKT (Y10-Y34,Y87.2)											
I alt	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,6	0,9	0,3	0,0	0,6
Menn	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9	0,6	0,7	0,0	0,0	0,8
Kvinner	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	0,5	0,0	0,5

Tabell 5. Dødsfall blant barn i første leveår etter kjønn, alderstrinn og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996
Infant deaths by sex, age intervals and underlying cause of death. The whole country. 1996

ICD-10 Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death.</i> <i>International detailed list</i>		Kjønn og alder		Sex and age										
		I alt under 1 år <i>Under 1 year, total</i>	Under 24 timer <i>Under 24 hours</i>	1-6 dager 1-6 days	7-27 dager 7-27 days	I alt 0-27 dager <i>Total 0-27 days</i>	28 dager- 11 mndr. <i>28 days- 11 months</i>	Gutter	Jenter	Gutter	Jenter	Gutter	Jenter	
		Boys	Girls	Gutter	Jenter	Gutter	Jenter	Gutter	Jenter	Gutter	Jenter	Gutter	Jenter	
		DØDSFALL I ALT DEATHS, TOTAL	144	108	29	33	45	17	16	19	90	69	54	39
A080	Rotavirusenteritt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A392	Akutt meningokokkemi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C49	Ondartet svulst i bindevev bløtvev i overekstremitet, inklusive skulder	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D180	Hemangiom, alle lokalisasjoner	-	2	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-
D487	Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial med andre spesifiserte lokalisasjoner	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
E711	Andre forstyrrelser i metabolismen av grenede aminosyrer	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
E725	Forstyrrelser i glycinmetabolismen	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
E740	Glykogenlagringssykdom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E752	Annen sfingolipidose	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
E779	Uspesifisert forstyrrelse i glykoproteinmetabolismen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E889	Uspesifisert metabolsk forstyrrelse	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
G120	Infantil spinal muskelatrofi, type I [Werdnig-Hoffmans syndrom]	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G12	Annen arvelig spinal muskelatrofi	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
G409	Uspesifisert epilepsi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G711	Myotone lidelser	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G712	Medfødte myopatier	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
I270	Primær pulmonal hypertensjon	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
J13	Pneumoni som skyldes Streptococcus pneumoniae	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
J153	Pneumoni som skyldes Streptococcus, serogruppe B	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
J180	Bronkopneumoni, uspesifisert mikroorganisme	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
J189	Uspesifisert pneumoni	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
J208	Akutt bronkitt som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J210	Akutt bronkiolitt som skyldes respiratorisk syncytialvirus [RSV]	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
J849	Uspesifisert interstitiell lungesykdom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K830	Kolangitt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
P000	Foster og nyfødt påvirket av høyt blodtrykk hos mor	6	4	-	-	2	-	3	3	5	3	1	1	-
P002	Foster og nyfødt påvirket av infeksjonssykdommer og parasittsykdommer hos mor	2	1	1	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-
P008	Foster og nyfødt påvirket av andre spesifiserte tilstander hos mor	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
P010	Foster og nyfødt påvirket av livmorhalsinsuffisiens	6	1	5	1	1	-	-	-	6	1	-	-	-
P011	Foster og nyfødt påvirket av for tidlig vannavgang	3	2	-	2	2	-	-	-	2	2	1	-	-
P013	Foster og nyfødt påvirket av polyhydramnion	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
P021	Foster og nyfødt påvirket av andre former for morkakeløsning og morkakeblødning	6	5	4	4	1	-	1	1	6	5	-	-	-
P022	Foster og nyfødt påvirket av andre og uspesifiserte morfologiske og funksjonell avvik ved mor	7	4	3	2	2	2	1	-	6	4	1	-	-
P023	Foster og nyfødt påvirket av placentalt transfusjonssyndrom	2	3	-	2	2	1	-	-	2	3	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall blant barn i første leveår etter kjønn, alderstrinn og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996
Infant deaths by sex, age intervals and underlying cause of death. The whole country. 1996

ICD-10 Cause of death. International detailed list	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	I alt	Under 24	1-6 dager	7-27 dager	I alt 0-27	28 dager-
		under 1 år	timer	1-6 days	7-27 days	Total 0-27	11 mndr.
		Under 1 year, total	Under 24 hours	Gutter Jenter	Gutter Jenter	Gutter Jenter	28 days- days
		Boys	Girls	Gutter Jenter	Jenter	Gutter Jenter	Jenter
P024	Foster og nyfødt påvirket av navlesnorfremfall	2	1	1	1	-	-
P025	Foster og nyfødt påvirket av annen avklemming av navlesnor	1	-	-	1	-	-
P027	Foster og nyfødt påvirket av korioamnionitt	4	5	3	4	1	1
P031	Foster og nyfødt påvirket av andre feil i leie og innstilling og andre mekaniske misforhold under fødsel og forløsning	-	1	-	-	-	1
P038	Foster og nyfødt påvirket av andre spesifiserte komplikasjoner under fødsel og forløsning	2	1	1	-	1	2
P070	Ekstremt lav fødselsvekt	-	1	-	1	-	1
P072	Ekstrem immaturitet	-	1	-	1	-	1
P111	Annen spesifisert hjerneskade som skyldes fødselsskade	1	-	-	-	-	1
P200	Intrauterin hypoksi først diagnostisert før fødsel begynner	-	1	-	-	1	-
P201	Intrauterin hypoksi først diagnostisert under fødsel og forløsning	1	-	-	1	-	-
P209	Uspesifisert intrauterin hypoksi	1	-	-	1	-	1
P211	Lett og moderat fødselsasfyksi	1	-	-	-	1	-
P219	Uspesifisert fødselsasfyksi	1	-	1	-	-	1
P220	Respiratorisk distressyndrom hos nyfødt	7	3	1	2	4	1
P240	Aspirasjon av mekonium hos nyfødt	1	-	-	1	-	1
P241	Aspirasjon av fostervann og fostervann og slim hos nyfødt	1	1	-	-	1	1
P250	Interstitial emfysem som oppstår i perinatalperioden	-	1	-	-	-	1
P271	Bronkopulmonal dysplasi som oppstår i perinatalperioden	3	-	-	-	-	3
P280	Primær atelektase hos nyfødt	2	1	-	-	2	1
P290	Hjertesvikt hos nyfødt	1	-	-	1	-	1
P364	Sepsis hos nyfødt forårsaket av Escherichia coli	1	-	-	-	1	-
P709	Uspesifisert forbigående forstyrrelse i karbohydratmetabolismen hos foster og nyfødt	-	1	-	-	1	-
P768	Annen spesifisert tarmobstruksjon hos nyfødt	1	-	-	-	-	1
P77	Nekrotiserende enterokolitt hos foster og nyfødt	2	-	-	-	1	-
P780	Tarmperforasjon i perinatalperioden	1	1	-	-	1	-
P832	Føtal hydrops som ikke skyldes hemolytisk sykdom	1	-	-	1	-	-
Q000	Anencephalus	-	2	-	1	-	2
Q02	Foster med lite hode	1	-	1	-	-	-
Q038	Annen spesifisert medfødt hydrocephalus	1	-	-	-	-	1
Q039	Uspesifisert medfødt hydrocephalus	2	-	-	-	-	2
Q046	Medfødte hjernecyster	1	-	-	1	-	-
Q049	Uspesifisert medfødt misdannelsel i hjernen	1	-	-	-	-	1
Q210	Ventrikkelseptumdefekt [VSD]	1	-	-	1	-	-
Q211	Atrioseptumdefekt [ASD]	1	1	-	-	1	-
Q212	Atrioventrikulær septumdefekt	1	-	-	-	-	1
Q213	Fallots tetraide	-	2	-	-	1	-
Q220	Atresi i pulmonalklaff	-	1	-	1	-	1
Q234	Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom	2	1	-	1	-	2
Q248	Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjerte	-	1	-	-	1	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall blandt barn i første leveår etter kjønn, alderstrinn og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1996
Infant deaths by sex, age intervals and underlying cause of death. The whole country. 1996

ICD-10	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste <i>Cause of death. International detailed list</i>	I alt under 1 år <i>Under 1 year, total</i>		Under 24 timer <i>Under 24 hours</i>		1-6 dager 1-6 days		7-27 dager 7-27 days		I alt 0-27 dager Total 0-27 days		28 dager-11 mndr. 28 days-11 months	
		Gutter Boys	Jenter Girls	Gutter Boys	Jenter Girls	Gutter Boys	Jenter Girls	Gutter Boys	Jenter Girls	Gutter Boys	Jenter Girls	Gutter Boys	Jenter Girls
Q249	Uspesifisert medfødt misdannelse i hjerte	4	6	-	-	1	2	1	1	2	3	2	3
Q251	Coarctatio aortae	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Q255	Atresi av arteria pulmonalis	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Q390	Atresi av spiserør uten fistel	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Q401	Medfødt hiatushernie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Q423	Medfødt mangel på, atresi og stenose endetarmsåpning (anus) uten fistel	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Q606	Potters syndrom	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Q613	Uspesifisert cystenyre	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Q649	Uspesifisert medfødt misdannelse i urinsystemet	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Q772	Jeunes syndrom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Q789	Uspesifisert osteokondrodysplasi	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Q790	Medfødt mellomgulvsbrokk (hernia diaphragmatica)	3	3	1	2	1	1	-	-	2	3	1	-
Q870	Medføgte misdannelsessyndromer som hovedsakelig påvirker ansiktets utseende	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Q872	Medføgte misdannelsessyndromer som hovedsakelig omfatter ekstremiteter	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Q878	Andre spesifiserte medføchte misdannelsessyndromer	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Q894	Sammenvokste tvillinger	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Q899	Uspesifisert medfødt misdannelse	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Q909	Uspesifisert Downs syndrom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Q913	Uspesifisert Edwards' syndrom	5	2	2	1	3	1	-	-	5	2	-	-
Q917	Uspesifisert Pataus syndrom	4	4	-	2	1	1	3	-	4	3	-	1
Q929	Uspesifisert trisomi og partiell trisomi av autosomer	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Q979	Uspesifisert kjønnskromosomavvik, kvinnelig fenotype	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Q989	Uspesifisert kjønnskromosomavvik, mannelig fenotype	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
R95	Krybbedøds syndrom (SIDS)	19	16	-	-	1	1	1	3	2	4	17	12
R998	Dødsårsak ikke oppgitt	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
W750	Ulykke ved kvelning i sengen; hjemme	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
X000	Ukontrollert brann i bygning eller byggverk; hjemme	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
X599	Uspesifisert årsak til ulykke; uspesifisert sted	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y040	Drap med fysisk makt, ubevæpnet slagsmål; hjemme	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tabell 6. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår. 1936-1998

Perinatal and infant mortality. 1936-1998

År ¹ Year ¹	Døde pr. 1 000 fødte Deaths per 1 000 births		Døde pr. 1 000 levendefødte Deaths per 1 000 live births				
	Dødfødte ² Stillbirths ²	Dødfødte + døde under 1 uke Perinatal mortality	Under 24 timer Under 24 hours	Under 1 uke Under 1 week	Under 4 uker Under 4 weeks	4 uker - under 1 år 4 weeks - under 1 year	I alt under 1 år, total
1936-1940	22,6	38,3	8,3	16,1	21,3	18,1	39,4
1941-1945	20,2	32,6	7,3	12,7	18,4	18,9	37,3
1946-1950	17,5	30,0	7,0	12,6	16,0	15,1	31,1
1951-1955	15,3	26,1	6,0	11,0	13,1	9,5	22,6
1956-1960	14,3	24,5	5,8	10,4	12,4	7,5	19,9
1961-1965	12,4	22,5	5,7	10,2	12,0	5,1	17,1
1966-1970	11,1	20,1	5,3	9,1	10,3	3,6	13,9
1971-1975	9,1	16,4	4,5	7,4	8,4	3,2	11,6
1976-1980	7,1	12,0	2,8	4,9	5,9	3,2	9,0
1981-1985	5,7	9,5	2,3	3,8	4,6	3,5	8,1
1986-1990	4,4	7,8	2,2	3,3	4,2	3,7	7,9
1991-1995	4,3	7,0	1,7	2,7	3,4	1,9	5,3
1986	4,8	8,0	2,1	3,3	4,2	3,7	7,9
1987	4,2	7,9	2,3	3,7	4,7	3,7	8,4
1988	4,3	7,9	2,3	3,6	4,5	3,8	8,3
1989	4,5	7,6	2,1	3,1	3,9	4,0	7,9
1990	4,3	7,5	2,0	3,2	3,9	3,1	7,0
1991	4,6	7,4	1,7	2,7	3,7	2,7	6,4
1992	4,3	7,4	1,8	3,1	3,8	2,1	5,9
1993	4,2	6,9	1,7	2,7	3,5	1,7	5,1
1994	4,5	7,5	1,8	3,0	3,6	1,6	5,2
1995	3,6	5,8	1,3	2,2	2,7	1,4	4,1
1996	4,5	6,5	1,0	2,0	2,6	1,5	4,1
1997 ³	3,8	6,1	1,2	2,3	2,8	1,3	4,1
1998 ³	4,2	6,2	1,2	2,0	2,6	1,4	4,0

¹ Årsjennomsnitt for femårsperioden. ² Født uten liv med oppgitt svangerskapstid 28 uker og over (for årene 1986-1995 bygger antall dødfødsler på meldinger fra Medisinsk fødselsregister. Fra 1996 på befolkningsstatistikk). ³ Foreløpige tall fra befolkningsstatistikk.

¹ Annual average for the five-year period. ² Foetal deaths with reported period of gestation 28 weeks and over (stillbirths for the years 1986-1995 are based on medical birth certificates from Medical Birth Registry of Norway. From 1996 based on Population statistics). ³Preliminary figures from Population statistics.

Tabell 7. Dødsfall i første leveår. Fylke. 1986-1996

Infant deaths. County. 1986-1996

Fylke County	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Hele landet The whole country	416	455	477	468	428	387	353	305	314	249	252
Østfold	18	14	24	18	19	22	16	12	19	6	13
Akershus	26	32	39	46	51	29	30	28	32	16	25
Oslo	48	43	63	47	54	50	36	40	44	35	39
Hedmark	17	16	14	16	7	17	17	10	12	14	7
Oppland	9	20	17	15	18	23	10	9	14	11	11
Buskerud	14	24	35	22	21	22	16	17	19	11	9
Vestfold	19	17	20	20	12	10	7	10	15	5	9
Telemark	20	16	10	16	14	10	10	6	8	9	4
Aust-Agder	11	8	14	16	17	11	5	11	7	4	6
Vest-Agder	20	21	22	14	22	8	15	9	14	8	10
Rogaland	55	39	52	57	25	28	43	29	27	22	15
Hordaland	37	63	53	45	37	33	37	32	16	23	23
Sogn og Fjordane	5	8	10	13	9	7	7	8	3	2	2
Møre og Romsdal	18	25	19	22	25	24	19	19	19	17	12
Sør-Trøndelag	29	22	30	31	20	27	27	18	12	16	10
Nord-Trøndelag	16	15	11	17	21	11	10	11	8	6	9
Nordland	17	39	21	22	27	21	24	16	28	22	25
Troms	21	21	19	18	21	14	12	9	10	10	14
Finnmark	16	12	4	13	8	20	12	11	7	12	9

Tabell 8. Dødsfall blant barn 1-17 år, etter kjønn og underliggende dødsårsak. 1996
Deaths among children 1-17 years, by sex and underlying cause of death. 1996

ICD-10	Årsak Cause	Gutter Boys					Jenter Girls				
		I alt Total	1- 4 år Years	5- 9 år	10-14 år	15-17 år	I alt Total	1- 4 år Years	5- 9 år	10-14 år	15-17 år
	I alt Total	128	41	24	26	37	67	24	11	14	18
A00-B99	Visse infeksjons- og parasittsykdommer	10	7	1	1	1	3	3	-	-	-
C00-C97	Ondartede svelster	20	6	8	2	4	10	4	4	2	-
I60-I69	Karsykdommer i hjernen	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
P00-P96	Visse tilstander med begynnelse i den perinatale periode	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Medfødte misdannelser	14	7	2	4	1	5	3	1	1	-
R95	Krybbedøds syndrom (SIDS)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Rest A00-R99	Andre sykdommer	25	7	3	5	10	16	8	3	2	3
V01-V99,Y85	Transportulykker	18	4	6	3	5	13	2	3	2	6
W00-W19	Fallulykker	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-
X00-X09	Brannulykker	2	1	1	-	-	2	1	-	1	-
X40-X49	Forgiftningsulykker	2	1	-	-	1	1	-	-	-	1
X60-X84,Y87.0	Selvmord	16	-	-	6	10	9	-	-	3	6
X85-Y09,Y87.1	Drap, overfall	2	-	1	1	-	2	1	-	1	-
Rest V01-Y89	Andre ytre årsaker til død	12	3	2	4	3	5	1	-	2	2

Tabell 9. Dødelighet av hjerte- og karsykdommer, etter kjønn og alder. Underliggende dødsårsak 1951-1996.

Pr. 100 000 innbyggere

Sex and age-specific death rates from cardiovascular diseases. Underlying cause of death. 1951-1996.

Per 100 000 population

Kjønn. År ¹ Sex. Year ¹	Alder Age					
	-39 år years	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80 år og over
Menn Males						
1951-1955	7	82	311	942	2 781	7 484
1956-1960	7	99	360	1 105	3 141	8 244
1961-1965	8	112	429	1 281	3 367	8 936
1966-1970	7	143	456	1 389	3 489	8 733
1971-1975	7	139	458	1 315	3 542	8 688
1976-1980	6	127	454	1 246	3 252	7 834
1981-1985	7	107	432	1 190	3 168	7 724
1986-1990	7	93	373	1 143	3 025	7 654
1991-1995	6	72	257	939	2 624	7 228
1991	6	73	290	1 055	2 767	7 282
1992	5	79	288	954	2 732	7 394
1993	5	74	252	927	2 725	7 372
1994	7	67	229	866	2 455	6 913
1995	5	68	240	886	2 437	7 170
1996	6	64	205	753	2 357	7 143
Kvinner Females						
1951-1955	5	42	174	689	2 594	7 747
1956-1960	4	38	161	686	2 718	8 280
1961-1965	4	39	152	688	2 742	8 683
1966-1970	3	40	141	633	2 447	7 823
1971-1975	3	36	129	534	2 273	7 640
1976-1980	3	30	115	472	1 931	6 740
1981-1985	3	23	104	405	1 728	6 365
1986-1990	3	23	94	391	1 584	6 140
1991-1995	3	19	71	334	1 358	5 856
1991	3	15	72	369	1 497	5 941
1992	2	19	84	357	1 396	5 908
1993	3	19	71	329	1 384	6 073
1994	3	21	69	304	1 251	5 691
1995	3	19	61	308	1 254	5 678
1996	2	15	54	255	1 189	5 783

¹Årsjennomsnitt for femårsperioden.

¹Annual average for the five-year period.

Tabell 10. Dødelighet av ondartede svulster, etter kjønn og alder. Underliggende dødsårsak. 1951-1996. Pr. 100 000 innbyggere
Sex and age-specific death rates from malignant neoplasms. Underlying cause of death. 1951-1996. Per 100 000 population

Kjønn. År ¹ Sex. Year ¹	-29 år years	30-39 år	40-49 år	Alder		Age	80 år og over and over
				50-59 år	60-69 år		
Menn Males							
1951-1955	11	25	74	220	532	1 145	1 762
1956-1960	12	27	67	216	543	1 128	1 724
1961-1965	11	27	70	215	562	1 132	1 844
1966-1970	10	27	74	210	572	1 210	1 991
1971-1975	10	24	72	226	588	1 240	2 054
1976-1980	8	23	67	232	616	1 356	2 306
1981-1985	7	21	66	239	653	1 414	2 460
1986-1990	6	18	66	240	673	1 419	2 556
1991-1995	5	16	62	226	666	1 420	2 678
1991	5	22	58	237	669	1 412	2 553
1992	6	16	61	239	637	1 427	2 587
1993	7	16	61	213	693	1 440	2 714
1994	5	11	68	236	695	1 349	2 760
1995	4	18	62	215	638	1 464	2 758
1996	5	11	53	208	666	1 544	2 608
Kvinner Females							
1951-1955	10	33	103	240	436	856	1 365
1956-1960	8	37	104	224	430	778	1 205
1961-1965	8	32	97	209	404	757	1 220
1966-1970	8	32	100	217	409	776	1 246
1971-1975	6	31	98	214	399	732	1 186
1976-1980	6	27	86	227	419	758	1 296
1981-1985	5	27	88	221	426	759	1 331
1986-1990	4	24	88	229	432	780	1 317
1991-1995	3	25	89	212	452	760	1 315
1991	3	30	90	209	445	722	1 272
1992	4	23	84	210	429	750	1 232
1993	5	24	89	207	465	767	1 347
1994	4	23	96	225	454	794	1 349
1995	4	23	87	213	471	763	1 369
1996	4	27	93	235	478	794	1 392

¹Årsjennomsnitt for femårsperioden.

¹Annual average for the five-year period.

Tabell 11. Dødsfall av ulykker. 1996 Deaths by accidents. 1996

ICD-10	Skadens ytre årsak <i>Injury by external cause</i>	T alt <i>Total</i>	0-14 år <i>Years</i>	15-17 år <i>år</i>	18-24 år <i>år</i>	25-44 år <i>år</i>	45-64 år <i>år</i>	65-79 år <i>år</i>	80 år og over <i>og over</i>
V01-X59, Y85-Y86	Ulykker inkl. senfølger i alt <i>Accidents total</i>								
	Menn	914	25	10	53	162	172	210	282
	Kvinner	760	16	9	13	37	58	139	488
V01-V89	Landtransportulykker								
	Menn	211	13	5	37	60	36	50	10
	Kvinner	99	7	6	11	19	19	28	9
V95-V97	Luftfart								
	Menn	7	-	-	2	4	1	-	-
	Kvinner	1	-	-	-	1	-	-	-
V91,V93-V94	Sjøtransport untatt drukning								
	Menn	9	-	-	-	5	3	1	-
V90,V92	Sjøtransport med drukning								
	Menn	32	-	-	1	11	14	4	2
	Kvinner	2	-	-	-	1	1	-	-
W65-W74	Drukning (ikke sjøtransport)								
	Menn	54	3	1	4	13	20	11	2
	Kvinner	10	2	-	-	3	2	1	2
W00-W19	Fall								
	Menn	376	-	1	2	19	28	101	225
	Kvinner	487	1	-	1	2	8	77	398
W32-W34	Skytevåpen								
	Menn	4	2	-	-	1	1	-	-
W75-W84	Kvelning (ikke drukning)								
	Menn	31	3	-	2	7	8	6	5
	Kvinner	19	1	-	-	3	5	4	6
W85-W87	Ulykke med elektrisk kraft								
	Menn	5	1	-	-	3	1	-	-
X00-X09	Brann								
	Menn	37	2	-	2	11	6	7	9
	Kvinner	30	3	-	1	5	4	6	11
X20-X29	Giftige dyr og planter								
	Menn	2	-	-	-	-	1	1	-
	Kvinner	1	-	-	-	-	-	1	-
X30-X39	Ulykke grunnet naturkretfer								
	Menn	15	-	-	-	4	5	3	3
	Kvinner	4	-	-	-	-	1	2	1
X40-X49	Forgiftningsulykker								
	Menn	48	1	1	-	16	26	3	1
	Kvinner	24	-	1	-	3	13	4	3
Rest V01-X59	Andre ulykker								
	Menn	63	-	2	2	7	18	16	18
	Kvinner	53	1	1	-	-	3	9	39
Y85-Y86	Senfølger av ulykke								
	Menn	20	-	-	1	1	4	7	7
	Kvinner	30	1	1	-	-	2	7	19

Tabell 12 Dødsfall av transportulykker. 1996 Deaths by transport accidents. 1996

ICD-10	I alt	0-14 år	15-17	18-24	25-44	45-64	65-79	80 år
	Total	Year	år	år	år	år	år	og over
V01-V99 I alt Total								
Menn <i>Males</i>	260	13	5	41	80	54	55	12
Kvinner <i>Females</i>	102	7	6	11	21	20	28	9
V01-V09 Fotgjenger								
Menn	36	9	1	2	4	5	11	4
Kvinner	25	4	1	1	1	4	11	3
V10-V19 Syklist, fører/passasjer								
Menn	9	-	-	-	1	3	4	1
Kvinner	1	-	-	-	-	1	-	-
V20-V29 Motorsyklist, fører/passasjer								
Menn	22	1	1	6	8	1	3	2
Kvinner	-	-	-	-	-	-	-	-
V40-V49 Fører/passasjer i personbil								
Menn	105	2	3	27	30	16	24	3
Kvinner	68	3	5	10	16	13	15	6
V50-V59 Fører/passasjer i lett lastebil								
Menn	2	-	-	-	1	-	1	-
V60-V69 Fører/passasjer i tungt kjøretøy								
Menn	11	-	-	2	6	3	-	-
V70-V79 Fører/passasjer i buss								
Menn	1	-	-	-	-	1	-	-
V80-V89 Andre landtransportulykker								
Menn	25	1	-	-	10	7	7	-
Kvinner	5	-	-	-	2	1	2	-
V90-V94 Sjøtransportulykker								
Menn	41	-	-	1	16	17	5	2
Kvinner	2	-	-	-	1	1	-	-
V95-V97 Luftfartsulykker								
Menn	7	-	-	2	4	1	-	-
Kvinner	1	-	-	-	1	-	-	-
V98-V99 Andre og uspesifiserte transportulykker								
Menn	1	-	-	1	-	-	-	-
Kvinner	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 13. Dødsfall av trafikkulykker¹ etter trafikantgruppe Deaths by traffic accidents¹ by group of road-user. 1996

Trafikantgruppe Group of road-user	I alt Total	Alder Age							
		0-14 år years	15-17 år years	18-24 år years	25-44 år years	45-64 år years	65-79 år years	80 år og over years and over	
Trafikkulykker i alt <i>Traffic accidents total</i>									
<i>Menn Males</i>		177	9	5	36	49	26	43	
<i>Kvinner Females</i>		96	7	6	10	19	19	26	
Fotgjenger Pedestrian									
<i>Menn</i>		25	6	1	1	3	2	9	
<i>Kvinner</i>		23	4	1	-	1	4	10	
Syklist Pedal cyclist									
<i>Menn</i>		9	-	-	-	1	3	4	
<i>Kvinner</i>		1	-	-	-	-	1	-	
Motorsyklist Motorcycle rider									
<i>Menn</i>		21	1	1	6	8	1	2	
<i>Kvinner</i>		-	-	-	-	-	-	-	
Fører/passasjer i personbil <i>Car occupant</i>									
<i>Menn</i>		104	2	3	27	30	16	23	
<i>Kvinner</i>		68	3	5	10	16	13	15	
Fører/passasjer i lett lastebil <i>Occupant of pick-up truck or van</i>									
<i>Menn</i>		2	-	-	-	1	-	1	
<i>Kvinner</i>		-	-	-	-	-	-	-	
Fører/passasjer i tungt kjøretøy <i>Occupant of heavy transport vehicle</i>									
<i>Menn</i>		11	-	-	2	6	3	-	
<i>Kvinner</i>		-	-	-	-	-	-	-	
Fører/passasjer i buss <i>Bus occupant</i>									
<i>Menn</i>		-	-	-	-	-	-	-	
<i>Kvinner</i>		-	-	-	-	-	-	-	
Andre trafikkulykker <i>Other traffic accidents</i>									
<i>Menn</i>		5	-	-	-	-	1	4	
<i>Kvinner</i>		4	-	-	-	2	1	1	

¹ ICD-10 koder/codes:

Kode/Code	4. Karakter/character
V01-V06,V81-V82	.1
V09,V89	.2-3
V10-V18,V20-V28	4-5,9
V19,V29,V39,V49,V59,V69,V79	4-6,8-9
V30-V38,V40-V48,V50-V58, V60-V68,V70-V79	5-7,9
V83-V86	0-3
V87	.0-9

Tabell 14. Dødulykker etter skadested og aktivitet¹. 1996 Deaths from accidents by place of occurrence and activity¹. 1996

Skadested <i>Place of occurrence</i>	Ulykker i alt <i>Accidents, total</i>	Aktivitet Activity				
		Inntekts-givende arbeid <i>Work of income</i>	Utdanning, verneplikt <i>Education, military and civil service</i>	Idrett, sport mosjon <i>Sports activity</i>	Annен aktivitet <i>Other activity</i>	Ukjent aktivitet <i>Unknown</i>
I alt Total	1 624	58	-	9	203	1 354
Bolig og boligområde <i>Home</i>	329	2	-		31	296
Veitrafikkulykke <i>Traffic accident</i>	311	23	-	2	127	159
Annen ulykke på gate/vei (ikke trafikkulykke) <i>Other accident on street (non-traffic)</i>	5	1	-	-	1	3
Barnehage/lekeplass <i>Nursery school, kindergarten</i>	-	-	-	-	-	-
Skole/skolegård <i>School</i>	-	-	-	-	-	-
Sykehus, helse- og pleieinstitusjon <i>Hospital, nursing and care institutions</i>	49	-	-	-	5	44
Idrettsanlegg <i>Sports area</i>	1	-	-	-	1	-
Friluft. hav, sjø og vann <i>Outdoor, forest, lake, sea</i>	114	11	-	7	23	73
Annet oppgitt sted <i>Other places</i>	46	14	-	-	7	25
Ukjent skadested Unknown place	769	7	-	-	8	754

¹ICD-10 kodene V01 - X59. Norske steds- og aktivitetskoder, se sidene 988 - 998 i norsk utgave av ICD-10. Statens helsetilsyn 1998.

¹ICD-10 codes V01- X59. Place of occurrence- and acitivity codes used in Norway, ref. pages 988 -998 in Norwegian version of ICD-10.

Norwegian Board of Health, 1998.

Tabell 15. Selvmord og selvmordsrate, etter kjønn og alder

Suicide and suicide rate, by sex and age

Alder. År Age. Years	Menn Males									Kvinner Females								
	1971- 1976- 1981- 1986- 1991- 1993 1994 1995 1996									1971- 1976- 1981- 1986- 1991- 1993 1994 1995 1996								
	1975	1980	1985	1990	1995	1975	1980	1985	1990	1975	1980	1985	1990	1995	1975	1980	1985	1990
Antall ¹ Number ¹																		
I alt Total	271	345	424	476	437	449	379	411	389	94	128	153	175	155	141	152	137	128
-14 år years	2	1	4	4	5	5	6	7	6	0	0	0	1	2	2	2	2	3
15-19 år	10	20	25	28	28	25	26	28	17	3	4	6	8	7	6	6	8	10
20-29 år	43	65	84	99	91	82	88	75	91	17	24	20	21	18	24	15	14	17
30-39 år	34	52	74	83	77	86	72	75	67	11	17	27	31	25	23	29	23	20
40-49 år	53	50	61	84	81	94	60	81	60	16	21	25	34	31	22	28	34	22
50-59 år	60	70	76	62	50	42	55	43	49	21	31	31	26	21	14	24	17	26
60-69 år	41	50	59	61	50	52	32	50	38	18	21	27	29	24	22	24	19	16
70-79 år	21	27	31	38	40	44	33	39	45	7	9	14	19	19	18	19	15	10
80 år +	7	10	10	17	15	19	7	13	16	1	1	3	6	8	10	5	5	4
Pr. 100 000 innbyggere Per 100 000 population																		
Alle All	13,8	17,2	20,7	22,9	20,5	21,1	17,7	19,1	18,0	4,7	6,3	7,3	8,2	7,1	6,5	6,9	6,2	5,8
-14 år	1,3	0,6	2,4	2,8	3,9	3,7	4,5	5,2	1,4	0,1	0,1	0,3	0,7	1,3	1,6	1,6	1,6	0,7
15-19 år	6,6	12,4	15,0	16,7	19,0	17,3	18,5	20,3	12,5	1,7	2,5	3,5	5,0	5,1	4,3	4,5	6,1	7,7
20-29 år	13,6	20,6	26,5	29,7	26,7	23,8	25,6	22,1	27,3	5,7	8,0	6,5	6,6	5,5	7,3	4,6	4,3	5,3
30-39 år	15,7	19,2	23,5	26,0	23,8	26,5	22,0	22,7	20,1	5,4	6,8	9,2	10,3	8,0	7,4	9,3	7,3	6,3
40-49 år	24,0	24,8	28,6	31,2	26,1	30,1	19,0	25,6	19,0	7,4	10,4	12,0	13,1	10,6	7,4	9,3	11,3	7,3
50-59 år	24,9	30,0	36,2	32,4	24,6	21,0	26,3	19,5	21,0	8,5	13,0	14,5	13,3	10,5	7,0	11,5	7,8	11,3
60-69 år	22,0	25,2	28,8	30,6	27,4	28,7	18,1	28,9	22,3	8,6	9,7	12,0	13,1	12,1	11,1	12,5	10,1	8,7
70-79 år	19,4	22,9	24,6	28,1	28,5	31,0	23,0	27,1	31,3	4,9	5,7	8,1	10,3	9,8	9,4	9,8	7,8	5,2
80 år +	19,4	25,1	20,7	33,1	26,0	33,9	12,3	22,4	27,1	1,7	1,1	3,7	5,6	7,1	8,9	4,4	4,3	3,4

¹Årsjennomsnitt for femårsperioden.

¹Annual average for the five-year period.

Tabell 16. Selvmord etter dødsmåte *Suicide by method*

Døds måte <i>Method</i>	Antall ¹ <i>Number</i> ¹																
	Menn <i>Males</i>							Kvinner <i>Females</i>									
	1976- 1980	1981- 1985	1986- 1990	1991- 1995	1992	1993	1994	1995	1996	1976- 1980	1981- 1985	1986- 1990	1991- 1995	1992	1993	1994	1995
I alt <i>Total</i>	345	424	477	437	449	379	411	389		128	153	174	155	141	152	137	128
Gift <i>Poison</i>	81	90	102	89	86	78	79	62		56	64	75	58	56	59	54	54
Henging og kvelning <i>Hanging</i>	98	123	136	132	132	128	141	141		28	36	38	40	35	42	29	38
Drukning <i>Drowning</i>	21	28	24	22	22	16	18	19		22	32	29	30	25	28	28	17
Skyting <i>Firearms</i>	116	147	176	154	164	118	136	128		4	5	7	7	5	6	2	
Skjærende eller stikkende redskaper <i>Cutting or piercing instruments</i>	9	11	13	9	7	12	8	13		3	3	4	2	3	3	3	3
Sprang fra høyt sted <i>Jumping from high place</i>	11	17	14	14	18	12	14	15		9	9	13	12	6	10	12	5
Annen eller oppgitt <i>Other or unknown</i>	9	8	12	16	20	15	15	11		6	4	8	6	9	5	5	9

¹Års gjennomsnitt for femårsperioden.¹Annual average for the five-year period.

Tabell 17 Dødsfall av underliggende dødsårsak, etter dødssted. Prosent. 1996
Deaths of underlying cause of death, by place of death. Per cent. 1996

ICD-10	Årsak Causes	Dødsfall Deaths, total	Dødssted		Place of death			
			i alt	Total	Hjemme	Region-, fylkes- og somatisk spesialsykehus <i>Regional , districts and somatic specialized hospitals</i>	Andre pleie og helse-institusjoner	Annet sted <i>Other places</i>
	I alt	43 919	100,0	16,6		40,6	36,9	4,1
A00-B99	Visse infeksjons- og parasittsykdommer	436	100,0	6,0	59,6	32,6	1,1	0,7
C00-C97	Ondartede svulster	10 643	100,0	13,8	56,9	27,9	0,7	0,8
F11-F16,F18-F19	Avhengighet av medikamenter	191	100,0	35,1	9,4	1,0	51,8	2,6
I20-I25	Ischemisk hjertesykdom	8 991	100,0	26,6	39,4	25,5	6,8	1,7
I60-I69	Karsykdommer i hjernen	5 220	100,0	6,5	39,5	52,5	1,0	0,6
J10-J11	Influensa	47	100,0	12,8	2,1	85,1	0,0	0,0
J12-J18	Lungebetennelse	2 086	100,0	4,5	20,8	73,4	0,7	0,7
J45-J46	Astma	292	100,0	44,5	11,0	36,3	6,5	1,7
Rest J40-J47	Rest andre kroniske sykdommer i nedre luftveier	1 256	100,0	13,8	53,8	30,4	1,0	1,0
K70,K73-K74	Kronisk leversykdom	241	100,0	22,8	58,5	12,4	3,7	2,5
P00-P96	Visse tilstander med begynnelse i den perinatale periode	111	100,0	1,8	97,3	0,0	0,0	0,9
Q00-Q99	Medfødte misdannelser	163	100,0	7,4	74,2	10,4	6,1	1,8
R95	Krybbedøds syndrom (SIDS)	38	100,0	78,9	15,8	0,0	2,6	2,6
Rest A00-R99	Andre sykdommer	11 945	100,0	17,2	30,6	46,1	3,0	3,0
V01-V99,Y85	Transportulykker	362	100,0	1,7	27,3	1,4	64,6	5,0
W00-W19	Fallulykker	863	100,0	4,6	50,5	41,4	2,8	0,7
X00-X09	Brannulykker	67	100,0	67,2	22,4	3,0	6,0	1,5
X40-X49	Forgiftningsulykker	72	100,0	52,8	16,7	1,4	25,0	4,2
X60-X84,Y87.0	Selvmord	517	100,0	53,2	9,5	1,9	32,7	2,7
X85-Y09,Y87.1	Drap, overfall	47	100,0	46,8	4,3	2,1	31,9	14,9
Rest V01-Y89	Andre ytre årsaker til død	331	100,0	13,3	27,8	24,8	28,7	5,4

Tabell 18. Dødsfall av ulike årsaker, etter dødsmåned. 1996 Deaths from different causes, by month of death, 1996

ICD-10	Årsak Causes	Dødsmåned Month of death												
		Total Jan- uary	Jan- uar	Febr- uari	Mars Mar- ch	April April	Mai May	Juni June	Juli July	Aug- ust ember	Sept- ember	Okt- ober	Nov- ember	Des- ember
	I alt	43 919	4 238	3 665	3 776	3 559	3 622	3 441	3 517	3 408	3 401	3 594	3 509	4 189
A00-B99	Visse infeksjons- og parasittsykdommer	436	48	38	46	39	32	32	30	35	23	26	41	46
C00-C97	Ondartede svulster	10 643	892	842	919	811	957	902	859	824	948	875	862	952
F11-F16,	Avhengighet av medikamenter	191	15	22	11	19	12	20	11	12	15	13	19	22
F18-F19														
I20-I25	Ischemisk hjertesykdom	8 991	830	800	722	762	723	689	724	733	735	724	719	830
I60-I69	Karsykdommer i hjerner	5 220	508	438	454	409	394	401	434	406	383	449	407	537
J10-J11	Influensa	47	27	1	6	1	3	1	-	-	-	-	1	7
J12-J18	Lungebetennelse	2 086	270	163	215	188	150	162	143	147	125	169	153	201
J45-J46	Astma	292	35	24	33	24	19	19	24	29	20	14	21	30
Rest J40-J47	Rest andre kroniske sykdommer i nedre luftveier	1 256	140	132	121	111	114	92	73	88	76	107	86	116
K70,K73-K74	Kronisk leveresykdom	241	26	13	17	24	29	15	12	25	20	14	21	25
P00-P96	Visse tilstander med begynnelse i den perinatale periode	111	10	12	11	9	11	8	7	8	5	10	11	9
Q00-Q99	Medfødte misdannelser	163	11	11	20	15	6	18	15	16	8	15	11	17
R95	Krybbedøds syndrom (SIDS)	38	2	2	3	2	2	4	2	3	2	4	6	6
Rest A00-R99	Andre sykdommer	11 945	1 205	972	1 027	968	1 016	899	997	887	855	964	978	1 177
V01-V99,Y85	Transportulykker	362	26	28	21	17	33	28	41	35	34	44	27	28
W00-W19	Fallulykker	863	98	89	63	81	51	55	62	67	80	68	71	78
X00-X09	Brannulykker	67	4	7	9	3	2	5	4	3	3	4	7	16
X40-X49	Forgiftningsulykker	72	7	4	7	5	4	5	4	9	5	7	4	11
X60-X84,														
Y87.0	Selvmord	517	38	42	39	39	43	50	46	48	38	54	38	42
X85-Y09,														
Y87.1	Drap, overfall	47	6	3	5	4	4	5	2	4	2	5	3	4
Rest	Andre ytre årsaker til død	331	40	22	27	28	17	31	27	29	24	28	23	35

Tabell 19. Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. Fylke¹. 1996

Europeisk forkortet dødsårsaksliste <i>European short-list for causes of death</i>	I alt <i>Total</i>	Øst-fold	Akers-hus	Oslo	Hed-mark	Opp-land	Buske-rud
DØDSFALL I ALT DEATHS, TOTAL							
I alt Total	43 919	2 695	3 298	5 699	2 307	2 077	2 534
Menn Males	22 127	1 389	1 721	2 574	1 224	1 088	1 272
Kvinner Females	21 792	1 306	1 577	3 125	1 083	989	1 262
Dødsfall av sykdommer (A00-R99)							
<i>Deaths from diseases, total</i>							
I alt	41 660	2 566	3 109	5 398	2 194	1 984	2 401
Menn	20 786	1 306	1 609	2 430	1 153	1 027	1 191
Kvinner	20 874	1 260	1 500	2 968	1 041	957	1 210
01 INFEKSIØSE INKL. PARASITTÆRE SYKDOMMER (A00-B99)							
I alt	436	21	31	81	18	14	29
Menn	221	10	18	48	8	6	16
Kvinner	215	11	13	33	10	8	13
02 Tuberkulose (A15-A19,B90)							
I alt	57	8	1	11	3	1	3
Menn	33	4	1	6	3	-	2
Kvinner	24	4	-	5	-	1	1
03 Meningokokkinfeksjon (A39)							
I alt	13	1	-	2	-	1	1
Menn	6	1	-	-	-	-	1
Kvinner	7	-	-	2	-	1	-
04 AIDS (HIV-sykdom) (B20-B24)							
I alt	49	1	5	26	-	1	5
Menn	45	1	4	24	-	1	5
Kvinner	4	-	1	2	-	-	-
05 Akutt hepatitt og kronisk virushepatitt (B15-B19)							
I alt	4	1	-	1	-	-	1
Menn	3	1	-	1	-	-	-
Kvinner	1	-	-	-	-	-	1
06 SVULSTER (C00-D48)							
I alt	10 960	635	919	1 366	542	489	613
Menn	5 786	347	493	662	302	267	289
Kvinner	5 174	288	426	704	240	222	324
07 Ondartet svulster (C00-C97)							
I alt	10 643	619	892	1 326	529	477	596
Menn	5 637	334	478	643	293	265	282
Kvinner	5 006	285	414	683	236	212	314
08 Ondartet svulst i leppe, i munnhulen og svelget (C00-C14)							
I alt	153	13	19	26	11	5	8
Menn	98	8	15	12	7	4	7
Kvinner	55	5	4	14	4	1	1
09 Ondartet svulst i spiserøret (C15)							
I alt	125	3	12	16	12	7	3
Menn	91	2	10	12	7	5	3
Kvinner	34	1	2	4	5	2	-
10 Ondartet svulst i magesekken (C16)							
I alt	572	34	39	65	24	29	41
Menn	349	21	28	36	19	20	22
Kvinner	223	13	11	29	5	9	19

Deaths by sex and underlying cause of death. County¹, 1996

Vest-fold	Tele-mark	Aust-Agder	Vest-Agder	Roga-land	Horda-land	Sogn og fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nord-land	Troms	Finnmark	ICD-10
2 070	1 887	1 028	1 417	2 888	3 845	1 206	2 409	2 520	1 324	2 539	1 490	683	A00-Y89
979	981	539	710	1 487	1 920	657	1 186	1 265	669	1 291	801	371	
1 091	906	489	707	1 401	1 925	549	1 223	1 255	655	1 248	689	312	
1 954	1 814	975	1 351	2 740	3 660	1 137	2 282	2 384	1 277	2 402	1 393	636	A00-R99
917	933	505	670	1 397	1 810	614	1 109	1 188	637	1 211	738	338	
1 037	881	470	681	1 343	1 850	523	1 173	1 196	640	1 191	655	298	
11	16	6	6	37	43	19	29	18	14	27	11	5	A00-B99
4	6	3	3	19	25	11	10	8	7	13	5	1	
7	10	3	3	18	18	8	19	10	7	14	6	4	
1	-	-	-	6	6	1	4	4	3	3	-	2	A15-A19,
-	-	-	-	4	4	1	2	3	2	-	-	1	B90
1	-	-	-	2	2	-	2	1	1	3	-	1	
-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-	1	-	A39
-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	2	-	2	6	-	-	-	-	1	-	-	B20-B24
-	-	2	-	2	5	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
529	470	273	380	817	1 016	284	592	596	324	602	358	155	C00-D48
256	259	158	197	442	540	163	314	319	153	331	207	87	
273	211	115	183	375	476	121	278	277	171	271	151	68	
514	458	268	368	795	979	275	575	580	309	585	345	153	C00-C97
249	251	156	192	428	525	158	308	313	151	322	204	85	
265	207	112	176	367	454	117	267	267	158	263	141	68	
9	5	3	4	7	12	3	10	2	-	5	8	3	C00-C14
5	4	3	1	5	7	2	6	1	-	4	5	2	
4	1	-	3	2	5	1	4	1	-	1	3	1	
6	3	6	-	6	16	2	3	6	5	9	6	4	C15
3	3	5	-	2	14	1	2	4	4	5	5	4	
3	-	1	-	4	2	1	1	2	1	4	1	-	
16	24	12	15	42	65	18	30	29	18	36	24	11	C16
9	11	9	8	32	36	11	18	14	10	23	16	6	
7	13	3	7	10	29	7	12	15	8	13	8	5	

Tabell 19 (forts.). Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. Fylke. 1996

	Europeisk forkortet dødsårsaksliste <i>European short-list for causes of death</i>	I alt Total	Øst-fold	Akers-hus	Oslo	Hed-mark	Opp-land	Buske-rud
11	Ondartet svulst i tykktarm og overgang mellom sigmoideum og endetarm (C18-C19)							
	I alt	998	49	74	140	44	36	44
	Menn	442	21	36	63	21	12	22
	Kvinner	556	28	38	77	23	24	22
12	Ondartet svulst i endetarm og endetarmsåpningen og analkanal (C20-C21)							
	I alt	532	30	48	63	25	23	40
	Menn	288	13	27	30	18	13	17
	Kvinner	244	17	21	33	7	10	23
13	Ondartet svulst i lever og intrahepatiske galleganger (C22)							
	I alt	86	4	7	14	4	-	7
	Menn	51	2	4	8	3	-	4
	Kvinner	35	2	3	6	1	-	3
14	Ondartet svulst i bukspyttkjertel (C25)							
	I alt	585	35	43	74	40	26	31
	Menn	279	16	29	24	23	14	12
	Kvinner	306	19	14	50	17	12	19
15	Ondartet svulst i strupen, luftrør, bronkie og lunge (C32-C34)							
	I alt	1 723	110	144	226	71	61	91
	Menn	1 154	79	97	130	44	40	62
	Kvinner	569	31	47	96	27	21	29
16	Malignt melanom i hud (C43)							
	I alt	201	17	22	26	9	13	8
	Menn	114	10	7	20	3	10	2
	Kvinner	87	7	15	6	6	3	6
17	Ondartet svulst i bryst (C50)							
	I alt	830	49	90	117	34	39	47
	Menn	7	-	-	-	1	1	-
	Kvinner	823	49	90	117	33	38	47
18	Ondartet svulst i livmorhals (C53)							
	I alt	134	6	10	24	6	8	9
	Kvinner	134	6	10	24	6	8	9
19	Ondartet svulst i andre deler av livmoren (C54-C55)							
	I alt	120	8	9	16	8	4	10
	Kvinner	120	8	9	16	8	4	10
20	Ondartet svulst i eggstokk (C56)							
	I alt	331	19	31	39	18	21	27
	Kvinner	331	19	31	39	18	21	27
21	Ondartet svulst i blærehalskjertel (C61)							
	I alt	1 162	82	86	123	61	71	56
	Menn	1 162	82	86	123	61	71	56
22	Ondartet svulst i nyre, unntatt nyrebekken (C64)							
	I alt	244	10	21	28	13	14	13
	Menn	147	5	16	17	6	9	8
	Kvinner	97	5	5	11	7	5	5

Deaths by sex and underlying cause of death. County. 1996

Vest-fold	Tele-mark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	ICD-10
52	55	27	30	75	105	34	64	56	33	47	22	11	C18-C19
21	26	14	12	27	51	19	27	28	8	17	13	4	
31	29	13	18	48	54	15	37	28	25	30	9	7	
33	24	17	17	36	48	10	30	35	14	24	10	5	C20-C21
17	17	11	9	20	24	7	16	25	6	10	6	2	
16	7	6	8	16	24	3	14	10	8	14	4	3	
8	5	1	3	9	7	4	3	2	-	3	5	-	C22
3	4	1	3	4	4	2	2	2	-	2	3	-	
5	1	-	-	5	3	2	1	-	-	1	2	-	
20	23	15	18	37	53	8	37	39	11	32	29	14	C25
9	12	6	11	21	22	3	23	18	4	14	12	6	
11	11	9	7	16	31	5	14	21	7	18	17	8	
94	78	58	69	127	152	38	69	92	44	108	62	29	C32-C34
58	59	38	44	90	114	27	50	65	23	71	42	21	
36	19	20	25	37	38	11	19	27	21	37	20	8	
14	10	6	8	14	14	4	10	8	5	7	5	1	C43
9	8	4	3	9	5	1	5	5	2	7	4	-	
5	2	2	5	5	9	3	5	3	3	-	1	1	
40	37	17	33	62	63	15	46	46	18	44	26	7	C50
-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
40	37	16	32	62	62	14	45	46	18	44	26	7	
5	8	1	1	14	11	1	6	12	2	7	-	3	C53
5	8	1	1	14	11	1	6	12	2	7	-	3	
6	5	3	8	4	12	4	5	4	3	6	4	1	C54-C55
6	5	3	8	4	12	4	5	4	3	6	4	1	
14	13	8	10	39	29	5	22	11	6	10	5	4	C56
14	13	8	10	39	29	5	22	11	6	10	5	4	
40	44	27	42	84	110	44	75	55	38	69	39	16	C61
40	44	27	42	84	110	44	75	55	38	69	39	16	
7	11	8	8	20	14	9	15	16	8	14	11	4	C64
4	9	4	4	12	7	6	10	13	5	3	8	1	
3	2	4	4	8	7	3	5	3	3	11	3	3	

Tabell 19 (forts.). Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. Fylke. 1996

	Europeisk forkortet dødsårsaksliste <i>European short-list for causes of death</i>	I alt Total	Øst-fold	Akers-hus	Oslo	Hed-mark	Opp-land	Buske-rud
23	Ondartet svulst i urinblære (C67)							
	I alt	365	13	34	48	17	12	14
	Menn	252	10	25	30	14	11	7
	Kvinner	113	3	9	18	3	1	7
24	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev (C81-C96)							
	I alt	924	48	75	101	49	48	51
	Menn	493	21	42	54	26	24	24
	Kvinner	431	27	33	47	23	24	27
25	SYKDOMMER I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER, FORSTYRRELSER I IMMUNSYSTEMET(D50-D89)							
	I alt	107	12	9	14	8	3	9
	Menn	42	4	5	5	5	-	3
	Kvinner	65	8	4	9	3	3	6
26	INDRESEKRETORSKE SYKDOMMER, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTE SYKDOMMER (E00-E90)							
	I alt	675	34	49	77	40	26	48
	Menn	313	21	25	41	24	11	24
	Kvinner	362	13	24	36	16	15	24
27	Sukkersyke (E10-E14)							
	I alt	506	25	33	59	29	20	40
	Menn	249	14	17	31	17	11	21
	Kvinner	257	11	16	28	12	9	19
28	PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSMESSIGE FORSTYRRELSER (F00-F99)							
	I alt	1 121	66	79	220	58	50	47
	Menn	546	25	45	108	29	19	30
	Kvinner	575	41	34	112	29	31	17
29	Alkoholbetegnende psykoser/avhengighet av alkohol(F10)							
	I alt	214	8	18	35	10	9	7
	Menn	172	7	13	29	8	9	4
	Kvinner	42	1	5	6	2	-	3
30	Avhengighet av stoff eller medikamenter (F11-F16,F18-F19)							
	I alt	191	4	18	80	2	2	15
	Menn	165	3	17	63	2	2	14
	Kvinner	26	1	1	17	-	-	1
31	SYKDOMMER I NERVESYSTEMET OG SANSEORGANENE (G00-H95)							
	I alt	891	53	66	125	49	48	45
	Menn	438	25	33	53	24	27	23
	Kvinner	453	28	33	72	25	21	22
32	Hjernehinnebetennelse (meningitt) (G00-G03)							
	I alt	20	-	2	4	1	2	1
	Menn	10	-	2	2	-	1	1
	Kvinner	10	-	-	2	1	1	-

Deaths by sex and underlying cause of death. County. 1996

Vest-fold	Tele-mark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	ICD-10
26	14	7	14	24	36	8	25	21	9	27	10	6	C67
15	8	6	11	21	21	5	17	13	7	18	8	5	
11	6	1	3	3	15	3	8	8	2	9	2	1	
39	39	20	44	77	85	22	48	56	33	54	31	4	C81-C96
18	18	14	23	48	41	10	27	30	17	35	19	2	
21	21	6	21	29	44	12	21	26	16	19	12	2	
5	5	3	4	6	5	4	2	7	1	3	5	2	D50-D98
2	2	1	1	3	1	4	1	2	-	2	1	-	
3	3	2	3	3	4	-	1	5	1	1	4	2	
47	36	16	19	33	47	17	44	40	27	39	19	17	E00-E90
22	18	9	6	12	16	8	13	21	10	17	8	7	
25	18	7	13	21	31	9	31	19	17	22	11	10	
35	28	11	16	24	35	12	29	37	21	28	16	8	E10-E14
19	16	9	4	10	14	6	8	21	8	13	7	3	
16	12	2	12	14	21	6	21	16	13	15	9	5	
87	40	25	39	75	72	26	43	60	38	42	33	21	F00-F99
30	22	10	18	45	35	14	19	31	20	22	17	7	
57	18	15	21	30	37	12	24	29	18	20	16	14	
16	7	4	6	22	10	7	10	9	5	13	14	4	F10
10	7	3	6	18	8	6	7	8	4	10	12	3	
6	-	1	-	4	2	1	3	1	1	3	2	1	
12	5	2	5	11	15	-	1	10	-	3	4	2	F11-F16,
9	5	2	4	11	15	-	1	9	-	3	3	2	F18-F20
3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
42	50	25	27	50	71	26	58	53	31	28	33	11	G00-H95
17	30	14	12	20	46	11	29	27	10	18	14	5	
25	20	11	15	30	25	15	29	26	21	10	19	6	
2	-	-	1	4	-	2	-	-	-	-	1	-	G00-G03
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	
1	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	

Tabell 19 (forts.). Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. Fylke. 1996

Europeisk forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	I alt <i>Total</i>	Øst-fold	Akers-hus	Oslo	Hed-mark	Opp-land	Buske-rud
33 SYKDOMMER I SIRKULASJONS-ORGANENE (I00-I99)							
I alt	19 498	1 299	1 361	2 330	1 068	971	1 186
Menn	9 651	649	699	1 003	553	510	597
Kvinner	9 847	650	662	1 327	515	461	589
34 Ischemisk hjertesykdom (I20-I25)							
I alt	8 991	583	651	1 029	493	441	546
Menn	5 127	325	378	511	285	265	320
Kvinner	3 864	258	273	518	208	176	226
35 Andre hjertesykdommer (eksl. Reumatiske og hjertelekffsykdommer) (I30-I52)							
I alt	3 435	208	221	434	190	170	202
Menn	1 380	85	90	137	88	86	86
Kvinner	2 055	123	131	297	102	84	116
36 Karsykdommer i hjernen (I60-I69)							
I alt	5 220	375	358	624	286	256	350
Menn	2 180	164	162	237	128	106	140
Kvinner	3 040	211	196	387	158	150	210
37 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTS-ORGANENE (J00-J99)							
I alt	3 933	219	301	590	189	191	205
Menn	1 886	112	151	238	90	100	102
Kvinner	2 047	107	150	352	99	91	103
38 Influensa (J10-J11)							
I alt	47	2	6	3	1	4	2
Menn	14	-	3	1	-	-	2
Kvinner	33	2	3	2	1	4	-
39 Lungebetennelse (J12-J18)							
I alt	2 086	102	121	339	125	99	110
Menn	826	41	50	113	57	47	43
Kvinner	1 260	61	71	226	68	52	67
40 Kroniske sykdommer i nedre luftveier (J40-J47)							
I alt	1 548	100	156	217	56	78	80
Menn	903	62	89	109	31	51	48
Kvinner	645	38	67	108	25	27	32
41 Astma (J45-J46)							
I alt	292	20	20	27	10	27	25
Menn	145	11	9	11	4	17	11
Kvinner	147	9	11	16	6	10	14
42 SYKDOMMER I FORDØYELSESSORGANENE (K00-K93)							
I alt	1 310	93	104	205	70	43	80
Menn	649	51	47	105	46	16	44
Kvinner	661	42	57	100	24	27	36
43 Sår i magesekk, tolvfingertarm og magesår (K25-K28)							
I alt	255	21	12	38	18	7	20
Menn	132	10	5	21	15	4	8
Kvinner	123	11	7	17	3	3	12

Deaths by sex and underlying cause of death. County. 1996

Vest-fold	Tele-mark	Aust-Agder	Vest-Agder	Roga-land	Horda-land	Sogn og fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nord-land	Troms	Finn-mark	ICD-10
864	873	430	593	1 201	1 707	545	1 116	1 124	646	1 191	676	317	I00-I99
417	432	215	291	616	810	304	536	559	348	595	354	163	
447	441	215	302	585	897	241	580	565	298	596	322	154	
373	457	158	290	578	804	230	464	534	293	574	334	159	I20-I25
222	259	96	161	342	451	141	259	305	191	323	200	93	
151	198	62	129	236	353	89	205	229	102	251	134	66	
173	128	72	104	228	305	104	234	185	99	223	110	45	I30-I52
69	45	34	42	93	117	45	99	64	44	90	44	22	
104	83	38	62	135	188	59	135	121	55	133	66	23	
229	215	156	148	285	446	162	310	306	175	297	164	78	I60-I69
84	90	62	58	131	168	95	120	132	68	136	71	28	
145	125	94	90	154	278	67	190	174	107	161	93	50	
169	182	99	147	266	358	119	188	236	90	216	117	51	J00-J99
82	96	48	72	126	175	63	88	108	45	99	56	35	
87	86	51	75	140	183	56	100	128	45	117	61	16	
1	2	1	3	3	3	5	3	2	3	3	-	-	J10-J11
-	1	-	-	-	1	3	1	-	1	1	-	-	
1	1	1	3	3	2	2	2	2	2	2	-	-	
71	89	56	74	148	203	77	112	140	37	108	52	23	J12-J18
28	38	22	28	66	79	33	40	49	16	44	17	15	
43	51	34	46	82	124	44	72	91	21	64	35	8	
88	73	37	64	89	140	26	62	78	41	84	54	25	J40-J47
49	47	23	40	47	88	20	40	48	23	42	28	18	
39	26	14	24	42	52	6	22	30	18	42	26	7	
11	16	2	6	16	17	7	12	14	9	28	18	7	J45-J46
6	8	1	4	6	7	5	6	9	6	11	10	3	
5	8	1	2	10	10	2	6	5	3	17	8	4	
60	54	29	45	92	114	25	81	56	32	65	40	22	K00-K93
25	33	14	27	41	52	9	31	32	14	27	21	14	
35	21	15	18	51	62	16	50	24	18	38	19	8	
13	12	5	8	21	18	7	16	13	3	11	4	8	K25-K28
6	8	3	5	9	8	4	8	6	2	3	3	4	
7	4	2	3	12	10	3	8	7	1	8	1	4	

Tabell 19 (forts.). Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. Fylke. 1996

	Europeisk forkortet dødsårsaksliste <i>European short-list for causes of death</i>	I alt Total	Øst- fold	Akers- hus	Oslo	Hed- mark	Opp- land	Buske- rud
44	Kronisk leversykdom (K70,K73-K74)							
	I alt	241	22	24	50	9	4	16
	Menn	171	14	16	38	6	2	11
	Kvinner	70	8	8	12	3	2	5
45	SYKDOM I HUD OG UNDERHUD (L00-L99)							
	I alt	39	1	4	9	1	3	1
	Menn	19	1	1	4	-	2	1
	Kvinner	20	-	3	5	1	1	-
46	SYKDOM I SKJELETT-MUSKEL- SYSTEMET OG BINDEVEVET (M00-M99)							
	I alt	300	15	31	47	17	12	11
	Menn	95	8	15	15	6	2	5
	Kvinner	205	7	16	32	11	10	6
47	Leddgikt og artrose (M05-M06,M15-M19)							
	I alt	148	8	15	20	11	5	3
	Menn	36	3	6	2	3	-	-
	Kvinner	112	5	9	18	8	5	3
48	SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANER (N00-N99)							
	I alt	571	25	36	54	37	24	36
	Menn	285	14	18	22	21	12	20
	Kvinner	286	11	18	32	16	12	16
49	Sykdommer i nyre og urinleder (N00-N29)							
	I alt	359	15	20	28	24	16	22
	Menn	183	9	11	11	15	8	11
	Kvinner	176	6	9	17	9	8	11
50	SYKDOMMER I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG (O00-O99)							
	I alt	1	-	-	-	-	-	-
	Kvinner	1	-	-	-	-	-	-
51	VISSE TILSTANDER VED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN (P00-P96)							
	I alt	111	5	14	19	3	9	3
	Menn	71	2	8	13	3	5	3
	Kvinner	40	3	6	6	-	4	-
52	MEDFØDTE MISDANNELSER (Q00-Q99)							
	I alt	163	6	11	18	5	3	11
	Menn	90	4	6	8	3	2	7
	Kvinner	73	2	5	10	2	1	4
53	Medfødte misdannelser i nervesystemet (Q00-Q07)							
	I alt	14	1	1	3	-	-	-
	Menn	11	1	1	2	-	-	-
	Kvinner	3	-	-	1	-	-	-
54	Medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet (Q20-Q28)							
	I alt	61	2	2	9	1	-	6
	Menn	31	1	2	3	-	-	3
	Kvinner	30	1	-	6	1	-	3

Deaths by sex and underlying cause of death. County. 1996

Vest-fold	Tele-mark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	ICD-10
9	8	5	14	18	17	3	8	9	6	8	4	7	K70, K73-K74
8	7	4	10	11	12	2	6	7	4	4	3	6	-
1	1	1	4	7	5	1	2	2	2	4	1	1	-
3	-	2	1	-	1	2	1	3	1	2	3	1	L00-L99
2	-	2	-	-	1	-	1	2	-	-	2	-	-
1	-	-	1	-	-	2	-	1	1	2	1	1	-
24	14	12	7	23	19	11	11	15	6	12	10	3	M00-M99
6	3	5	5	5	6	1	4	2	1	4	2	-	-
18	11	7	2	18	13	10	7	13	5	8	8	3	-
8	8	6	5	10	14	8	4	6	3	8	5	1	M05-M06, M15-M19
2	1	2	4	2	2	1	2	1	-	4	1	-	-
6	7	4	1	8	12	7	2	5	3	4	4	1	-
22	29	12	23	33	58	16	30	45	21	44	20	6	N00-N99
10	14	6	13	16	27	8	15	24	10	21	11	3	-
12	15	6	10	17	31	8	15	21	11	23	9	3	-
16	15	10	19	25	35	11	20	31	13	26	9	4	N00-N29
8	6	4	12	13	15	7	9	17	7	12	6	2	-
8	9	6	7	12	20	4	11	14	6	14	3	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	1	2	3	9	7	1	4	6	3	13	3	5	P00-P96
1	-	1	2	6	6	1	2	4	1	7	2	4	-
-	1	1	1	3	1	-	2	2	2	6	1	1	-
8	2	5	6	8	20	6	12	9	4	18	7	4	Q00-Q99
6	2	2	3	4	13	3	6	6	1	9	4	1	-
2	-	3	3	4	7	3	6	3	3	9	3	3	-
-	1	1	1	-	1	-	-	2	-	1	1	1	Q00-Q07
-	1	1	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
7	1	2	2	2	9	1	4	4	2	6	1	-	Q20-Q28
5	1	1	1	-	5	-	3	2	1	3	-	-	-
2	-	1	1	2	4	1	1	2	1	3	1	-	-

Tabell 19 (forts.). Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. Fylke. 1996

	Europeisk forkortet dødsårsaksliste <i>European short-list for causes of death</i>	I alt <i>Total</i>	Øst-fold	Akers-hus	Oslo	Hed-mark	Opp-land	Buske-rud
55	SYMTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER (R00-R99)							
	I alt	1 544	82	94	243	89	98	77
	Menn	694	33	45	105	39	48	27
	Kvinner	850	49	49	138	50	50	50
56	Plutselig død av ukjent årsak hos spedbarn (krybbedøds syndrom) (R95)							
	I alt	38	1	2	5	1	3	3
	Menn	22	-	1	2	1	2	3
	Kvinner	16	1	1	3	-	1	-
57	Ukjente og uspesifiserte årsaker (R96-R99)							
	I alt	989	49	71	179	48	59	39
	Menn	539	28	38	93	28	31	18
	Kvinner	450	21	33	86	20	28	21
58	Voldsomme dødsfall i alt (V01-Y89) <i>Violent deaths, total</i>							
	I alt	2 259	129	189	301	113	93	133
	Menn	1 341	83	112	144	71	61	81
	Kvinner	918	46	77	157	42	32	52
59	ULYKKER (V01-X59,Y85-Y86)							
	I alt	1 674	99	129	225	89	69	98
	Menn	914	59	75	94	50	42	55
	Kvinner	760	40	54	131	39	27	43
60	Transportulykker (V01-V99,Y85)							
	I alt	370	27	24	32	26	20	24
	Menn	265	17	18	19	21	14	19
	Kvinner	105	10	6	13	5	6	5
61	Fallulykker (W00-W19)							
	I alt	863	44	75	122	43	32	50
	Menn	376	23	39	41	17	16	18
	Kvinner	487	21	36	81	26	16	32
62	Forgiftningsulykker (X40-X49)							
	I alt	72	5	5	14	5	3	5
	Menn	48	5	4	8	1	3	4
	Kvinner	24	-	1	6	4	-	1
63	SELVMORD (X60-X84,Y87.0)							
	I alt	517	26	54	66	23	23	29
	Menn	389	21	34	46	20	18	22
	Kvinner	128	5	20	20	3	5	7
64	DRAP, OVERFALL (X85-Y09,Y87.1)							
	I alt	47	2	2	7	-	1	3
	Menn	25	2	1	2	-	1	2
	Kvinner	22	-	1	5	-	-	1
65	SKADE DER DET ER UKJENT OM ÅRSAKEN ER ET UHELL ELLER ER PÅFØRT MED HENSIKT (Y10-Y34,Y87.2)							
	I alt	17	1	4	3	1	-	2
	Menn	10	-	2	2	1	-	2
	Kvinner	7	1	2	1	-	-	-

¹For 3 dødsfall var bostedsfylke ikke oppgitt

¹ Data not available on three deaths

Deaths by sex and underlying cause of death. County. 1996

Vest-fold	Tele-mark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	ICD-10
82	42	36	51	90	122	36	71	115	39	100	58	16	R00-R99
37	16	17	20	42	57	14	40	43	17	46	34	11	
45	26	19	31	48	65	22	31	72	22	54	24	5	
4	1	1	2	2	3	-	3	1	3	1	2	-	R95
2	1	1	1	1	1	-	2	-	1	1	2	-	
2	-	-	1	1	2	-	1	1	2	-	-	-	
46	23	24	25	57	95	23	42	64	16	65	47	14	R96-R99
28	9	13	15	35	46	11	27	29	10	38	29	10	
18	14	11	10	22	49	12	15	35	6	27	18	4	
116	73	53	66	148	185	69	127	136	47	137	97	47	V01-Y89
62	48	34	40	90	110	43	77	77	32	80	63	33	
54	25	19	26	58	75	26	50	59	15	57	34	14	
89	56	40	55	104	129	55	98	97	36	107	69	30	V01-X59,
39	33	23	33	59	71	34	57	51	22	55	42	20	Y85-Y86
50	23	17	22	45	58	21	41	46	14	52	27	10	
14	11	8	13	22	30	15	13	21	9	28	18	15	V01-V99,
8	9	8	9	16	20	12	9	12	4	25	13	12	Y85
6	2	-	4	6	10	3	4	9	5	3	5	3	
52	31	20	23	57	65	31	59	53	17	50	32	7	W00-W19
21	15	8	10	24	34	15	30	19	11	13	19	3	
31	16	12	13	33	31	16	29	34	6	37	13	4	
1	2	2	7	2	5	1	2	2	1	5	2	3	X40-X49
1	1	1	6	1	3	1	1	2	1	3	-	2	
-	1	1	1	1	2	-	1	-	-	2	2	1	
25	15	11	9	40	48	12	24	36	10	28	23	15	X60-X84,
22	13	10	6	29	35	8	17	25	9	24	18	12	Y87.0
3	2	1	3	11	13	4	7	11	1	4	5	3	
2	2	2	2	3	4	2	4	3	-	2	4	2	X85-Y09,
1	2	1	1	1	3	1	2	1	-	1	2	1	Y87.1
1	-	1	1	2	1	1	2	2	-	1	2	1	
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	Y10-Y34,
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	Y87.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabell 20. Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Oslo. 1996
Deaths by sex, age and underlying cause of death. Oslo. 1996

Europeisk forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	I alt Total	Alder Age									
		Under 1 år year	1-6 år years	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over and over
DØDSFALL I ALT DEATHS, TOTAL											
I alt Total	5 699	39	12	4	34	85	127	261	367	1 006	3 764
Menn Males	2 574	23	5	3	25	67	86	168	222	597	1 378
Kvinner Females	3 125	16	7	1	9	18	41	93	145	409	2 386
Dødsfall av sykdommer (A00-R99) Deaths from diseases, total											
I alt	5 398	39	9	4	22	55	108	226	344	976	3 615
Menn	2 430	23	4	3	16	44	73	145	210	578	1 334
Kvinner	2 968	16	5	1	6	11	35	81	134	398	2 281
01 INFEKSIØSE INKL. PARASITTÆRE SYKDOMMER (A00-B99)											
I alt	81	-	1	-	1	8	11	9	2	11	38
Menn	48	-	-	-	1	7	10	8	1	6	15
Kvinner	33	-	1	-	-	1	1	1	1	5	23
02 Tuberkulose (A15-A19,B90)											
I alt	11	-	-	-	-	-	2	-	-	2	7
Menn	6	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3
Kvinner	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
03 Meningokokkinfeksjon (A39)											
I alt	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Kvinner	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
04 AIDS (HIV-sykdom) (B20-B24)											
I alt	26	-	-	-	-	8	9	8	-	1	-
Menn	24	-	-	-	-	7	8	8	-	1	-
Kvinner	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
05 Akutt hepatitt og kronisk virushepatitt (B15-B19)											
I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Menn	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
06 SVULSTER (C00-D48)											
I alt	1 366	1	2	1	3	5	28	89	152	359	726
Menn	662	-	1	1	2	2	10	46	74	187	339
Kvinner	704	1	1	-	1	3	18	43	78	172	387
07 Ondartet svulster (C00-C97)											
I alt	1 326	-	2	1	3	5	28	88	151	353	695
Menn	643	-	1	1	2	2	10	45	74	183	325
Kvinner	683	-	1	-	1	3	18	43	77	170	370
08 Ondartet svulst i leppe, i munnhulen og svelget (C00-C14)											
I alt	26	-	-	-	1	1	1	4	6	4	9
Menn	12	-	-	-	-	1	-	3	2	2	4
Kvinner	14	-	-	-	1	-	1	1	4	2	5
09 Ondartet svulst i spiserøret (C15)											
I alt	16	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8
Menn	12	-	-	-	-	-	-	1	-	5	6
Kvinner	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
10 Ondartet svulst i magesekken (C16)											
I alt	65	-	-	-	-	-	1	4	12	11	37
Menn	36	-	-	-	-	-	-	4	8	9	15
Kvinner	29	-	-	-	-	-	1	-	4	2	22

Tabell 20(forts.) Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Oslo. 1996
Deaths by sex, age and underlying cause of death. Oslo. 1996

	European forkortet dødsårsaksliste <i>European short-list for causes of death</i>	Total year	Alder Age									
			Under 1 år year	1-6 år years	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over and over
11	Ondartet svulst i tykktarm og overgang mellom sigmaideum og endetarm (C18-C19)											
	I alt	140	-	-	-	-	-	-	12	12	39	77
	Menn	63	-	-	-	-	-	-	3	6	22	32
	Kvinner	77	-	-	-	-	-	-	9	6	17	45
12	Ondartet svulst i endetarmen og endetarmsåpningen og analkanal (C20-C21)											
	I alt	63	-	-	-	-	-	-	4	7	14	38
	Menn	30	-	-	-	-	-	-	3	3	10	14
	Kvinner	33	-	-	-	-	-	-	1	4	4	24
13	Ondartet svulst i lever og intrahepatiske galleganger (C22)											
	I alt	14	-	-	-	-	-	1	-	5	2	6
	Menn	8	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3
	Kvinner	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
14	Ondartet svulst i bukspyttkjertel (C25)											
	I alt	74	-	-	-	-	1	1	6	9	18	39
	Menn	24	-	-	-	-	1	1	4	2	4	12
	Kvinner	50	-	-	-	-	-	-	2	7	14	27
15	Ondartet svulst istrupen, lufrør, bronkie og lunge (32-C34)											
	I alt	226	-	-	-	-	-	4	13	44	80	85
	Menn	130	-	-	-	-	-	3	8	28	46	45
	Kvinner	96	-	-	-	-	-	1	5	16	34	40
16	Malignt melanom i hud (C43)											
	I alt	26	-	-	-	-	-	1	4	1	8	12
	Menn	20	-	-	-	-	-	1	4	-	5	10
	Kvinner	6	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
17	Ondartet svulst i bryst (C50)											
	I alt	117	-	-	-	-	-	5	12	15	23	62
	Kvinner	117	-	-	-	-	-	5	12	15	23	62
18	Ondartet svulst i livmorhals (C53)											
	I alt	24	-	-	-	-	2	4	3	1	7	7
	Kvinner	24	-	-	-	-	2	4	3	1	7	7
19	Ondartet svulst i andre deler av livmoren (C54-C55)											
	I alt	16	-	-	-	-	-	-	1	2	2	11
	Kvinner	16	-	-	-	-	-	-	1	2	2	11
20	Ondartet svulst i eggstokk (C56)											
	I alt	39	-	-	-	-	-	2	4	4	17	12
	Kvinner	39	-	-	-	-	-	2	4	4	17	12
21	Ondartet svulst i blærehalskjertel (C61)											
	I alt	123	-	-	-	-	-	-	-	9	21	93
	Menn	123	-	-	-	-	-	-	-	9	21	93
22	Ondartet svulst i nyre, unntatt nyrebekken (C64)											
	I alt	28	-	-	-	-	-	1	-	4	7	16
	Menn	17	-	-	-	-	-	1	-	2	5	9
	Kvinner	11	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7

Tabell 20(forts.) Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Oslo. 1996
Deaths by sex, age and underlying cause of death. Oslo. 1996

	Europeisk forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	Total	Alder Age									
			Under 1 år year	1-6 år years	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over and over
23	Ondartet svulst i urinblære (C67)											
	I alt	48	-	-	-	-	-	-	-	2	14	32
	Menn	30	-	-	-	-	-	-	-	2	8	20
	Kvinner	18	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12
24	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev (C81-C96)											
	I alt	101	-	-	-	2	-	2	9	4	30	54
	Menn	54	-	-	-	2	-	1	8	2	19	22
	Kvinner	47	-	-	-	-	-	1	1	2	11	32
25	SYKDOMMER I BLODET OG DE BLOD-DANNENDE ORGANER, FOR-STYRRELSE I IMMUNSYSTEMET (D50-D89)											
	I alt	14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	12
	Menn	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
	Kvinner	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
26	INDRESEKRETORSKE SYKDOMMER, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTE SYKDOMMER (E00-E90)											
	I alt	77	4	-	-	-	1	1	7	10	15	39
	Menn	41	2	-	-	-	1	-	4	6	11	17
	Kvinner	36	2	-	-	-	-	1	3	4	4	22
27	Sukkersyke (E10-E14)											
	I alt	59	-	-	-	-	1	1	5	9	12	31
	Menn	31	-	-	-	-	1	-	2	5	8	15
	Kvinner	28	-	-	-	-	-	1	3	4	4	16
28	PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDS-MESSIGE FORSTYRRELSE (F00-F99)											
	I alt	220	-	-	-	10	30	32	14	9	17	108
	Menn	108	-	-	-	7	24	25	10	7	15	20
	Kvinner	112	-	-	-	3	6	7	4	2	2	88
29	Alkoholbetingede psykoser/avhengighet av alkohol(F10)											
	I alt	35	-	-	-	-	-	-	6	7	14	8
	Menn	29	-	-	-	-	-	-	5	5	13	6
	Kvinner	6	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2
30	Avhengighet av stoff eller medikamenter (F11-F16,F18-F19)											
	I alt	80	-	-	-	10	30	32	6	2	-	-
	Menn	63	-	-	-	7	24	25	5	2	-	-
	Kvinner	17	-	-	-	3	6	7	1	-	-	-
31	SYKDOMMER I NERVESYSTEMET OG SANSEORGANENE (G00-H95)											
	I alt	125	1	1	-	1	1	6	10	8	26	71
	Menn	53	1	-	-	1	1	3	6	7	9	25
	Kvinner	72	-	1	-	-	-	3	4	1	17	46
32	Hjernehinnebetennelse (meningitt) (G00-G03)											
	I alt	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
	Menn	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Kvinner	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

Tabell 20(forts.) Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Oslo. 1996
Deaths by sex, age and underlying cause of death. Oslo. 1996

	Europeisk forkortet dødsårsaksliste <i>European short-list for causes of death</i>	Total I alt år year	Alder Age									
			Under 1 år years	1-6 år	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over and over
33	SYKDOMMER I SIRKULASJONS-ORGANENE (I00-I99)											
	I alt	2 330	-	-	2	3	4	14	48	101	373	1 785
	Menn	1 003	-	-	1	3	4	14	40	75	248	618
	Kvinner	1 327	-	-	1	-	-	-	8	26	125	1 167
34	Ischemisk hjertesykdom (I20-I25)											
	I alt	1 029	-	-	-	-	-	10	31	59	191	738
	Menn	511	-	-	-	-	-	10	28	44	135	294
	Kvinner	518	-	-	-	-	-	-	3	15	56	444
35	Andre hjertesykdommer (eksl. reumatiske og hjerteklaffsykdommer) (I30-I52)											
	I alt	434	-	-	1	2	3	3	4	13	49	359
	Menn	137	-	-	1	2	3	3	4	9	31	84
	Kvinner	297	-	-	-	-	-	-	-	4	18	275
36	Karsykdommer i hjernen (I60-I69)											
	I alt	624	-	-	1	1	1	11	16	73	521	
	Menn	237	-	-	1	1	1	7	13	42	172	
	Kvinner	387	-	-	-	-	-	4	3	31	349	
37	SYKDOMMER I ÄNDEDRETTTS-ORGANENE (J00-J99)											
	I alt	590	1	-	-	1	-	2	9	20	79	478
	Menn	238	1	-	-	-	-	1	3	11	46	176
	Kvinner	352	-	-	-	1	-	1	6	9	33	302
38	Influensa (J10-J11)											
	I alt	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	Menn	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Kvinner	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
39	Lungebetennelse (J12-J18)											
	I alt	339	-	-	-	-	-	-	5	3	17	314
	Menn	113	-	-	-	-	-	-	2	1	9	101
	Kvinner	226	-	-	-	-	-	-	3	2	8	213
40	Kroniske sykdommer i nedre luftveier (J40-J47)											
	I alt	217	-	-	-	-	-	1	4	16	55	141
	Menn	109	-	-	-	-	-	-	1	9	33	66
	Kvinner	108	-	-	-	-	-	1	3	7	22	75
41	Astma (J45-J46)											
	I alt	27	-	-	-	-	-	1	1	4	4	17
	Menn	11	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5
	Kvinner	16	-	-	-	-	-	1	-	2	1	12
42	SYKDOMMER I FORDØYELSESS-ORGANENE (K00-K93)											
	I alt	205	-	-	-	-	1	6	16	17	39	126
	Menn	105	-	-	-	-	1	6	12	11	24	51
	Kvinner	100	-	-	-	-	-	-	4	6	15	75
43	Sår i magesekk, tolvfingertarm og magesår (K25-K28)											
	I alt	38	-	-	-	-	-	-	-	1	4	33
	Menn	21	-	-	-	-	-	-	-	2	19	
	Kvinner	17	-	-	-	-	-	-	-	1	2	14

Tabell 20(forts.) Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Oslo. 1996
Deaths by sex, age and underlying cause of death. Oslo. 1996

	Europeisk forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	Total år year	Alder Age									
			Under 1 år years	1-6 år years	7-14 år years	15-24 år years	25-34 år years	35-44 år years	45-54 år years	55-64 år years	65-74 år years	75 år og over and over
44	Kronisk leversykdom (K70,K73-K74)											
	I alt	50	-	-	-	-	1	5	14	10	12	8
	Menn	38	-	-	-	-	1	5	11	8	9	4
	Kvinner	12	-	-	-	-	-	3	2	3	3	4
45	SYKDOM I HUD OG UNDERHUD (L00-L99)											
	I alt	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
	Menn	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	Kvinner	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
46	SYKDOM I SKJELETT-MUSKEL- SYSTEMET OG BINDEVET (M00-M99)											
	I alt	47	-	-	-	-	-	2	4	4	8	29
	Menn	15	-	-	-	-	-	-	3	2	3	7
	Kvinner	32	-	-	-	-	-	2	1	2	5	22
47	Leddgikt og artrose (M05-M06,M15-M19)											
	I alt	20	-	-	-	-	-	-	-	1	1	18
	Menn	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Kvinner	18	-	-	-	-	-	-	-	1	1	16
48	SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSSORGANER (N00-N99)											
	I alt	54	-	-	-	-	-	-	-	1	4	49
	Menn	22	-	-	-	-	-	-	-	1	3	18
	Kvinner	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31
49	Sykdommer i nyre og urinleder (N00-N29)											
	I alt	28	-	-	-	-	-	-	-	1	3	24
	Menn	11	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8
	Kvinner	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16
51	VISSE TILSTANDER VED BEGYNNELSE DEN PERINATALE PERIODEN (P00-P96)											
	I alt	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Menn	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kvinner	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	MEDFØDTE MISDANNELSER (Q00-Q99)											
	I alt	18	8	4	1	-	1	-	1	1	-	2
	Menn	8	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	Kvinner	10	4	2	-	-	-	-	1	1	-	2
53	Medfødte misdannelser i nervesystemet (Q00-Q07)											
	I alt	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Menn	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kvinner	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet (Q20-Q28)											
	I alt	9	5	1	-	-	1	-	-	1	-	1
	Menn	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Kvinner	6	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1
55	SYMTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER (R00-R99)											
	I alt	243	5	1	-	3	4	6	18	19	42	145
	Menn	105	2	1	-	2	3	4	12	15	25	41
	Kvinner	138	3	-	-	1	1	2	6	4	17	104

Tabell 20(forts.) Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Oslo. 1996
Deaths by sex, age and underlying cause of death. Oslo. 1996

Europeisk forkortet dødsårsaksliste <i>European short-list for causes of death</i>	I alt <i>Total</i>	Alder Age									
		Under 1 år <i>year</i>	1-6 år <i>years</i>	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over <i>and over</i>
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 Plutselig død av ukjent årsak hos spedbarn (krybbedøds syndrom) (R95)	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Menn	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kvinner	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57 Ukjente og uspesifiserte årsaker (R96-R99)	179	-	1	-	3	4	6	17	19	42	87
I alt	179	-	1	-	3	4	6	17	19	42	87
Menn	93	-	1	-	2	3	4	11	15	25	32
Kvinner	86	-	-	-	1	1	2	6	4	17	55
58 Voldsomme dødsfall i alt (V01-Y89) <i>Violent deaths, total</i>	301	-	3	-	12	30	19	35	23	30	149
I alt	301	-	3	-	12	30	19	35	23	30	149
Menn	144	-	1	-	9	23	13	23	12	19	44
Kvinner	157	-	2	-	3	7	6	12	11	11	105
59 ULYKKER (V01-X59,Y85-Y86)	225	-	3	-	4	14	10	17	16	22	139
I alt	225	-	3	-	4	14	10	17	16	22	139
Menn	94	-	1	-	2	10	9	13	9	12	38
Kvinner	131	-	2	-	2	4	1	4	7	10	101
60 Transportulykker (V01-V99,Y85)	32	-	3	-	3	7	-	2	3	10	4
I alt	32	-	3	-	3	7	-	2	3	10	4
Menn	19	-	1	-	1	6	-	2	2	6	1
Kvinner	13	-	2	-	2	1	-	-	1	4	3
61 Fallulykker (W00-W19)	122	-	-	-	-	2	5	-	5	5	105
I alt	122	-	-	-	-	2	5	-	5	5	105
Menn	41	-	-	-	-	2	5	-	2	2	30
Kvinner	81	-	-	-	-	-	-	-	3	3	75
62 Forgiftningsulykker (X40-X49)	14	-	-	-	-	-	-	9	3	1	1
I alt	14	-	-	-	-	-	-	9	3	1	1
Menn	8	-	-	-	-	-	-	6	1	1	-
Kvinner	6	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1
63 SELVMORD (X60-X84,Y87.0)	66	-	-	-	7	16	6	15	7	7	8
I alt	66	-	-	-	7	16	6	15	7	7	8
Menn	46	-	-	-	6	13	3	9	3	6	6
Kvinner	20	-	-	-	1	3	3	6	4	1	2
64 DRAP, OVERFALL (X85-Y09,Y87.1)	7	-	-	-	-	-	2	3	-	1	1
I alt	7	-	-	-	-	-	2	3	-	1	1
Menn	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Kvinner	5	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1
65 SKADE DER DET ER UKJENT OM ÅRSAKEN ER ET UHELL ELLER ER PÅFØRT MED HENSIKT (Y10-Y34,Y87.2)	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
I alt	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
Menn	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Kvinner	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tabell 21. Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Bergen. 1996
Deaths by sex, age and underlying cause of death. Bergen. 1996

Europeisk forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	I alt <i>Total</i>	Alder Age									
		Under 1 år <i>year</i>	1-6 år <i>years</i>	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over <i>and over</i>
DØDSFALL I ALT DEATHS, TOTAL											
I alt Total	2 110	12	4	-	12	21	40	85	148	373	1 415
Menn Males	992	9	2	-	8	16	28	53	94	221	561
Kvinner Females	1 118	3	2	-	4	5	12	32	54	152	854
Dødsfall av sykdommer (A00-R99)											
<i>Deaths from diseases, total</i>											
I alt	2 014	12	3	-	2	16	28	74	143	366	1 370
Menn	944	9	2	-	2	13	21	45	92	218	542
Kvinner	1 070	3	1	-	-	3	7	29	51	148	828
01 INFEKSIØSE INKL. PARASITTÆRE SYKDOMMER (A00-B99)											
I alt	20	-	1	-	-	2	2	1	-	3	11
Menn	9	-	1	-	-	1	2	1	-	-	4
Kvinner	11	-	-	-	-	1	-	-	-	3	7
02 Tuberkulose (A15-A19,B90)											
I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Kvinner	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
03 Meningokokkin ksjon (A39)											
I alt	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Menn	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kvinner	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
04 AIDS (HIV-sykdom) (B20-B24)											
I alt	5	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-
Menn	4	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
Kvinner	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
06 SVULSTER (C00-D48)											
I alt	575	-	-	-	-	3	9	36	70	161	296
Menn	295	-	-	-	-	2	5	16	34	96	142
Kvinner	280	-	-	-	-	1	4	20	36	65	154
07 Ondartet svulster (C00-C97)											
I alt	549	-	-	-	-	3	9	36	69	158	274
Menn	285	-	-	-	-	2	5	16	34	94	134
Kvinner	264	-	-	-	-	1	4	20	35	64	140
08 Ondartet svulst i leppe, i munnhulen og svelget (C00-C14)											
I alt	8	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Menn	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
Kvinner	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
09 Ondartet svulst i spiserøret (C15)											
I alt	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Menn	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
10 Ondartet svulst i magesekken (C16)											
I alt	27	-	-	-	-	-	1	-	3	12	11
Menn	15	-	-	-	-	-	1	-	2	7	5
Kvinner	12	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6
11 Ondartet svulst i tykktarm og overgang mellom sigmoideum og endetarm (C18-C19)											
I alt	54	-	-	-	-	-	-	4	6	7	37
Menn	24	-	-	-	-	-	-	2	2	3	17
Kvinner	30	-	-	-	-	-	-	2	4	4	20
12 Ondartet svulst i endetarmen og endetarmsåpningen og analkanal (C20-C21)											
I alt	27	-	-	-	-	-	1	2	4	4	16
Menn	11	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7
Kvinner	16	-	-	-	-	-	1	1	3	2	9

Tabell 21(forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Bergen. 1996
Deaths by sex, age and underlying cause of death. Bergen. 1996

Europeisk forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	I alt Total	Alder Age									
		Under 1 år year	1-6 år years	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over and over
13 Ondartet svulst i lever og intrahepatiske galleganger (C22)											
I alt	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Menn	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Kvinner	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
14 Ondartet svulst i bukspyttkjertel (C25)											
I alt	32	-	-	-	-	-	1	2	2	12	15
Menn	13	-	-	-	-	-	-	1	-	7	5
Kvinner	19	-	-	-	-	-	1	1	2	5	10
15 Ondartet svulst istrupen, luftrør, bronkie og lunge (32-C34)											
I alt	97	-	-	-	-	-	2	4	22	37	32
Menn	69	-	-	-	-	-	2	3	20	27	17
Kvinner	28	-	-	-	-	-	-	1	2	10	15
16 Malignt melanom i hud (C43)											
I alt	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Menn	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Kvinner	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17 Ondartet svulst i bryst (C50)											
I alt	37	-	-	-	-	-	1	5	8	9	14
Kvinner	37	-	-	-	-	-	1	5	8	9	14
18 Ondartet svulst i livmorhals (C53)											
I alt	7	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2
Kvinner	7	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2
19 Ondartet svulst i andre deler av livmoren (C54-C55)											
I alt	6	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
Kvinner	6	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
20 Ondartet svulst i eggstokk (C56)											
I alt	16	-	-	-	-	-	-	2	4	2	8
Kvinner	16	-	-	-	-	-	-	2	4	2	8
21 Ondartet svulst i blærehalskjertel (C61)											
I alt	50	-	-	-	-	-	-	-	4	10	36
Menn	50	-	-	-	-	-	-	-	4	10	36
22 Ondartet svulst i nyre, unntatt nyrebekken (C64)											
I alt	6	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
Menn	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
Kvinner	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
23 Ondartet svulst i urinblære (C67)											
I alt	25	-	-	-	-	-	-	1	-	4	20
Menn	13	-	-	-	-	-	-	1	-	4	8
Kvinner	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
24 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev (C81-C96)											
I alt	54	-	-	-	-	-	2	8	2	19	23
Menn	26	-	-	-	-	-	2	4	1	12	7
Kvinner	28	-	-	-	-	-	-	4	1	7	16
25 SYKDOMMER I BLODET OG DE BLOD-DANNENDE ORGANER, FORSTYRRELSE I IMMUNSYSTEMET (D50-D89)											
I alt	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Menn	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kvinner	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tabell 21(forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Bergen. 1996
Deaths by sex, age and underlying cause of death. Bergen. 1996

Europeisk forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	I alt Total	Alder Age									
		Under 1 år year	1-6 år years	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over and over
26 INDRESEKRETORISKE SYKDOMMER, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTE SYKDOMMER (E00-E90)											
I alt	22	-	1	-	-	1	-	1	2	4	13
Menn	6	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Kvinner	16	-	1	-	-	-	-	-	1	3	11
27 Sukkersyke (E10-E14)											
I alt	15	-	-	-	-	1	-	1	1	1	11
Menn	5	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2
Kvinner	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9
28 PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSMESSIGE FORSTYRRELSER (F00-F99)											
I alt	48	-	-	-	-	6	7	2	2	3	28
Menn	24	-	-	-	-	6	6	2	2	2	6
Kvinner	24	-	-	-	-	-	1	-	-	1	22
29 Alkoholbetingede psykoser/avhengighet av alkohol(F10)											
I alt	8	-	-	-	-	-	2	1	2	3	-
Menn	6	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-
Kvinner	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
30 Avhengighet av stoff eller medikamenter (F11-F16,F18-F19)											
I alt	12	-	-	-	-	6	5	1	-	-	-
Menn	12	-	-	-	-	6	5	1	-	-	-
31 SYKDOMMER I NERVESYSTEMET OG SANSEORGANENE (G00-H95)											
I alt	36	-	-	-	-	-	1	2	3	5	25
Menn	23	-	-	-	-	-	1	2	2	2	16
Kvinner	13	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9
33 SYKDOMMER I SIRKULASJONSORGANENE (I00-I99)											
I alt	897	-	-	-	-	2	8	18	48	145	676
Menn	397	-	-	-	-	2	6	13	40	94	242
Kvinner	500	-	-	-	-	-	2	5	8	51	434
34 Ischemisk hjertesykdom (I20-I25)											
I alt	403	-	-	-	-	-	3	11	35	86	268
Menn	222	-	-	-	-	-	3	9	32	62	116
Kvinner	181	-	-	-	-	-	-	2	3	24	152
35 Andre hjertesykdommer (eksl. reumatiske og hjerteklaffsykdommer) (I30-I52)											
I alt	157	-	-	-	-	-	1	2	3	2	14
Menn	53	-	-	-	-	-	1	1	2	1	10
Kvinner	104	-	-	-	-	-	1	1	1	4	97
36 Karsykdommer i hjernen (I60-I69)											
I alt	265	-	-	-	-	1	3	3	5	32	221
Menn	85	-	-	-	-	1	2	1	2	13	66
Kvinner	180	-	-	-	-	-	1	2	3	19	155
37 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSORGANENE (J00-J99)											
I alt	211	-	-	-	-	-	-	4	7	19	181
Menn	95	-	-	-	-	-	-	2	5	10	78
Kvinner	116	-	-	-	-	-	-	2	2	9	103

Tabell 21(forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Bergen. 1996

Deaths by sex, age and underlying cause of death. Bergen. 1996

Europeisk forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	Total	Alder Age									
		Under 1 år year	1-6 år years	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over and over
38 Influensa (J10-J11)											
I alt	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Menn	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kvinner	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
39 Lungebetennelse (J12-J18)											
I alt	112	-	-	-	-	-	-	2	2	3	105
Menn	34	-	-	-	-	-	-	2	1	1	30
Kvinner	78	-	-	-	-	-	-	-	1	2	75
40 Kroniske sykdommer i nedre luftveier (J40-J47)											
I alt	86	-	-	-	-	-	-	2	3	16	65
Menn	53	-	-	-	-	-	-	-	2	9	42
Kvinner	33	-	-	-	-	-	-	2	1	7	23
41 Astma (J45-J46)											
I alt	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Menn	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kvinner	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
42 SYKDOMMER I FORDØYELSESEN- ORGANENE (K00-K93)											
I alt	68	1	-	-	1	-	-	6	7	12	41
Menn	32	1	-	-	1	-	-	5	5	7	13
Kvinner	36	-	-	-	-	-	-	1	2	5	28
43 Sår i magesekk, tolvfingertarm og magesår (K25-K28)											
I alt	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
Menn	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Kvinner	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
44 Kronisk leveresykdom (K70,K73-K74)											
I alt	13	-	-	-	-	-	-	5	4	3	1
Menn	10	-	-	-	-	-	-	5	3	1	1
Kvinner	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
45 SYKDOM I HUD OG UNDERHUD (L00-L99)											
I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Menn	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
46 SYKDOM I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET (M00-M99)											
I alt	12	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7
Menn	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
Kvinner	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
47 Leddgikt og artrose (M05-M06,M15-M19)											
I alt	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
Menn	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Kvinner	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
48 SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANER (N00-N99)											
I alt	29	-	-	-	-	-	-	1	1	2	25
Menn	13	-	-	-	-	-	-	1	1	-	11
Kvinner	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14
49 Sykdommer i nyre og urinleder (N00-N29)											
I alt	17	-	-	-	-	-	-	1	1	1	14
Menn	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4
Kvinner	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10

Tabell 21(forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Bergen. 1996
Deaths by sex, age and underlying cause of death. Bergen. 1996

	Europeisk forkortet dødsårsaksliste European short-list for causes of death	Alder Age										
		Total	Under 1 år year	1-6 år years	7-14 år	15-24 år	25-34 år	35-44 år	45-54 år	55-64 år	65-74 år	75 år og over and over
51	VISSE TILSTANDER VED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN (P00-P96)											
	I alt	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Menn	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kvinner	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	MEDFØDTE MISDANNELSER (Q00-Q99)											
	I alt	10	6	1	-	1	1	1	-	-	-	-
	Menn	7	4	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	Kvinner	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
54	Medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet (Q20-Q28)											
	I alt	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	Menn	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Kvinner	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55	SYMTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER (R00-R99)											
	I alt	76	-	-	-	-	1	-	3	2	8	62
	Menn	33	-	-	-	-	1	-	2	1	4	25
	Kvinner	43	-	-	-	-	-	-	1	1	4	37
57	Ukjente og uspesifiserte årsaker (R96-R99)											
	I alt	64	-	-	-	-	1	-	3	2	7	51
	Menn	28	-	-	-	-	1	-	2	1	3	21
	Kvinner	36	-	-	-	-	-	-	1	1	4	30
58	Voldsomme dødsfall i alt (V01-Y89) <i>Violent deaths,</i>											
	I alt	96	-	1	-	10	5	12	11	5	7	45
	Menn	48	-	-	-	6	3	7	8	2	3	19
	Kvinner	48	-	1	-	4	2	5	3	3	4	26
59	ULYKKER (V01-X59)											
	I alt	64	-	1	-	2	2	2	6	5	5	41
	Menn	29	-	-	-	2	-	2	4	2	2	17
	Kvinner	35	-	1	-	-	2	-	2	3	3	24
60	Transportulykker (V01-V99,Y85)											
	I alt	11	-	1	-	1	2	1	1	1	3	1
	Menn	5	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1
	Kvinner	6	-	1	-	-	2	-	1	-	2	-
61	Fallulykker (W00-W19)											
	I alt	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33
	Menn	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15
	Kvinner	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
62	Forgiftningsulykker (X40-X49)											
	I alt	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	Menn	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
63	SELVMORD (X60-X84,Y87.0)											
	I alt	27	-	-	-	8	2	7	4	-	2	4
	Menn	16	-	-	-	4	2	4	3	-	1	2
	Kvinner	11	-	-	-	4	-	3	1	-	1	2
64	DRAP, OVERFALL (X85-Y09,Y87.1)											
	I alt	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	Menn	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
65	SKADE DER DET ER UKJENT OM ÅRSAKEN ER ET UHELL ELLER ER PÅFØRT MED HENSIKT (Y10-Y34,Y87.2)											
	I alt	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Kvinner	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-

Tabell 22. Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet etter årsaksgrupper. Kommune. Gjennomsnitt for årene 1992-1996. Pr. 100 000 innbyggere^{1 2 3} Standardized mortality rate from different causes of death. Sex.
Municipality. Per 100 000 population^{1 2 3}. Annual average 1992-1996

Kommunestørrelse, fylke og kommune Size of municipality, county and municipality	Døde- lighet, i alt Deaths, total	Konfidens- intervall 95%CI	Menn Males			Kvinner Females		
			I alt All causes	Hjerte/kar- sykdommer ICD-10 I00-I99	Kreft C00-C97	I alt All causes	Hjerte/kar- sykdommer ICD-10 I00-I99	Kreft C00-C97
Hele landet The whole country	891	886 ; 895	1170	522	286	688	291	179
Kommunestørrelse								
1 - 1 999	917	889 ; 946	1188	540	262	687	318	172
2 000 - 4 999	882	868 ; 895	1143	535	260	666	298	161
5 000 - 9 999	877	866 ; 889	1145	521	269	667	296	164
10 000 - 19 999	894	884 ; 903	1166	536	277	688	300	176
20 000 - 29 999	892	878 ; 905	1169	529	295	697	298	177
30 000 - 49 999	892	879 ; 904	1174	527	297	693	295	185
50 000 -	897	889 ; 905	1202	501	311	701	276	192
01 Østfold	946	926 ; 965	1252	585	305	727	325	186
0101 Halden	935	873 ; 997	1268	632	320	702	313	186
0104 Moss	967	907 ; 1027	1274	564	323	746	289	206
0105 Sarpsborg	932	889 ; 976	1225	568	305	729	327	185
0106 Fredrikstad	954	916 ; 992	1282	603	313	730	343	199
0111 Hvaler	1024	849 ; 1198	1425	503	(458)	715	276	(256)
0118 Aremark	735	494 ; 976	(884)	:	:	632	(384)	:
0119 Marker	958	782 ; 1135	1358	660	(341)	613	317	:
0121 Rømskog	(550)	(196) ; (904)	:	:	:	:	:	:
0122 Tørgstad	926	790 ; 1062	1150	609	:	734	363	:
0123 Spydeberg	886	760 ; 1013	1149	579	(271)	691	368	:
0124 Askim	995	915 ; 1076	1377	700	317	751	340	216
0125 Eidsberg	1115	1004 ; 1226	1400	589	302	889	404	155
0127 Skiptvet	824	669 ; 979	1119	547	(349)	606	(263)	:
0128 Rakkestad	943	825 ; 1061	1265	581	249	689	281	(126)
0135 Råde	878	775 ; 980	1245	586	(306)	648	290	(137)
0136 Rygge	884	811 ; 957	1087	516	292	744	324	182
0137 Våler	903	786 ; 1019	1311	(529)	(297)	694	(311)	:
0138 Hobøl	857	733 ; 981	1081	(521)	:	684	(238)	:
02 Akershus	873	862 ; 885	1136	495	282	683	282	180
0211 Vestby	834	769 ; 899	1082	506	275	636	302	(123)
0213 Ski	925	878 ; 971	1263	541	293	686	262	146
0214 Ås	1051	976 ; 1125	1335	619	268	816	315	161
0215 Frogner	928	852 ; 1003	1142	488	321	762	295	202
0216 Nesodden	967	906 ; 1029	1142	483	281	829	347	232
0217 Oppegård	821	777 ; 866	1101	424	334	611	205	160
0219 Bærum	769	744 ; 794	1005	419	283	608	247	184
0220 Asker	802	768 ; 835	1020	436	258	636	250	183
0221 Aurskog-Høland	914	828 ; 1000	1121	486	261	754	307	206
0226 Sørum	878	805 ; 951	1160	541	243	657	255	170
0227 Fet	939	856 ; 1022	1109	503	(211)	804	402	(161)
0228 Rælingen	928	873 ; 983	1108	501	257	770	355	185
0229 Enebakk	908	833 ; 983	1153	445	376	689	299	(184)
0230 Lørenskog	848	808 ; 888	1093	437	306	672	311	168
0231 Skedsmo	920	876 ; 964	1238	526	335	711	288	185
0233 Nittedal	1024	969 ; 1078	1482	711	324	741	257	242
0234 Gjerdrum	823	703 ; 944	1125	(472)	:	613	(182)	:
0235 Ullensaker	1002	942 ; 1062	1363	646	259	768	316	172
0236 Nes	984	913 ; 1056	1187	559	257	810	394	186
0237 Eidsvoll	997	923 ; 1071	1318	654	259	766	349	166
0238 Nannestad	870	777 ; 963	1191	502	245	672	292	(180)
0239 Hurdal	864	679 ; 1049	1056	(436)	:	747	(338)	:

¹ Standardbefolking er summen av menn og kvinner i 5-årige aldersgrupper i hele landet 1. januar 1981

² Rate er erstattet med kolon hvis færre enn 20 dødsfall i perioden. Rate er satt i parentes hvis antall dødsfall er 20-39

³ Se merknad til tabellen i tekstdel 4.1.

¹ The standard population is the total population by 5-years groups per 1. January 1981

² A mortality rate less than 20 deaths are replaced by colons. Rate based on 20-39 deaths are quoted within brackets.

³ See remarks to the table in text (part 4.1).

Tabell 22 (forts.) Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet etter årsaksgrupper. Kommune. Gjennomsnitt for årene 1992-1996. Pr. 100 000 innbyggere^{1 2 3} Standardized mortality rate from different causes of death. Sex. Municipality. Per 100 000 population^{1 2 3}. Annual average 1992-1996

Kommunestørrelse, fylke og kommune Size of municipality, county and municipality	Dødelighet, i alt Deaths, total	Konfidens- intervall 95%CI	Menn Males			Kvinner Females		
			I alt All causes	Hjerte/kar- sykdommer ICD-10 100-199	Kreft ICD-10 C00-C97	I alt All causes	Hjerte/kar- sykdommer ICD-10 100-199	Kreft ICD-10 C00-C97
			951	937 ; 965	1281	508	320	747
03 Oslo								
Distrikt i Oslo:								
01 Indre vest	892	852 ; 932	1227	438	317	706	227	210
02 Indre øst	1257	1217 ; 1297	1744	644	402	959	330	255
03 Ytre vest	785	750 ; 820	988	384	274	650	218	161
04 Ytre øst	1025	998 ; 1052	1363	552	336	813	295	202
05 Nord	816	762 ; 869	1079	460	270	657	224	204
06 Syd	902	875 ; 929	1223	533	301	703	260	207
Bydeler i Oslo:								
01 Bygdøy-Frogner	714	650 ; 779	1020	368	298	543	167	196
02 Uranienborg-Majorstua	939	864 ; 1015	1287	432	349	758	234	215
03 St.Hanshaugen-Ullenvål	935	869 ; 1000	1273	489	285	747	263	205
04 Sagene-Torshov	1143	1071 ; 1214	1612	624	374	859	286	245
05 Grünerløkka-Sofienberg	1346	1277 ; 1415	1869	680	397	1052	360	281
06 Gamle Oslo	1408	1339 ; 1476	1921	667	471	1079	384	258
07 Ekeberg-Bekkelaget	942	862 ; 1023	1227	550	301	744	290	204
08 Nordstrand	796	727 ; 865	1005	463	206	648	233	195
09 Søndre Nordstrand	849	819 ; 879	1251	562	298	568	250	162
10 Lambertseter	901	793 ; 1009	1337	583	350	670	259	182
11 Bøler	1071	985 ; 1157	1334	553	336	886	321	243
12 Manglerud	846	755 ; 936	1277	549	307	595	209	211
13 Østensjø	941	858 ; 1025	1285	538	344	776	262	239
14 Helsfyr-Sinsen	1031	942 ; 1120	1398	562	321	821	293	247
15 Hellerud	831	764 ; 899	1274	521	310	571	224	144
16 Furuset	1212	1163 ; 1262	1424	605	333	1055	374	197
17 Stovner	1121	1063 ; 1180	1471	560	414	894	303	235
18 Romsås	1396	1285 ; 1506	1617	547	473	1240	470	246
19 Grorud	999	921 ; 1077	1377	491	374	791	304	179
20 Bjerke	951	886 ; 1016	1315	571	297	727	269	208
21 Grefsen-Kjelsås	838	762 ; 913	1088	487	264	683	235	207
22 Sogn	785	705 ; 864	1042	424	272	643	213	204
23 Vinderen	665	611 ; 719	886	331	274	506	154	159
24 Røa	736	677 ; 795	933	391	253	615	191	172
25 Ullern	874	810 ; 938	1101	413	295	723	258	154
04 Hedmark								
0402 Kongsvinger	949	926 ; 972	1211	547	276	739	325	170
0403 Hamar	1061	988 ; 1135	1394	688	330	803	391	172
0412 Ringsaker	861	803 ; 919	1102	494	298	711	285	194
0415 Løten	945	892 ; 997	1219	578	272	719	373	151
0417 Stange	892	782 ; 1002	1089	481	276	729	374	(108)
0418 Nord-Odal	947	877 ; 1016	1138	519	250	780	299	174
0419 Sør-Odal	1125	974 ; 1276	1451	666	(236)	856	430	(208)
0420 Eidskog	1030	907 ; 1153	1380	651	287	726	330	165
0423 Grue	1008	876 ; 1140	1233	493	303	793	321	(149)
0425 Åsnes	1033	878 ; 1187	1366	561	271	745	341	(173)
0426 Våler	992	873 ; 1111	1260	566	305	753	335	167
0427 Elverum	1029	869 ; 1189	1185	506	316	857	297	(211)
0428 Trysil	916	847 ; 985	1180	524	235	710	279	149
0429 Åmot	844	722 ; 966	1042	432	258	677	321	165
0430 Stor-Elvdal	1025	851 ; 1198	1379	626	350	748	360	(183)
0432 Rendalen	1050	844 ; 1257	1414	664	(299)	802	325	(235)
0434 Engerdal	992	741 ; 1244	1289	520	(289)	750	258	(234)
0436 Tolga	934	695 ; 1173	1208	(459)	:	785	:	:
0437 Tynset	903	640 ; 1166	1104	(424)	:	751	(289)	:
0438 Alvdal	744	620 ; 868	868	378	(194)	632	299	(126)
0439 Folldal	992	772 ; 1211	1312	554	:	762	356	:
0441 Os	905	658 ; 1152	1162	598	:	723	(313)	:
	838	616 ; 1059	1159	(638)	:	606	(189)	:

¹ Standardbefolking er summen av menn og kvinner i 5-årige aldersgrupper i hele landet 1. januar 1981

² Rate er erstattet med kolon hvis færre enn 20 dødsfall i perioden. Rate er satt i parentes hvis antall dødsfall er 20-39

³ Se merknad til tabellen i tekstdel 4.1.

¹The standard population is the total population by 5-years groups per 1. January 1981

²A mortality rate less than 20 deaths are replaced by colons. Rate based on 20-39 deaths are quoted within brackets.

³See remarks to the table in text (part 4.1).

Tabell 22 (forts.) Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet etter årsaksgrupper. Kommune. Gjennomsnitt for årene 1992-1996. Pr. 100 000 innbyggere^{1 2 3} Standardized mortality rate from different causes of death. Sex. Municipality. Per 100 000 population^{1 2 3}. Annual average 1992-1996

Kommunestørrelse, fylke og kommune Size of municipality, county and municipality	Dødelighet, i alt Deaths, total	Konfidens- intervall 95%CI	Menn Males			Kvinner Females		
			I alt All causes	Hjerte/kar- sykdommer ICD-10 I00-I99	Kreft ICD-10 C00-C97	I alt All causes	Hjerte/kar- sykdommer ICD-10 I00-I99	Kreft ICD-10 C00-C97
05 Oppland	903	881 ; 926	1150	528	254	709	309	171
0501 Lillehammer	806	751 ; 861	1039	467	216	648	252	163
0502 Gjøvik	947	889 ; 1005	1226	570	265	750	321	176
0511 Dovre	882	713 ; 1051	957	473	:	833	448	:
0512 Lesja	866	660 ; 1071	1044	588	:	711	337	:
0513 Skjåk	943	742 ; 1144	1274	575	:	717	395	:
0514 Lom	918	722 ; 1113	1068	499	:	760	(351)	:
0515 Vågå	747	599 ; 895	883	390	(184)	628	258	:
0516 Nord-Fron	926	804 ; 1047	1152	469	274	731	299	(154)
0517 Sel	980	862 ; 1099	1182	525	256	803	345	(206)
0519 Sør-Fron	991	808 ; 1174	1179	535	(274)	805	360	(196)
0520 Ringebu	934	777 ; 1090	1225	538	274	660	299	(116)
0521 Øyer	891	760 ; 1022	1159	660	(258)	680	402	(157)
0522 Gausdal	891	770 ; 1012	1052	435	276	756	319	(172)
0528 Østre Toten	881	799 ; 962	1140	521	243	676	279	173
0529 Vestre Toten	909	828 ; 989	1239	576	276	675	277	197
0532 Jevnaker	1015	878 ; 1152	1239	516	317	830	396	(181)
0533 Lunner	945	850 ; 1040	1275	633	291	687	309	187
0534 Gran	968	877 ; 1059	1213	523	259	791	316	211
0536 Søndre Land	907	781 ; 1033	1197	558	320	717	331	(158)
0538 Nordre Land	873	757 ; 989	1177	516	268	644	314	172
0540 Sør-Aurdal	896	710 ; 1083	1222	622	(264)	624	275	(156)
0541 Etnedal	1023	723 ; 1323	1295	(496)	(361)	716	(266)	:
0542 Nord-Aurdal	840	720 ; 960	996	498	205	704	334	(143)
0543 Vestre Slidre	929	735 ; 1123	1217	582	(283)	659	(216)	:
0544 Øystre Slidre	957	779 ; 1135	1296	567	(298)	678	296	:
0545 Vang	769	533 ; 1005	960	(450)	:	620	(354)	:
06 Buskerud	907	888 ; 927	1186	556	274	706	314	177
0602 Drammen	923	881 ; 964	1275	580	299	713	300	182
0604 Kongsberg	859	799 ; 919	1132	573	277	664	333	148
0605 Ringerike	909	851 ; 966	1162	519	288	729	300	183
0612 Hole	886	755 ; 1017	1029	510	:	786	326	(214)
0615 Flå	790	462 ; 1119	751	:	:	825	(359)	:
0616 Nes	847	682 ; 1012	1135	506	:	622	(249)	:
0617 Gol	635	513 ; 758	790	387	:	511	(191)	(185)
0618 Hemsedal	811	584 ; 1038	840	:	:	763	:	:
0619 Ål	832	692 ; 972	1017	469	(203)	668	281	(185)
0620 Hol	891	750 ; 1031	1057	480	(255)	730	367	(146)
0621 Sigdal	1020	839 ; 1202	1380	713	(287)	712	327	(134)
0622 Krødsherad	981	764 ; 1198	1263	596	:	734	(300)	:
0623 Modum	929	837 ; 1020	1201	615	255	723	342	156
0624 Øvre Eiker	948	871 ; 1025	1263	657	290	710	327	199
0625 Nedre Eiker	960	899 ; 1021	1273	622	286	752	339	188
0626 Lier	875	819 ; 932	1172	500	247	655	302	171
0627 Røyken	967	905 ; 1028	1176	494	301	778	385	171
0628 Hurum	1060	948 ; 1172	1436	649	406	783	355	233
0631 Flesberg	837	644 ; 1031	1195	602	:	519	(300)	:
0632 Rollag	709	456 ; 962	693	(368)	:	691	(336)	:
0633 Nore og Uvdal	923	715 ; 1130	1169	600	(250)	702	336	:

¹ Standardbefolking er summen av menn og kvinner i 5-årige aldersgrupper i hele landet 1. januar 1981

² Rate er erstattet med kolon hvis færre enn 20 dødsfall i perioden. Rate er satt i parentes hvis antall dødsfall er 20-39

³ Se merknad til tabellen i tekstdel 4.1.

¹ The standard population is the total population by 5-years groups per 1. January 1981

² A mortality rate less than 20 deaths are replaced by colons. Rate based on 20-39 deaths are quoted within brackets.

³ See remarks to the table in text (part 4.1).

Tabell 22 (forts.) Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet etter årsaksgrupper. Kommune. Gjennomsnitt for årene 1992-1996. Pr. 100 000 innbyggere^{1 2 3} Standardized mortality rate from different causes of death. Sex. Municipality. Per 100 000 population^{1 2 3}. Annual average 1992-1996

Kommunestørrelse, fylke og kommune Size of municipality, county and municipality	Dødelighet, i alt Deaths, total	Konfidens- intervall 95%CI	Menn Males			Kvinner Females		
			I alt All causes	Hjerte/kar- sykdommer ICD-10 I00-I99	Kreft ICD-10 C00-C97	I alt All causes	Hjerte/kar- sykdommer ICD-10 I00-I99	Kreft ICD-10 C00-C97
07 Vestfold	898	878 ; 918	1185	515	300	695	281	186
0701 Borre	941	880 ; 1002	1302	527	341	705	267	198
0702 Holmestrand	889	798 ; 981	1186	593	266	675	269	198
0704 Tønsberg	906	853 ; 958	1190	546	288	711	287	187
0706 Sandefjord	874	826 ; 921	1172	493	327	659	273	176
0709 Larvik	903	856 ; 950	1182	515	303	705	284	194
0711 Svelvik	1005	892 ; 1118	1328	649	(224)	802	358	(196)
0713 Sande	871	772 ; 970	1127	540	(182)	673	253	(153)
0714 Hof	926	748 ; 1104	1341	(565)	:	669	(298)	:
0716 Våle	887	750 ; 1024	1129	482	(378)	706	(285)	(181)
0718 Ramnes	957	819 ; 1095	1376	672	(373)	615	(310)	:
0719 Andebu	755	637 ; 874	950	(380)	(225)	584	(251)	(176)
0720 Stokke	914	832 ; 996	1144	482	287	766	291	233
0722 Nøtterøy	878	812 ; 944	1139	460	310	691	282	178
0723 Tjøme	804	660 ; 948	1089	414	(389)	603	204	(146)
0728 Lardal	1051	833 ; 1270	1298	(532)	:	835	(381)	:
08 Telemark	910	886 ; 933	1196	552	285	698	311	178
0805 Porsgrunn	906	853 ; 958	1148	507	307	733	309	214
0806 Skien	895	853 ; 936	1188	572	272	697	307	181
0807 Notodden	904	813 ; 995	1227	547	314	663	345	155
0811 Siljan	758	602 ; 914	(778)	:	:	752	(441)	:
0814 Bamble	887	821 ; 954	1151	559	269	674	361	174
0815 Kragerø	968	872 ; 1063	1261	628	265	774	351	173
0817 Drangedal	898	743 ; 1053	1324	632	323	592	349	:
0819 Nome	960	827 ; 1093	1300	552	322	707	337	(119)
0821 Bø	816	685 ; 947	1140	634	(209)	564	235	(149)
0822 Sauherad	894	747 ; 1042	1063	495	:	768	241	(234)
0826 Tinn	1065	929 ; 1201	1419	600	353	808	309	207
0827 Hjartdal	902	630 ; 1174	1140	647	:	715	(315)	:
0828 Seljord	916	733 ; 1099	1203	450	(239)	659	333	:
0829 Kviteseid	841	639 ; 1044	1238	549	(291)	533	218	:
0830 Nissedal	904	648 ; 1160	1390	(700)	:	(506)	:	:
0831 Fyresdal	1120	815 ; 1425	1474	(635)	:	854	(379)	:
0833 Tokke	899	691 ; 1107	1213	539	(353)	594	318	:
0834 Vinje	863	706 ; 1021	1168	418	363	600	242	(155)
09 Aust-Agder	886	858 ; 915	1160	495	294	676	275	172
0901 Risør	857	744 ; 970	1096	497	247	646	265	(160)
0904 Grimstad	886	821 ; 951	1196	567	283	655	254	174
0906 Arendal	863	819 ; 907	1145	475	305	670	277	176
0911 Gjerstad	763	574 ; 952	959	453	:	579	(222)	:
0912 Vegårshei	878	657 ; 1099	994	(346)	:	754	(320)	:
0914 Tvedstrand	955	820 ; 1089	1324	569	362	726	361	(112)
0919 Froland	931	794 ; 1067	1190	480	(334)	689	311	(185)
0926 Lillesand	882	789 ; 975	1195	498	301	653	254	188
0928 Birkenes	817	680 ; 954	1041	467	(209)	614	(225)	(158)
0929 Åmli	1117	865 ; 1369	1511	(512)	(400)	796	(265)	:
0935 Iveland	1044	792 ; 1296	(1213)	:	:	(865)	:	:
0937 Evje og Hornnes	935	771 ; 1099	1054	(338)	(237)	820	(276)	(222)
0938 Bygland	1020	725 ; 1316	1523	(797)	:	574	:	:
0940 Valle	999	711 ; 1287	1393	(559)	:	671	(245)	:
0941 Bykle	1227	887 ; 1567	(1786)	:	:	:	:	:

¹ Standardbefolking er summen av menn og kvinner i 5-årlige aldersgrupper i hele landet 1. januar 1981

² Rate er erstattet med kolon hvis færre enn 20 dødsfall i perioden. Rate er satt i parentes hvis antall dødsfall er 20-39

³ Se merknad til tabellen i tekstdel 4.1.

¹ The standard population is the total population by 5-years groups per 1. January 1981

² A mortality rate less than 20 deaths are replaced by colons. Rate based on 20-39 deaths are quoted within brackets.

³ See remarks to the table in text (part 4.1).

Tabell 22 (forts.) Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet etter årsaksgrupper. Kommune. Gjennomsnitt for årene 1992-1996. Pr. 100 000 innbyggere^{1 2 3} Standardized mortality rate from different causes of death. Sex. Municipality. Per 100 000 population^{1 2 3}. Annual average 1992-1996

Kommunestørrelse, fylke og kommune Size of municipality, county and municipality	Dødelighet, i alt Deaths, total	Konfidens- intervall 95%CI	Menn Males			Kvinner Females		
			I alt All causes	Hjerte/kar- sykdommer ICD-10 I00-I99	Kreft ICD-10 C00-C97	I alt All causes	Hjerte/kar- sykdommer ICD-10 I00-I99	Kreft ICD-10 C00-C97
10 Vest-Agder	862	840 ; 884	1158	476	304	651	265	176
1001 Kristiansand	858	826 ; 890	1167	461	331	659	265	174
1002 Mandal	838	761 ; 915	1124	499	273	646	259	188
1003 Farsund	905	810 ; 1000	1147	472	366	708	272	212
1004 Flekkefjord	808	704 ; 911	1072	499	220	606	252	156
1014 Vennesla	948	873 ; 1024	1211	490	276	740	295	218
1017 Songdalen	857	754 ; 959	1118	449	(241)	657	(237)	(191)
1018 Søgne	766	689 ; 843	1074	429	(271)	548	221	(145)
1021 Marnardal	955	761 ; 1150	1314	(484)	(399)	648	(256)	:
1026 Åseral	952	542 ; 1363	1365	:	:	(572)	(293)	:
1027 Audnedal	816	557 ; 1075	1127	:	:	677	(332)	:
1029 Lindesnes	851	711 ; 990	1095	447	(326)	672	247	(211)
1032 Lyngdal	852	748 ; 956	1141	447	314	639	304	(127)
1034 Hægebostad	954	698 ; 1211	1216	(771)	:	748	(272)	:
1037 Kvinesdal	901	779 ; 1024	1351	572	385	558	264	(130)
1046 Sirdal	775	547 ; 1002	1299	(609)	:	(447)	:	:
11 Rogaland	840	827 ; 854	1108	485	300	645	260	186
1101 Eigersund	865	789 ; 942	1120	513	275	669	296	184
1102 Sandnes	822	789 ; 855	1087	442	329	628	236	198
1103 Stavanger	876	850 ; 902	1154	486	315	686	271	194
1106 Haugesund	941	885 ; 996	1294	589	347	714	305	185
1111 Sokndal	853	696 ; 1009	1109	665	(257)	646	263	:
1112 Lund	751	592 ; 909	1100	(516)	:	557	(191)	:
1114 Bjerkreim	627	466 ; 788	772	(345)	:	501	:	:
1119 Hå	775	711 ; 839	1022	491	272	582	290	126
1120 Klepp	842	782 ; 903	1116	510	276	619	231	166
1121 Time	745	683 ; 806	931	365	263	582	248	161
1122 Gjesdal	746	672 ; 820	980	488	(266)	613	276	(143)
1124 Sola	815	768 ; 861	1116	516	365	580	240	175
1127 Randaberg	821	754 ; 887	1040	509	:	700	(255)	(219)
1129 Forsand	653	356 ; 950	(835)	:	:	(504)	:	:
1130 Strand	705	630 ; 780	907	358	267	525	220	(157)
1133 Hjelmeland	657	487 ; 828	897	(373)	:	425	(174)	:
1134 Suldal	763	615 ; 911	988	448	(237)	566	244	(166)
1135 Sauda	841	712 ; 970	1205	502	311	582	182	229
1141 Finnøy	811	632 ; 989	1164	571	(270)	549	(184)	:
1142 Rennesøy	831	670 ; 991	1127	(491)	:	647	(224)	:
1144 Kvitsøy	(1175)	(727) ; (1622)	:	:	:	:	:	:
1145 Bokn	979	632 ; 1326	(1293)	:	:	(768)	:	:
1146 Tysvær	779	694 ; 863	970	406	(244)	612	294	(171)
1149 Karmøy	903	862 ; 944	1182	522	328	700	280	220
1151 Utsira	:	:	:	:	:	:	:	:
1154 Vindafjord	653	531 ; 775	979	461	(212)	372	179	(118)
12 Hordaland	808	795 ; 821	1082	478	286	615	254	176
1201 Bergen	823	805 ; 841	1113	465	300	635	257	183
1211 Etne	883	728 ; 1038	1072	561	(206)	723	330	:
1214 Ølen	735	581 ; 889	1018	506	:	535	(195)	:
1216 Sveio	812	690 ; 933	1177	696	(196)	528	260	(176)
1219 Bømlo	869	788 ; 950	1099	590	242	692	324	213
1221 Stord	820	766 ; 875	1140	518	309	613	290	181
1222 Fitjar	958	809 ; 1106	1215	(651)	:	781	(359)	:
1223 Tysnes	824	625 ; 1023	1212	543	(343)	552	224	(130)
1224 Kvinnherad	725	654 ; 795	986	436	241	529	220	168
1227 Jondal	836	538 ; 1134	1151	(541)	:	607	:	:
1228 Odda	940	827 ; 1053	1288	562	327	680	274	181
1231 Ullensvang	738	587 ; 888	1008	488	(254)	509	208	(153)
1232 Eidfjord	1079	761 ; 1398	1527	(801)	:	(678)	:	:

¹ Standardbefolking er summen av menn og kvinner i 5-årige aldersgrupper i hele landet 1. januar 1981

² Rate er erstattet med kolon hvis færre enn 20 dødsfall i perioden. Rate er satt i parentes hvis antall dødsfall er 20-39

³ Se merknad til tabellen i tekstdel 4.1.

¹ The standard population is the total population by 5-years groups per 1. January 1981

² A mortality rate less than 20 deaths are replaced by colons. Rate based on 20-39 deaths are quoted within brackets.

³ See remarks to the table in text (part 4.1).

Tabell 22 (forts.) Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet etter årsaksgasser. Kommune. Gjennomsnitt for årene 1992-1996. Pr. 100 000 innbyggere^{1 2 3} Standardized mortality rate from different causes of death. Sex. Municipality. Per 100 000 population^{1 2 3}. Annual average 1992-1996

Kommunestørrelse, fylke og kommune Size of municipality, county and municipality	Dødelighet, i alt Deaths, total	Konfidens- intervall 95%CI	Menn Males			Kvinner Females		
			I alt All causes	Hjerte/kar- sykdommer ICD-10 I00-I99	Kreft ICD-10 C00-C97	I alt All causes	Hjerte/kar- sykdommer ICD-10 I00-I99	Kreft ICD-10 C00-C97
Hordaland (forts.)								
1233	Ulvik	879	577 ; 1182	1214	(533)	:	(641)	:
1234	Granvin	665	383 ; 947	(965)	:	:	(471)	:
1235	Voss	811	731 ; 892	1053	430	309	634	241 188
1238	Kvam	749	650 ; 849	966	470	236	580	258 180
1241	Fusa	876	706 ; 1045	1188	629	(318)	645	272 (166)
1242	Samnanger	792	602 ; 983	1063	616	:	600	(265) :
1243	Os	669	612 ; 727	890	444	221	495	209 164
1244	Austevoll	793	663 ; 924	1019	429	(317)	593	253 :
1245	Sund	683	585 ; 781	995	552	(272)	506	264 :
1246	Fjell	775	726 ; 824	1104	481	304	529	195 144
1247	Askøy	817	763 ; 870	1059	475	313	640	276 175
1251	Vaksdal	764	609 ; 919	1066	451	288	562	165 (174)
1252	Modalen	(1028)	(440) ; (1615)	:	:	:	:	:
1253	Osterøy	691	593 ; 790	914	397	245	497	232 (124)
1256	Meland	668	564 ; 772	839	(365)	:	547	(208) (168)
1259	Øygarden	776	630 ; 922	981	(416)	(273)	660	357 :
1260	Radøy	882	740 ; 1024	1133	502	349	663	267 (199)
1263	Lindås	722	652 ; 792	955	451	244	541	242 160
1264	Austrheim	850	679 ; 1021	1062	(489)	:	678	(292) :
1265	Fedje	727	358 ; 1096	(978)	:	:	(468)	:
1266	Masfjorden	939	696 ; 1182	1206	722	:	652	(201) :
14	Sogn og Fjordane	802	773 ; 830	1037	452	267	601	263 154
1401	Flora	923	842 ; 1004	1222	496	310	663	311 154
1411	Gulen	794	578 ; 1011	1044	(362)	(379)	571	(236) :
1412	Solund	857	524 ; 1191	1044	(458)	:	(661)	(364) :
1413	Hyllestad	773	527 ; 1019	1113	(447)	:	449	(277) :
1416	Høyanger	796	652 ; 939	1008	446	281	627	222 (197)
1417	Vik	776	594 ; 958	1031	358	(281)	530	285 :
1418	Balestrand	664	426 ; 901	884	(308)	:	494	(265) :
1419	Leikanger	687	508 ; 866	988	(494)	:	464	(183) :
1420	Sogndal	712	611 ; 814	1009	406	357	487	169 (138)
1421	Aurland	739	520 ; 957	1027	:	:	488	(217) :
1422	Lærdal	896	682 ; 1110	1283	620	:	572	(213) (212)
1424	Årdal	1020	904 ; 1136	1386	706	359	725	350 (186)
1426	Luster	822	679 ; 965	1113	562	298	573	332 (104)
1428	Askvoll	794	626 ; 963	1009	506	(235)	636	230 (178)
1429	Fjaler	839	640 ; 1039	1008	411	(302)	684	291 :
1430	Gaula	904	710 ; 1098	986	(342)	(254)	823	354 :
1431	Jølster	744	559 ; 929	937	492	:	590	285 :
1432	Førde	681	614 ; 749	864	328	(230)	517	185 (152)
1433	Naustdal	738	555 ; 921	914	515	:	611	(201) :
1438	Bremanger	869	717 ; 1020	1042	397	(274)	715	291 (225)
1439	Vågsøy	802	695 ; 910	1055	518	250	603	284 (147)
1441	Selje	939	763 ; 1114	1159	553	:	748	338 :
1443	Eid	780	668 ; 893	998	436	(258)	603	217 (171)
1444	Hornindal	622	371 ; 873	(894)	:	:	(328)	:
1445	Gloppen	726	601 ; 851	834	327	(223)	641	288 (153)
1449	Stryn	745	630 ; 861	1007	535	(195)	528	255 (147)
15	Møre og Romsdal	813	795 ; 831	1068	482	264	621	272 164
1502	Molde	757	702 ; 812	937	381	276	625	245 183
1503	Kristiansund	974	899 ; 1049	1367	600	334	744	296 199
1504	Ålesund	883	837 ; 928	1190	528	305	681	290 189
1511	Vanylven	837	676 ; 998	1118	512	(264)	600	196 (149)
1514	Sande	743	589 ; 897	1027	588	(236)	510	304 :
1515	Herøy	760	667 ; 854	1075	483	249	534	200 196
1516	Ulstein	607	518 ; 696	799	371	(220)	463	209 (136)

¹ Standardbefolking er summen av menn og kvinner i 5-årige aldersgrupper i hele landet 1. januar 1981

² Rate er erstattet med kolon hvis færre enn 20 dødsfall i perioden. Rate er satt i parentes hvis antall dødsfall er 20-39

³ Se merknad til tabellen i tekstdel 4.1.

¹ The standard population is the total population by 5-years groups per 1. January 1981

² A mortality rate less than 20 deaths are replaced by colons. Rate based on 20-39 deaths are quoted within brackets.

³ See remarks to the table in text (part 4.1).

Tabell 22 (forts.) Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet etter årsaksgrupper. Kommune. Gjennomsnitt for årene 1992-1996. Pr. 100 000 innbyggere^{1 2 3} Standardized mortality rate from different causes of death. Sex. Municipality. Per 100 000 population^{1 2 3}. Annual average 1992-1996

Kommunestørrelse, fylke og kommune Size of municipality, county and municipality	Dødelighet, i alt Deaths, total	Konfidens- intervall 95%CI	Menn Males			Kvinner Females		
			I alt All causes	Hjerte/kar- sykdommer ICD-10 I00-I99	Kreft ICD-10 C00-C97	I alt All causes	Hjerte/kar- sykdommer ICD-10 I00-I99	Kreft ICD-10 C00-C97
Møre og Romsdal (forts.)								
1517 Hareid	699	582 ; 816	859	387 (204)	551 240 (192)			
1519 Volda	733	638 ; 827	934	433 (205)	572 290 (151)			
1520 Ørsta	736	650 ; 822	952	425 240	571 249 167			
1523 Ørskog	819	615 ; 1022	1063	: :	656 (308) :			
1524 Norddal	727	493 ; 961	1024	(477)	:	503 (302)		
1525 Stranda	714	575 ; 852	897	365 (258)	564 215 (168)			
1526 Stordal	754	462 ; 1046	(933)	:	:	(574) :		
1528 Sykkylven	683	591 ; 775	921	434 268	473 239			
1529 Skodje	741	614 ; 867	1024	(417)	:	468 (230)		
1531 Sula	754	657 ; 851	1010	518 (230)	585 304	(120)		
1532 Giske	752	654 ; 851	1021	471 (231)	545 276	(151)		
1534 Haram	699	609 ; 789	970	430 283	533 253	(148)		
1535 Vestnes	763	656 ; 871	954	428 261	602 235	(167)		
1539 Rauma	849	738 ; 961	1167	522 260	608 269	171		
1543 Nessa	783	599 ; 967	1060	507 (258)	524 259			
1545 Midsund	762	549 ; 975	930	(456)	:	648 (297)		
1546 Sandøy	816	554 ; 1078	1405	(621)	:	(422) :		
1547 Aukra	690	537 ; 843	981	(348)	:	475 (317)		
1548 Fræna	850	762 ; 939	1085	515 219	647 288	(138)		
1551 Eide	906	749 ; 1063	1173	682	:	663 386		
1554 Averøy	909	785 ; 1034	1141	522 297	700 297	(158)		
1556 Frei	912	815 ; 1008	1151	(473) (273)	734 (325)			
1557 Gjemnes	912	719 ; 1104	1012	(437) (265)	810 370			
1560 Tingvoll	926	744 ; 1109	1075	496 (201)	792 362	(175)		
1563 Sunndal	888	789 ; 987	1198	625 247	653 319	(95)		
1566 Sunndal	822	701 ; 943	1048	465 212	629 256	(167)		
1567 Rindal	761	533 ; 989	1007	440	:	532 (163)		
1569 Aure	975	766 ; 1183	1265	624 (271)	718 321	(228)		
1571 Halsa	1016	760 ; 1273	1411	(576) (350)	716 (320)	(240)		
1572 Tustna	854	553 ; 1155	(964)	:	770 :			
1573 Smøla	1030	822 ; 1238	1332	590 (357)	811 308	(251)		
16 Sør-Trøndelag	911	893 ; 928	1161	527 276	727 317	185		
1601 Trondheim	918	895 ; 940	1203	533 303	735 295	205		
1612 Hemne	880	741 ; 1018	1212	606 (264)	590 249			
1613 Snillfjord	939	594 ; 1284	1145	(482)	:	793 (388)		
1617 Hitra	891	738 ; 1043	1218	485 379	630 357	(137)		
1620 Frøya	985	818 ; 1152	1105	525 (200)	897 491	(147)		
1621 Ørland	991	861 ; 1120	1125	584 (215)	864 410	(215)		
1622 Agdenes	844	596 ; 1093	1012	(487)	:	669 (312)		
1624 Rissa	828	705 ; 951	1097	506 218	594 257	(149)		
1627 Bjugn	923	794 ; 1052	1119	573 (235)	747 344	(161)		
1630 Åfjord	877	712 ; 1041	1143	609 (326)	671 376	(181)		
1632 Roan	1025	693 ; 1357	1248	:	830 (443)			
1633 Osen	894	581 ; 1208	1094	(472)	:	779 (388)		
1634 Oppdal	914	796 ; 1031	1154	599 (200)	718 238	219		
1635 Rennebu	861	669 ; 1053	1061	567 (240)	687 356			
1636 Meldal	925	752 ; 1098	1193	519 (267)	741 391	(119)		
1638 Orkdal	1017	918 ; 1117	1278	617 309	830 430	150		
1640 Røros	818	684 ; 953	1001	392 (236)	665 267	(151)		
1644 Holtålen	1001	748 ; 1253	1204	537 :	805 312	(163)		
1648 Midtre Gauldal	789	663 ; 915	980	494 (178)	641 300	(165)		
1653 Melhus	889	818 ; 961	1221	512 287	649 327	139		
1657 Skaun	839	729 ; 950	1078	503 (257)	698 298	(218)		
1662 Klæbu	1175	1054 ; 1297	1509	(729)	:	956 491	(213)	
1663 Malvik	859	787 ; 931	1124	492 279	650 316	(140)		
1664 Selbu	871	701 ; 1041	979	401 (248)	771 314	(183)		
1665 Tydal	796	504 ; 1089	(1015)	:	(510) :			

¹ Standardbefolking er summen av menn og kvinner i 5-årige aldersgrupper i hele landet 1. januar 1981

² Rate er erstattet med kolon hvis færre enn 20 dødsfall i perioden. Rate er satt i parentes hvis antall dødsfall er 20-39

³ Se merknad til tabellen i tekstdel 4.1.

¹ The standard population is the total population by 5-years groups per 1. January 1981

² A mortality rate less than 20 deaths are replaced by colons. Rate based on 20-39 deaths are quoted within brackets.

³ See remarks to the table in text (part 4.1).

Tabell 22 (forts.) Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet etter årsaksgrupper. Kommune. Gjennomsnitt for årene 1992-1996. Pr. 100 000 innbyggere^{1 2 3} Standardized mortality rate from different causes of death. Sex. Municipality. Per 100 000 population^{1 2 3}. Annual average 1992-1996

Kommunestørrelse, fylke og kommune Size of municipality, county and municipality	Dødelighet, i alt Deaths, total	Konfidens- intervall 95%CI	Menn Males			Kvinner Females		
			I alt	Hjerte/kar- sykdommer	Kreft	I alt	Hjerte/kar- sykdommer	Kreft
			All causes	ICD-10 I00-I99 C00-C97	ICD-10 I00-I99 C00-C97	All causes	ICD-10 I00-I99 C00-C97	ICD-10 I00-I99 C00-C97
17 Nord-Trøndelag	875	849 ; 900	1116	541	265	686	318	169
1702 Steinkjer	917	853 ; 981	1107	515	305	768	362	197
1703 Namsos	803	728 ; 878	1023	436	216	654	300	181
1711 Meråker	941	731 ; 1151	1465	706	(313)	572	247	:
1714 Stjørdal	843	780 ; 906	1074	526	237	652	292	162
1717 Frosta	803	600 ; 1006	1067	577	(298)	604	(259)	:
1718 Leksvik	817	665 ; 970	987	452	(245)	682	316	:
1719 Levanger	842	776 ; 909	1086	467	281	655	282	165
1721 Verdal	881	810 ; 953	1109	553	265	693	310	166
1723 Mosvik	996	631 ; 1361	(942)	:	:	1075	(493)	:
1724 Verran	826	636 ; 1017	1273	710	(228)	651	369	:
1725 Namdalseid	917	699 ; 1136	1147	(466)	(367)	681	:	:
1729 Inderøy	832	715 ; 950	1061	606	(191)	663	332	(149)
1736 Snåsa	1065	848 ; 1283	1278	733	(330)	901	460	:
1738 Lierne	1085	824 ; 1346	1541	847	:	799	(377)	:
1739 Rørvik	(784)	(486) ; (1082)	:	:	:	:	:	:
1740 Namsskogan	915	629 ; 1200	(1107)	:	:	(715)	:	:
1742 Grong	754	562 ; 946	876	(333)	(270)	624	(260)	:
1743 Høylandet	747	503 ; 992	(959)	(533)	:	(541)	(369)	:
1744 Overhalla	866	719 ; 1014	1077	599	(203)	690	364	:
1748 Fosnes	816	515 ; 1118	(1002)	:	:	:	:	:
1749 Flatanger	946	664 ; 1228	1159	(623)	:	864	(389)	:
1750 Vikna	1024	868 ; 1180	1515	745	(400)	638	319	:
1751 Nærøy	969	829 ; 1108	1330	698	(220)	713	339	(197)
1755 Leka	946	596 ; 1296	(1367)	:	:	(657)	:	:
18 Nordland	906	888 ; 925	1205	579	268	683	315	169
1804 Bodø	868	832 ; 905	1167	576	267	660	282	177
1805 Narvik	920	854 ; 986	1250	587	266	710	323	199
1811 Bindal	843	627 ; 1060	1016	(542)	:	704	(336)	:
1812 Sømna	1040	813 ; 1268	1352	(578)	:	889	462	:
1813 Brønnøy	939	827 ; 1050	1250	601	248	741	357	(182)
1815 Vega	1000	724 ; 1275	1487	(861)	:	631	(340)	:
1816 Vefstad	784	373 ; 1195	(1180)	:	:	(552)	:	:
1818 Herøy	1244	975 ; 1512	1554	863	:	966	581	:
1820 Alstahaug	1185	1080 ; 1289	1469	621	404	967	511	230
1822 Leirfjord	793	589 ; 997	1023	545	:	609	312	:
1824 Vefsn	836	763 ; 908	1146	529	297	587	246	119
1825 Grane	749	506 ; 993	970	(397)	:	549	:	:
1826 Hattfjelldal	827	592 ; 1062	980	(439)	:	750	(391)	:
1827 Dønna	895	660 ; 1131	1147	(502)	:	753	(380)	:
1828 Nesna	1079	823 ; 1336	1461	(740)	:	753	(329)	:
1832 Hemnes	855	719 ; 991	1150	479	(274)	620	263	(139)
1833 Rana	853	801 ; 904	1162	530	296	617	302	144
1834 Lurøy	882	665 ; 1099	1155	565	:	617	(300)	:
1835 Træna	(1163)	(683) ; (1644)	(1431)	:	:	:	:	:
1836 Rødøy	943	691 ; 1194	1160	(400)	:	825	(279)	:
1837 Meløy	761	659 ; 863	1028	443	235	558	250	(149)
1838 Gildeskål	935	702 ; 1168	1228	671	(241)	727	382	:
1839 Beiarn	837	574 ; 1099	1134	(652)	:	608	(300)	:
1840 Saltdal	1035	897 ; 1173	1265	627	(212)	875	409	(131)
1841 Fauske	909	818 ; 1001	1260	688	260	681	330	153
1842 Skjerstad	928	582 ; 1274	1219	(571)	:	654	(337)	:
1845 Sørfold	963	765 ; 1161	1311	764	:	725	402	:
1848 Steigen	923	725 ; 1122	1199	639	(242)	700	335	(163)
1849 Hamarøy	898	672 ; 1124	1204	(528)	:	644	328	:
1850 Tysfjord	1093	879 ; 1308	1509	616	(366)	753	(303)	:
1851 Lødingen	815	633 ; 997	1283	596	:	475	(239)	:

¹ Standardbefolknings er summen av menn og kvinner i 5-årige aldersgrupper i hele landet 1. januar 1981

² Rate er erstattet med kolon hvis færre enn 20 dødsfall i perioden. Rate er satt i parentes hvis antall dødsfall er 20-39

³ Se merknad til tabellen i tekstdel 4.1.

¹ The standard population is the total population by 5-years groups per 1. January 1981

² A mortality rate less than 20 deaths are replaced by colons. Rate based on 20-39 deaths are quoted within brackets.

³ See remarks to the table in text (part 4.1).

Tabell 22 (forts.) Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet etter årsaksgrupper. Kommune. Gjennomsnitt for årene 1992-1996. Pr. 100 000 innbyggere^{1 2 3} Standardized mortality rate from different causes of death. Sex. Municipality. Per 100 000 population^{1 2 3}. Annual average 1992-1996

Kommunestørrelse, fylke og kommune Size of municipality, county and municipality	Dødelighet, i alt Deaths, total	Konfidens- intervall 95%CI	Menn Males			Kvinner Females		
			I alt All causes	Hjerte/kar- sykdommer ICD-10 I00-I99	Kreft ICD-10 C00-C97	I alt All causes	Hjerte/kar- sykdommer ICD-10 I00-I99	Kreft ICD-10 C00-C97
Nordland (forts.)								
1852	Tjeldsund	1027	768 ; 1285	1441 (721)	:	675 (343)	:	:
1853	Evenes	939	670 ; 1207	1143 793	:	771 (437)	:	:
1854	Ballangen	1148	943 ; 1354	1807 947	(335)	729 391	:	:
1856	Røst	(1002)	(686) ; (1318)	:	:	:	:	:
1857	Værøy	1327	937 ; 1717	(1654)	:	(1158)	:	:
1859	Flakstad	708	498 ; 917	943 (509)	:	(534)	:	:
1860	Vestvågøy	961	867 ; 1055	1287 606	327	742 324	224	
1865	Vågan	974	877 ; 1070	1349 635	330	707 320	151	
1866	Hadsel	938	837 ; 1040	1301 556	291	708 296	177	
1867	Bø	905	713 ; 1097	1266 646	(261)	676 305	(166)	
1868	Øksnes	907	780 ; 1035	1056 497	(225)	766 338	(225)	
1870	Sortland	797	706 ; 888	1065 590	214	596 231	147	
1871	Andøy	852	732 ; 971	1069 460	258	668 315	(165)	
1874	Moskenes	903	654 ; 1151	(966)	:	854 (368)	:	
19	Troms	936	914 ; 958	1268 592	293	680 319	153	
1901	Harstad	909	855 ; 963	1140 551	306	736 347	163	
1902	Tromsø	913	882 ; 944	1250 579	313	673 294	162	
1911	Kvæfjord	949	788 ; 1110	1356 566	(392)	684 271	:	
1913	Skånland	976	813 ; 1139	1320 743	(237)	683 366	:	
1915	Bjarkøy	1061	559 ; 1562	(1463)	:	(736) (377)	:	
1917	Ibestad	852	606 ; 1099	1045 (464)	:	723 368	(195)	
1919	Gratangen	915	627 ; 1203	1283 (555)	:	600 (291)	:	
1920	Lavangen	938	617 ; 1258	1399 (565)	:	(557)	:	
1922	Bardu	917	784 ; 1049	991 (469)	:	817 364	(209)	
1923	Salangen	1010	808 ; 1212	1264 (507)	(313)	791 345	:	
1924	Målselv	826	728 ; 924	1201 551	311	519 233	(99)	
1925	Sørreisa	792	654 ; 930	1124 561	(259)	567 (261)	:	
1926	Dyrøy	1117	785 ; 1449	1518 (668)	:	813 510	:	
1927	Tranøy	1097	844 ; 1350	1832 (805)	(449)	706 (367)	:	
1928	Torsken	982	683 ; 1282	1229 :	:	749	:	
1929	Berg	938	664 ; 1213	1365 :	:	(598)	:	
1931	Lenvik	1018	931 ; 1105	1488 731	301	689 336	(117)	
1933	Balsfjord	1087	955 ; 1219	1472 636	340	762 353	(182)	
1936	Karlsøy	864	699 ; 1030	1017 (548)	:	697 (355)	:	
1938	Lyngen	887	736 ; 1038	1271 594	(268)	573 279	:	
1939	Storfjord	1037	831 ; 1242	1322 (664)	:	790 (471)	:	
1940	Kåfjord	1241	1037 ; 1445	1471 809	:	972 501	:	
1941	Skjervøy	1063	899 ; 1227	1622 792	:	719 (341)	:	
1942	Nordreisa	871	750 ; 992	1334 637	(221)	510 244	:	
1943	Kvaenangen	876	626 ; 1127	1192 (595)	:	576 (323)	:	
20	Finnmark	1091	1060 ; 1121	1467 706	288	805 369	176	
2002	Vardø	1170	990 ; 1351	1619 959	:	901 479	(221)	
2003	Vadsø	1091	989 ; 1193	1523 706	(287)	734 298	:	
2004	Hammerfest	951	871 ; 1030	1412 692	266	670 333	(138)	
2011	Guovdageaidnu-Kautokeino	958	833 ; 1082	1187 (505)	:	(681) (406)	:	
2012	Alta	1005	948 ; 1061	1416 749	253	734 317	176	
2014	Loppa	1062	816 ; 1307	1462 (708)	:	909	:	
2015	Hasvik	1205	947 ; 1463	1726 (741)	:	(794) (504)	:	
2017	Kvalsund	1532	1208 ; 1856	1833 (875)	:	1166 (663)	:	
2018	Måsøy	1142	915 ; 1368	1538 (643)	:	804 (394)	:	
2019	Nordkapp	1342	1187 ; 1498	1853 706	(426)	936 425	:	
2020	Porsanger	1242	1111 ; 1372	1658 882	(361)	878 406	(224)	
2021	Karasjohka-Karasjok	1077	932 ; 1222	1230 (542)	:	925	:	
2022	Lebesby	1481	1202 ; 1759	1844 (822)	:	1092 (567)	:	
2023	Gamvik	1082	838 ; 1325	1129 (604)	:	973	:	
2024	Berlevåg	1239	945 ; 1532	1375 :	:	949 (377)	:	
2025	Deatnu-Tana	1158	997 ; 1318	1284 571	(301)	1024 507	:	
2027	Unjarga-Nesseby	1085	765 ; 1405	1700 (812)	:	(654)	:	
2028	Båtsfjord	908	768 ; 1048	1208 (799)	:	(710)	:	
2030	Sør-Varanger	1040	953 ; 1128	1423 604	316	785 296	189	

¹ Standardbefolking er summen av menn og kvinner i 5-årige aldersgrupper i hele landet 1. januar 1981

² Rate er erstattet med kolon hvis færre enn 20 dødsfall i perioden. Rate er satt i parentes hvis antall dødsfall er 20-39

³ Se merknad til tabellen i tekstdel 4.1.

¹ The standard population is the total population by 5-years groups per 1. January 1981

² A mortality rate less than 20 deaths are replaced by colons. Rate based on 20-39 deaths are quoted within brackets.

³ See remarks to the table in text (part 4.1).

Tabell 23. Folkemengde etter kjønn og alder. 1996 *Population by sex and age. 1996*

Alder Age	Middelfolkemengde ¹ <i>Mean Population¹</i>			Folkemengde ved utgangen av året ² <i>Population at the end of the year²</i>		
	I alt <i>Total</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I alt	Menn	Kvinner
	I alt Total	4381330	2166445	2214891	4392714	2220570
0 år year	60519	31172	29348	60835	31403	29432
1-4 år	242652	124719	117933	242214	124465	117749
5-9 år	293591	150429	143162	297711	152479	145232
10-14 år	261982	134439	127543	262877	135103	127774
15-19 år	265953	136018	129935	264970	135423	129547
20-24 år	310452	157632	152820	304755	154688	150067
25-29 år	343576	175218	168358	343191	174662	168529
30-34 år	332694	170671	162024	335500	172124	163376
35-39 år	318718	162878	155841	318517	162901	155616
40-44 år	309829	158010	151820	312243	158947	153296
45-49 år	308831	158530	150302	304822	156524	148298
50-54 år	266175	135385	130790	278307	141708	136599
55-59 år	197429	98248	99182	199201	99164	100037
60-64 år	174949	85159	89790	174006	84857	89149
65-69 år	179993	84999	94995	178118	84130	93988
70-74 år	181925	81253	100673	179974	80620	99354
75-79 år	153657	62611	91046	155151	63292	91859
80-84 år	102017	36929	65088	102764	37156	65608
85-89 år	53615	16458	37157	54466	16744	37722
90 år +	22776	5693	17089	23092	5754	17338

¹ Gjennomsnitt av folkemengden ved begynnelsen og utgangen av året. ² Registrert bosatt folkemengde i Det sentrale folkeregister.

² *The average of the population at the beginning and the end of the year.* ² *Resident population according to the Central Population Register.*

Kilde: NOS Befolkningsstatistikk 1996. Hefte III Oversikter

Source: NOS Population Statistics 1996. Volume III. Survey

Fastsatt av Sosialdepartementet 1983

Legeerklæring om dødsfall/melding om unaturlig dødsfall

Jfr. lov om leger av 13/6 1980 §§ 40 og 41.

Blanketten fylles ut i samsvar med rettledningen på baksiden og leveres rekvrrente (den som har plikt til å melde dødsfallet) i forseglet konvolutt som i byene addreseres til skifteretten og på landet til lensmannen på dødsstedet. Kopi av legeerklæringen sendes den lokale politimyndighet, hvis dødsfallet kan være unaturlig. (Se rettledning på baksiden.)

Avdodes slektsnavn, for og mellomnavn		Kjønn <input type="checkbox"/> 1 M <input type="checkbox"/> 2 K	Født dag. mnd.. ar	Personnr.	Filles ut av Statistisk Sentralbyra
Bosted. kommune	gate og husnr.	postadresse			
Dødssted. kommune	Død utenfor institusjon 1 : Hjemme 2 : Annet sted	Under transport 3 : til sykehus	4 : Dod i sykehus eller annen institusjon		
For døde i sykehus eller annen institusjon: Institusjonens navn				Død dag. mnd.. ar	
Hvis sykehus: Avdeling. For annen institusjon. Type institusjon					
Yrke (eget. eventuelt forsørgerens)					
Ektekapelig status 1 : Ugift 2 : Gift 3 : Enke, -mann 4 : Skilt 5 : Separert		For barn doce innen 24 timer etter fødselen hvor lenge varte livet?		Timer	Minutter
Navn og adresse på den lege som har behandlet avdode under siste sykdom					

Opplysning om dødsårsaken

Alle rubrikker må fylles ut. (Se rettledning på baksiden.)

I. Sykdom eller tilstand som direkte (umiddelbart) har ført til døden. (Her skal ikke fores dødsårsaken f.eks. hjertesvikt, hjertelammelse, asteni, men den sykdom, skade eller komplikasjon som umiddelbart fremkalte doden.) a) Oppgi den eller de sykelige tilstander, skader eller misdannelser som har ført til (la bak) den dødsårsak som er nevnt ovenfor. Den tilstand som innleddet sykdomsforløpet, føres sist b) II. Andre vesentlige tilstander som kan ha bidratt til dødens inntreden, men som ikke står i direkte årsakforhold til den sykdom eller tilstand som har fremkalt doden.	Omtrentlig tid mellom sykdommens begynnelse og døden			
som skyldtes (var en følge av)				
Oppgi den eller de sykelige tilstander, skader eller misdannelser som har ført til (la bak) den dødsårsak som er nevnt ovenfor. Den tilstand som innleddet sykdomsforløpet, føres sist c)				
som skyldtes (var en følge av)				
Dersom døden skyldtes skade (ulykke) eller følger av denne:				
Dato skaden (ulykken) skjedde	Sted <input type="checkbox"/> I vea <input type="checkbox"/> hjemmet	<input type="checkbox"/> Annet sted	Yrkesulykke? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
Hvordan skjedde ulykken?				
Spesielle omstendigheter ved dødsfallet/foretatte undersøkelser typer på (sett kryss)				
<input type="checkbox"/> Drap <input type="checkbox"/> Selvmord <input type="checkbox"/> Misbruk <input type="checkbox"/> Medisinsk feil <input type="checkbox"/> Ukjent <input type="checkbox"/> Plutselig død <input type="checkbox"/> Dødsfall i uventet <input type="checkbox"/> Fengsel/Arrest <input type="checkbox"/> Ukjent lik <input type="checkbox"/> Yrkes-sykdom				
Ble det foretatt operasjon? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Dato operert	Viktigste funn		
Opplysningsene under i bygger på <input type="checkbox"/> Obduksjon <input type="checkbox"/> Unders. for døden <input type="checkbox"/> Syning av liket	Vil den oppgitte dødsårsak senere bli revurdert? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Vet ikke			

Undertegnede lege som har synet liket og som har behandlet den døde under siste sykdom (sett event. kryss). erklaerer herved at dødsårsaken er den ovenfor nevnte.

Melding om unaturlig dødsfall er sendt/gitt muntlig til politiet/lensmannen ja nei

Undertegnede lege erklaerer herved at det ikke er grunn til å anta at døden er voldt ved en straffbar handling. (Erklæringen gis bare når kremasjon ønskes eller liket føres ut av riket.)

Date	Lege	Date	Lege
Adresse:		Adresse:	
I. Forevist skifteretten lensmannen og sendes den offentlige lege/politi på dødsstedet		II. Forevist politiet og sendes den offentlige lege på dødsstedet	
Date	For skifteretten lensmannen	Date	For politimesteren
Adresse:		Adresse:	
III. Off. lege/heiserad (stempel)			

Rettledning for legen ved utfylling av meldingen

En dødsmelding er et dokument som har rettslig betydning. Alle opplysninger må derfor gis med største nøyaktighet, og meldingen må fylles ut med tydelig skrift.

For de enkelte rubrikker må følgende iakttas:

Avdødes navn: Både slektsnavn, for- og mellomnavn skrives helt ut. For barn som dør før det har fått navn, oppgis foreldrenes (morens) slektsnavn.

Bosted: Her oppgis hvor den døde var registrert bosatt. Personer som på grunn av utdanning eller arbeid midlertidig oppholder seg borte fra hjemmet, regnes som bosatt på hjemstedet. Personer som dør i sykehus, fengsel o.l., regnes som bosatt der de hadde sitt bosted før anbringelsen. For barn født på sykehus/klinikke, som dør umiddelbart etter fødselen, oppgis foreldrenes (morens) bosted. Personer som ved døden var anbragt i andre institusjoner (aldershjem, skolehjem o.l.) eller i privat pleie, regnes som bosatt der. Norsk personell ved norske diplomatiske stasjoner i utlandet regnes fortsatt som bosatt i den kommunen de hadde sitt bosted ved utreisen.

Dødssted: Her oppgis kommune, og det krysses av hvor døden inntrådte (hjemme, annet sted, under transport til sykehus; i sykehus eller annen institusjon). Ved dødsfall i sykehus oppgis sykehusets navn og avdeling, ved dødsfall i annen institusjon oppgis navn, type og postadresse.

Yrke: Oppgi avdødes yrke eller levevei. For yrkesaktive og tidligere yrkesaktive oppgis hovedyrket, for arbeidsløse vanlig yrke. For pensjonister og trygdde oppgis tidligere yrke med tilføyelse «f.hv.». For forsørgerde oppgis forsørgerens, eventuelt forsørgesesmåten.

Dødsårsaken: (det vises også til særskilt rettledning)

Under Ia) skal føres den sykdom, komplikasjon eller tilstand som direkte fremkalte døden. I de fleste tilfelle vil denne umiddelbare dødsårsak skyldes eller være en følge av en eller flere sykdommer, skader eller tilstander. Disse føres under b) og c), og den tilstand som etter legens mening startet årsakskjeden føres sist. Hvis den sykdom eller tilstand som føres opp under Ia) beskriver hendelsesforløpet fullstendig, er det ikke nødvendig å fylle ut b) og c).

Arsakssammenhengen mellom Ia, b og c omfatter ikke bare den etiologiske eller patogenetiske sammenheng, men også sekvenser der grunnlidelsen antas å ha ført til den direkte dødsårsak p.g.a. funksjonsnedsettelse eller andre forstyrrelser.

Under II føres andre vesentlige tilstander som bidro til den dødelige utgang, men som ikke sto i direkte årsaksforhold til den sykdom eller tilstand som fremkalte døden.

Hvis mulig oppgis om tilstanden var akutt eller kronisk og hvor lenge hver tilstand har vart. Ved sykdomsbetegnelser hvor lokalisasjon ikke gar fram av sykdommens navn, eks. ved kreft og tuberkulose, må sykdommens anatomiske sette oppgis.

Ved unødig død skal legen opplyse om det foreligger drap, selvmord eller ulykke. Utørlige opplysninger om den ytre årsak bes gitt uansett om døden er en umiddelbar følge av skaden eller av den patologiske tilstand som skaden kan ha ført til.

Ved unødig død skal legen sende skriftlig melding til politiet/lensmannen på dødsstedet, jfr. § 41 i lov om leger av 13/6 1980 nr. 42 og forskrifter for legens melding om unødig dødsfall o.l. Se forøvrig særskilt rettledning nedenfor.

Rettledning for legen ved melding om unødig dødsfall

Legeloven § 41 bestemmer at den lege som skal gi erklæring om dødsfall, uten opphold skal underrette politiet der som det er grunn til å regne med at dødsfallet kan være unødig. På samme måte meldes funn av ukjent lik, og dødsfall i fengsel eller i politi- eller militærarrest. Unnlatelse av å melde fra er straffbar. Meldeplikten gar foran taushetsplikt.

Melding til politiet om unødig dødsfall skal først skje muntlig eller telefonisk så snart som mulig. Deretter skal sendes skriftlig melding. Denne er en kopi av legeerklæringen om dødsfall, for at legene skal slippe et ekstra meldingskjema. På skjemaet er det en del spørsmål som knytter seg til unødig dødsfall. Opplysningsene her hører med til den vanlige legeerkæring om dødsfall.

Grensen mellom naturlig og unødig død er ikke skarp. Det kan ofte være uklart om et dødsfall er naturlig eller unødig. Arsaksforholdene er ofte usikre, og kan hyppig bare bringes på det rene ved etterforskning eller ved sakkyndig likundersøkelse.

Legen behøver ikke ta et bestemt standpunkt til om det foreligger naturlig eller unødig død, til årsaks- eller skyldforhold e.l. Hans plikt til å gi muntlig melding til politiet inntrer når han skjønner at den kan foreligge unødig død. Når han så gir skriftlig melding, kan legen gi uttrykk for at svaret er usikkert ved å sette spørsmålstegn istedenfor kryss ved de spørsmål som gjelder unødig død eller ved å krysse av i rubriken for ukjent årsak. Et dødsfall vil kunne falle inn under flere rubrikker; et narkotikadødsfall kan samtidig være et selvmord, en ulykke eller et uaktsomt drap, og det kan intrefte under anholdelse eller i arrestrom.

Har legen gitt muntlig melding, bør i alle tilfeller skriftlig melding sendes, også om dødsfallet ikke lenger antas å være unødig.

Oversendelse av dødsmeldinger

Ved begravelse skal skifтерetten (lensmannen) etter å ha fylt ut skjema for melding til soknepresten, (jfr. Justisdepartementets rundskriv av 1. desember 1938) sende denne legeerklæringen direkte (i posten) til den offentlige lege på dødsstedet.

Ved kremasjon eller hvis liket skal føres ut av riket, skal skifтерetten (lensmannen) etter å ha fylt ut skjema for melding til soknepresten (jfr. Justisdepartementets rundskriv av 1. desember 1938) oppfordre rekvirenten til å bringe legeerklæringen videre til politiet, som gir ham (henne) særskilt erklæring om at det fra politiets side ikke er noe til hinder for kremasjon eller at liket føres ut av riket.

Politiet sender deretter legeerklæringen direkte (i posten) til den offentlige lege på dødsstedet.

Den offentlige lege skal sende de dødsmeldingene han mottar til Statistisk Sentralbyrå, postboks 8131 Dep., Oslo. Fra byene skal meldingene sendes den 1. i hvert måned, fra landdistrikte kvartalsvis innen 8 dager etter kvartalets utløp (jfr. årlig rundskriv fra Helsedirektøren).

Denne blankett får ved henvendelse til den offentlige lege, som får det nødvendige antall fra fylkeslegen. Fylkeslegen rekvirerer skjema fra Statens helsetilsyn, postboks 8128 Dep., 0032 OSLO.

Dødsmelding fra lensmann til den offentlige lege.

(Se veilederingen på baksiden.)

Blankett 2 fylles ut i alle tilfelle hvor legeerklæring om dødsfallet på blankett 1 ikke foreligger, og sendes uopholdelig til den offentlige lege på dødsstedet. Hvis legeerklæring foreligger, gir lensmannen sin påtegning på denne og sender den videre til vedkommende offentlige lege.

Avdødes slektsnavn, for- og mellomnavn		Kjønn <input type="checkbox"/> 1 M <input type="checkbox"/> 2 K	Født dag, mnd., år	Personnr.	Filles ut av Statistisk Sentralbyrå
Bosted, kommune	Gate og husnr.	Postadresse			
Dødssted, kommune	Død utenfor institusjon 1 <input type="checkbox"/> Hjemme 2 <input type="checkbox"/> Annet sted		3 <input type="checkbox"/> Under transport til sykehus	4 <input type="checkbox"/> Død i sykehus eller annen institusjon	
For døde i sykehus eller annen institusjon. Institusjonens navn			Død dag, mnd., år		
Hvis sykehus, avdeling. For annen institusjon, type institusjon					
Yrke (eget, eventuelt forsørgerens)					
Ekteskapelig status 1 Ugift 2 Gift 3 Enke, -mann 4 Skilt 5 Separert		For barn døde innen 24 timer etter fødselen, hvor lenge varte livet		Timer	Minutter
Navn og adresse på den lege som har behandlet avdøde under siste sykdom					
Antatt dødsårsak (etter de pårørendes opplysninger)					

Sendes den offentlige lege i

sted dato lensmann

Opplysing om dødsårsaken.

(Se veilederingen fra Helsedirektøren.)

Fylles ut av den offentlige lege som — hvis han ikke selv har behandlet avdøde under den siste sykdom — har plikt til å innhente de nødvendige opplysninger fra den behandelnde lege (blankett 3).

I. Sykdom eller tilstand som direkte (umiddelbart) har ført til døden. (Her skal ikke føres dødsmåten f.eks. hjertesvikt, hjertelammelse, asteni, men den sykdom, skade eller komplikasjon som umiddelbart fremkalte døden.)	a) som skyldtes (var en følge av)	Omtrentlig tid mellom sykdommens begynnelsje og døden	
Oppgi den eller de sykelige tilstander, skader eller misdannelser som har ført til (lå bak) den dødsårsak som er nevnt ovenfor. Den tilstand som innledet sykdomsforløpet, føres sist.	b) som skyldtes (var en følge av)		
c)			
II. Andre vesentlige tilstander som kan ha bidratt til dødens inntreden, men som ikke står i direkte årsaksforhold til den sykdom eller tilstand som har fremkalt døden.			
Dersom døden skyldtes skade (ulykke) eller følger av denne:	Dato skaden (ulykken) skjedde Sted <input type="checkbox"/> I/ved <input type="checkbox"/> hjemmet	Annet sted <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Yrkesulykke?
Hvordan skjedde ulykken			

sted dato lege

Velledning for lensmannen ved utfyllingen av meldingen til den offentlige lege på dødsstedet.

En dødsmelding er et dokument som har rettslig betydning, og alle opplysninger må derfor gis med størst mulig nøyaktighet, og meldingen må fylles ut med tydelig skrift.

Når meldingen fylles ut, skal følgende iakttas:

Avdødes navn: Både slektsnavn, for- og mellomnavn skrives helt ut. For barn som dør før det har fått navn, oppgis foreldrenes (morens) slektsnavn.

Bosted: Her oppgis hvor den døde var registrert bosatt. Personer som på grunn av utdanning eller arbeid midlertidig oppholder seg borte fra hjemmet, regnes som bosatt på hjemstedet. Personer som dør i sykehus, fengsel o.l., regnes som bosatt der de hadde sitt bosted før anbringelsen. For barn født på sykehus/klinikks, som dør umiddelbart etter fødselen, oppgis foreldrenes (morens) bosted. Personer som ved døden var anbragt i andre institusjoner (aldershjem, skolehjem o.l.) eller i privat pleie, regnes som bosatt der. Norsk personell ved norsk diplomatiske stasjoner i utlandet regnes fortsatt som bosatt i den kommunen de hadde sitt bosted ved utreisen.

Dødssted: Her oppgis kommune, og det krysses av hvor døden inntrådte (hjemme, annet sted, under transport til sykehus, i sykehus eller annen institusjon). Ved dødsfall i sykehus oppgis sykehusets navn og avdeling, ved dødsfall i annen institusjon oppgis navn, type og postadresse.

Yrke: Oppgi avdødes yrke eller levevei. For yrkesaktive og tidligere yrkesaktive oppgis hovedyrket, for arbeidsløse vanlig yrke. For pensjonister og trygdde oppgis tidligere yrke med tilføyelse «fhv.». For forsørgerde oppgis forsørgerens, eventuelt forsørgelsesmåten.

Vedlegg B

Appendix B

Europeisk forkortet dødsårsaksliste¹ European short-list for causes of death¹

		ICD-10	ICD-9	ICD-8
01	Infeksiøse inkl. parasittære sykdommer	A00-B99	001-139	000-136
02	Tuberkulose	A15-A19,B90	010-018,137	010-019
03	Meningokokkinfeksjon	A39	036	036
04	AIDS (HIV-sykdom)	B20-B24	279.1	-
05	Akutt hepatitt og kronisk virushepatitt	B15-B19	070	070
06	Svulster	C00-D48	140-239	140-239
07	Ondartet svulster	C00-C97	140-208	140-209
08	Ondartet svulst i leppe, i munnhulen og svelget	C00-C14	140-149	140-149
09	Ondartet svulst i spiserøret	C15	150	150
10	Ondartet svulst i magesekken	C16	151	151
11	Ondartet svulst i tykktarm og overgang mellom sigmoideum og	C18-C19	153	153
12	Ondartet svulst i endetarmen og endetarmsåpnongen og analkanal	C20-C21	154	154
13	Ondartet svulst i lever og intrahepatiske galleganger	C22	155	155,197.8
14	Ondartet svulst i bukspyttkjertel	C25	157	157
15	Ondartet svulst i strupen, luftrør, bronkie og lunge	C32-C34	161-162	161-162
16	Malignt melanom i hud	C43	172	172
17	Ondartet svulst i bryst	C50	174-175	174
18	Ondartet svulst i livmorhals	C53	180	180
19	Ondartet svulst i andre deler av livmoren	C54-C55	179,182	182
20	Ondartet svulst i eggstokk	C56	183.0	183.0
21	Ondartet svulst i blærehalskjertel	C61	185	185
22	Ondartet svulst i nyre, unntatt nyrebekken	C64	189.0	189.0
23	Ondartet svulst i urinblære	C67	188	188
24	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	C81-C96	200-208	200-209
25	Sykdommer i blodet og de bloddannende organer, forstyrrelser i immunsystemet	D50-D89	279-289	280-289
26	Indresekretoriske sykdommer, ernærings- og stoffskifte sykdommer	E00-E90	240-278	240-279
27	Sukkersyke	E10-E14	250	250
28	Psykiske lidelser og atferdsmessige forstyrrelser	F00-F99	290-319	290-315
29	Alkoholbetingende psykoser/avhengighet av alkohol	F10	291,303	291,303
30	Avhengighet av stoff eller medikamenter	F11-F16,F18-F19	304-305	304-305
31	Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	G00-H95	320-389	320-289
32	Hjernehinnebetennelse (meningitt)	G00-G03	320-322	320
33	Sykdommer i sirkulasjonsorganene	I00-I99	390-459	390-444.1,
34	Ischemisk hjertesykdom	I20-I25	410-414	410-414
35	Andre hjertesykdommer (eksl. reumatiske og hjerteklaffsykdommer)	I30-I52	420-423, 425-429	420-423,425- 429
36	Karsykdommer i hjernen	I60-I69	430-438	430-438
37	Sykdommer i åndedrettsorganene	J00-J99	460-519	460-519
38	Influensa	J10-J11	487	470-474
39	Lungebetennelse	J12-J18	480-486	480-486
40	Kroniske sykdommer i nedre luftveier	J40-J47	490-494,496	491-493,518
41	Astrma	J45-J46	493	493
42	Sykdommer i fordøyelsesorganene	K00-K93	520-579	520- 577,444.2
43	Sår i magesekk, tolvfingertarm og magesår	K25-K28	531-534	531-534
44	Kronisk leveresykdom	K70,K73-K74	571.0-571.9	571.0-571.9
45	Sykdom i hud og underhud	L00-L99	680-709	680-709
46	Sykdom i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	M00-M99	710-739	710-738
47	Leddgikt og artrose	M05-M06,M15- M19	714-715	712-713
48	Sykdommer i urin- og kjønnsorganer	N00-N99	580-629	580-629,792
49	Sykdommer i nyre og urinleder	N00-N29	580-594	580-594
50	Sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng	O00-O99	630-676	630-678
51	Visse tilstander ved begynnelsen i den perinatale perioden	P00-P96	760-779	760-779
52	Medfødte misdannelser	Q00-Q99	740-759	740-759
53	Medfødte misdannelser i nervesystemet	Q00-Q07	740-742	740-743
54	Medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet	Q20-Q28	745-747	746-747
55	Symtomer og ubestemte tilstander	R00-R99	780-799	780- 782.3,782.5- 791,793-796

Europeisk forkortet dødsårsaksliste¹ European short-list for causes of death¹ (fors.)

		ICD-10	ICD-9	ICD-8
56	Plutselig død av ukjent årsak hos spedbarn (krybbedøds syndrom)	R95	798.0	-
57	Ukjente og uspesifiserte årsaker	R96-R99	798.1- 798.9,799	795-796
58	Voldsomme dødsfall i alt	V01-Y89	E800-E999	E800-E999
59	Ulykker	V01-X59,Y85- Y86	E800-E929 E940-E942	E800-E929, E940-E942
60	Transportulykker	V01-V99,Y85	E800-E848	E800-E845
61	Fallulykker	W00-W19	E880-E888	E880-E887
62	Forgiftningsulykker	X40-X49	E850-E869	E850-E877
63	Selvmord	X60-X84,Y87.0	E950-E959	E950-E959
64	Drap, overfall	X85-Y09,Y87.1	E960-E969	E960-E969
65	Skade der det er ukjent om årsaken er et uhell eller er påført med hensikt	Y10-Y34,Y87.2	E980-E989	E980-E989

¹ Avvik fra listen. Gruppe 4; Norsk dødsårsaksstatistikk har benyttet 279.1 ikke 042-044. Gruppene 59-60 og 63-65; ICD-10 koder for senfølger er inkludert. Diverging from the original list. Group 4; Causes of Death Statistics in Norway have used 279.1 and not 042-044. Groups 59-60 and 63-65; sequele ICD-10 codes are included

Tidligere utgitt på emneområdet (forts.)

Mer under NOS

Dødelighet i fylkene, Regional dødelighet/Regional mortality, Mortality Rates in Country

A	132	1960
A	298	1964-1967
A	672	1969-1972
A	948	1971-1975
B	334	1976-1980
B	790	1981-1995

Standarder for norsk statistikk

Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker. Stikkordregister. Norsk utgave av ICD-9. Opptrykk 1996. Standarder for norsk statistikk. NOS C 108. Oslo/Kongsvinger 1996

Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker. Systematisk del. Norsk utgave av ICD-9 Revidert 1990, opptrykk 1997. Standarder for norsk statistikk. NOS C 107. Oslo/Kongsvinger 1997

Håndbøker

Standard for gruppering av sykdommer - skader - dødsårsaker. Norsk utgave av ICD-8. 2. utgave. Statistisk sentralbyrås håndbøker 24. Oslo 1973

Samfunnsspeilet

Gjertsen, Finn: Dødsulykker: Synkende ulykkesdødelighet, men flere hjemmeulykker? Nr. 2/1991

Gjertsen, Finn: Sterk reduksjon i dødsulykker blant barn. Nr. 3/1992

Borgan, Jens Kristian: Utstøting gir lavere dødelighet hos yrkesaktive. Nr. 1/97

Ukens statistikk (1995 og senere)

Dødsårsaker 1993: Stor nedgang i hjerte- og kardødeligheten. Nr. 10/95, 9. mars 1995

Færre krybbedødsfall og dødsulykker blant barn. Nr. 12/95, 23. mars 1995

Dødsårsaker 1994: Færre selvmord blant unge menn. Nr. 27/96, 4. juli 1996

Retningslinjer for tilgang til personopplysning fra Dødsårsaksregisteret. Nr. 35/97, 28. august 1997

Dødsårsaker 1995: Færre dødsulykker blant barn. Nr. 12/98, 19. mars 1998

Samfunnsøkonomiske studier (SØS)

Backer, Julie E.: Dødeligheten og dens årsaker i Norge 1856-1955. Oslo 1961. SØS nr. 10

Backer Julie E. og Øystein Aagenæs: Dødelighet blant spedbarn i Norge 1901-1963. Oslo 1966. SØS nr. 17

Kristofersen, Lars B.: Dødelighet blant yrkesaktive. Sosiale ulikheter i 1970-årene. Oslo 1986. SØS nr. 56

Statistiske meddelelser

Backer, Julie E.: Statistisk oversikt over krigsdødsfallene 1940-1945. Nr. 10-12 1948

Statistiske analyser (SA)

Blix, Ellen og Eystein Glattre: Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår 1969-1972. Oslo 1976. SA nr. 15

Blix, Ellen: Dødelighetsutviklingen og dødsårsaksmønster 1951-1970. Oslo 1974. SA nr. 9

Haldorsen, Tor og Eystein Glattre: Yrke og dødelighet 1970-1973. Oslo 1976. SA nr. 21

Holan, Lita og Eystein Glattre: Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår 1971-1980. Oslo 1984. SA nr. 52

Borgan, Jens-Kristian og Lars B. Kristofersen: Dødelighet i yrker og sosioøkonomiske grupper 1970-1980. SA nr. 56

Borgan, Jens-Kristian: Dødelighet i Norge og andre industrialiserte land. I: Sosialt utsyn 1993. Oslo-Kongsvinger 1993. SA nr 1

Gjertsen, Finn: Selvmord og ulykker. I: Sosialt utsyn 1993. Oslo-Kongsvinger 1993. SA nr 1

Rapporter

Kristofersen, Lars B.: Yrke og dødelighet. Tilleggsberegninger til tidligere analyser. Rapp 79/19

Glattre, Eystein og Ellen Blix: En vurdering av dødsårsaksstatistikken. Rapp 80/13

Borgan, Jens-Kristian: Kohort-dødelighet i Norge 1846-1980. Rapp 83/28

Gjertsen, Finn: Dødelighet ved ulykker 1956-1988. Rapp 92/8

Borgan, Jens-Kristian: SYNAPS-forprosjektet. System for nasjonal personskadestatistikk. Rapp 95/23

Mamelund, Svenn-Erik og Jens-Kristian Borgan: Kohort- og periodedødelighet i Norge 1846-1994. Rapp 96/9

Notater

Borgan, Jens-Kristian: Forgubbing i lite sentrale kommuner. Dødelighet eller flytting? Notater 96/20

Lövkist, Håkan: Standardiserte rater - en metodebeskrivelse med eksempler fra dødsårsaksstatistikken. Notater 97/22

Gjertsen, Finn: Dødsårsaksregisteret i Statistisk sentralbyrå. Rapport om virksomheten i 1996. Notater 97/65

Tidligere utgitt på emneområdet

Previously issued on the subject

Norges offisielle statistikk (NOS)

Official Statistics of Norway

Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge (Utkom i serien NOS fra 1859)

se C.4, 1854-1881

III, 1882-1897

IV, 1898-1903

V, 1904-1911

VI, 1912-1915

VI, 1916

VII, 3 1917

VII, 58 1918

VII, 108 1919

VII, 138 1920

VII, 152 1921

VII, 188 1922

VIII, 13 1923

VIII, 29 1924

VIII, 59 1925

VIII, 81 1926

VIII, 116 1927

VIII, 142 1928

VIII, 174 1929

IX, 2 1930

IX, 20 1931

IX, 49 1932

IX, 78 1933

IX, 101 1934

IX, 125 1935

IX, 153 1936

IX, 178 1937

IX, 194 1938

X, 21 1939

X, 55 1940

X, 97 1941

X, 160 1942-1944

X, 179 1945

X, 191 1946

XI, 20 1947

XI, 35 1948

XI, 88 1949

XI, 114 1950

XI, 156 1951

XI, 196 1952

XI, 229 1953

XI, 257 1954

XI, 306 1955

XI, 332 1956

XII, 15 1957

XII, 25 1958

XII, 58 1959

XII, 91 1960

XII, 122 1961

Helsestatistikk (cont.) (forts.) Health Statistics

XII	327	1968
A	411	1969
A	493	1970
A	554	1971
A	633	1972
A	707	1973
A	799	1974
A	874	1975
A	953	1976
A	21	1977
B	111	1978
B	193	1979
B	277	1980
B	379	1981
B	465	1982
B	532	1983
B	608	1984
B	681	1985
B	767	1986
B	832	1987
B	918	1988
B	966	1989
C	25	1990
C	74	1991

Dødsårsaker Causes of Death

A	150	1964
A	183	1965
A	226	1966
A	257	1967
A	309	1968
A	401	1969
A	467	1970
A	532	1971
A	609	1972
A	682	1973
A	758	1974
A	841	1975
A	926	1976
B	4	1977
B	92	1978
B	168	1979
B	244	1980
B	340	1981
B	434	1982
B	509	1983
B	579	1984
B	660	1985
B	731	1986
B	813	1987
B	887	1988
B	955	1989
C	15	1990
C	79	1991
C	155	1992
C	246	1993
C	386	1994
C	490	1995

Helsestatistikk Health Statistics

XII	135	1962
XII	180	1963
XII	196	1964
XII	219	1965
XII	234	1966
XII	250	1967

De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk

Recent publications in the series Official Statistics of Norway

Merverdiavgift på 23 prosent kommer i tillegg til prisene i denne oversikten hvis ikke annet er oppgitt

- C 541 Quarterly National Accounts 1978-1998: Production, Uses and Employment. 1999. 115s. 125 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4712-8
- C 542 Nasjonalregnskapsstatistikk 1991-1998: Produksjon, anvendelse og sysselsetting. 1999. 141s. 125 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4713-6
- C 543 National Accounts 1991-1998: Production, Uses and Employment. 1999. 141s. 125 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4714-4
- C 544 Nasjonalregnskapsstatistikk 1991-1998: Institusjonelt sektorregnskap. 1999. 59s. 105 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4715-2
- C 545 National Accounts 1991-1998: Institutional Sector Accounts. 1999. 61s. 105 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4716-0
- C 546 Fiskeoppdrett 1996 *Fish Farming* 1996. 1999. 50s. 105 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4717-9
- C 547 Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1999: Statistikk og analyser *Oil and Gas Activity 2nd quarter 1999: Statistics and Analysis*. 1999. 79s. 105 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4723-3
- C 548 Jaktstatistikk 1998 *Hunting Statistics* 1998. 1999. 63s. 115 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4724-1
- C 549 Sjølvmeldingsstatistikk 1997 *Tax Return Statistics* 1997. 1999. 111s. 125 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4728-4
- C 550 Veitrafikkulykker 1998 *Road Traffic Accidents* 1998. 1999. 92s. 105 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4729-2
- C 551 Befolkningsstatistikk 1997 med tall for 1. januar 1998 *Population Statistics 1997 with Figures as of 1 January 1998*. 2000. 181s. 155 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4730-6
- C 552 Fiskeristatistikk 1995-1996 *Fishery Statistics 1995-1996*. 1999. 116s. 125 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4731-4
- C 553 Lakse- og sjøaurefiske 1998 *Salmon and Sea Trout Fisheries* 1998. 1999. 41s. 90 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4732-2
- C 554 Kulturstatistikk 1998 *Culture Statistics 1998*. 1999. 132s. 140 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4735-7
- C 555 Fiskeoppdrett 1997 *Fish Farming 1997*. 1999. 49s. 90 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4738-1
- C 556 Regnskapsstatistikk 1997: Aksjeselskaper *Accounts Statistics 1997: Joint Stock Companies*. 2000. 58s. 115 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4744-6
- C 557 Samferdselsstatistikk 1998 *Transport and Communication Statistics 1998*. 2000. 154s. 155 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4748-9
- C 558 Reiselivsstastikk 1998 *Statistics on Travel*. 2000. 84s. 115 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4749-7
- C 559 Pleie- og omsorgsstastikk 1998 *Nursing and Care Statistics 1998*. 2000. 71s. 115 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4750-0
- C 579 Sosialhjelp og barnevern 1998 *Social Assistance and Child Welfare Statistics 1998*. 2000. 58s. 115 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4754-3
- C 580 Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1999: Statistikk og analyse *Oil and Gas Activity 3rd Quarter 1999: Statistics and Analysis*. 2000. 116s. 140 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4769-1
- C 581 Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger 1986-1996 *Income and Property Statistics for Households 1986-1996*. 2000. 144s. 140 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4772-1
- C 582 Sjøfart 1998 *Maritime Statistics 1998*. 2000. 123s. 140 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4777-2
- C 583 Barnehager 1998 *Kindergartens 1998*. 2000. 58s. 115 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4778-0
- C 584 Skogstatistikk 1997 *Forestry Statistics 1997*. 2000. 98s. 115 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4779-9
- C 585 Pasientstatistikk 1995-1997 *Patient Statistics 1995-1997*. 2000. 85s. 115 kr inkl. mva. ISBN 82-537-4780-1

C

Publikasjonen kan bestilles fra:

ent

S
s

